

QL
690
S65S25
1907
Birds

6.11.09

398.20


К. А. Сатунинь.

МАТЕРІАЛЫ КЪ ПОЗНАНІЮ ПТИЦЪ КАВКАЗСКАГО КРАЯ.

ТИФЛИСЪ.

Типографія К. П. Козловскаго (Головинскій просп., № 12) и
Канцелярія Намѣстника ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
на Кавказѣ.

1907.



598.208
Birds

QL
690
565 525
1907
Birds


K. A. Satunin
К. А. Сатунинъ.

Guide to the birds of the Caucasus,

Materials

МАТЕРІАЛЫ

Къ Познанію Птицъ Кавказскаго Края.
K. Poznaniiu Ptits Kavkazskago Kraia




ТИФЛИСЪ.

Типографіи К. П. Козловскаго (Головинскій просп., № 12) и
Канцеляріи Намѣстника ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
на Кавказѣ.

1907.

К. А. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ

Напечатано по распоряженію Распорядительнаго Комитета Кавказскаго
Отдѣла Императорскаго Русскаго Географическаго Общества.



Матеріалы къ познанію птицъ Кавказскаго края.

Предисловіе.

Съ перваго же года моего переселенія въ Закавказье (1893 г.) я сталъ производить орнитологическія наблюденія и собирать птичьи шкурки. Эти изслѣдованія хотя и производились лишь при моихъ служебныхъ поѣздкахъ, слѣдовательно велись не систематически, но зато продолжались съ небольшими перерывами до настоящаго времени (1906 г.), слѣдовательно уже 14 лѣтъ, въ теченіе которыхъ я посѣтилъ почти всѣ части разнообразнаго Кавказскаго края, а потому мнѣ, понятно, удалось сдѣлать много новыхъ и интересныхъ наблюденій надъ жизнью и географическимъ распространеніемъ кавказскихъ птицъ, еще довольно мало изученныхъ. Но вниманіе и досугъ мой всецѣло были поглощены изученіемъ совершенно еще неизвѣстныхъ млекопитающихъ этой страны, почему все остальное отошло по необходимости на второй планъ и я не имѣлъ возможности самъ лично обработать собранныя мною обширныя коллекціи птицъ. Поэтому въ этой статьѣ я не могу дать ничего новаго по ихъ систематикѣ и, вѣроятно, въ нижеизложенномъ не избѣгъ ошибки въ опредѣленіи нѣкоторыхъ видовъ, но большая часть собранной мною коллекціи находится въ Кавказскомъ Музеѣ и мои опредѣленія могутъ быть исправлены при просмотрѣ этого матеріала.

Я рѣшаюсь опубликовать свои наблюденія только потому, что они все таки содержатъ много еще не опубликованныхъ фактовъ о географическомъ распространеніи кавказскихъ птицъ, а отчасти и объ ихъ образѣ жизни.

*) Я сдѣлалъ исключеніе только для интереснѣйшихъ статей о священномъ ибисѣ и черномъ журавлѣ, которыя раньше были напечатаны мною въ мало распространенномъ охотничьемъ журналѣ.

Я пишу только или свои наблюденія, или то изъ чужихъ, что нигдѣ еще не было опубликовано *), — поэтому моя статья не содержитъ въ себѣ перечня всѣхъ птицъ Кавказскаго края. Но время для генеральной сводки всего извѣстнаго о птицахъ Кавказа, по моему, еще не пришло.

Я прошу смотрѣть на мою статью, какъ на посильный вкладъ въ изученіе кавказскихъ птицъ и матеріалъ для будущей обширной работы по этому вопросу.

Какъ замѣтитъ внимательный читатель этой статьи, мои наблюденія касаются главнымъ образомъ восточнаго Закавказья, гдѣ я ѣздилъ больше всего и при томъ въ самое благопріятное для орнитологическихъ изслѣдованій время — весною и лѣтомъ.

Въ сѣверной части черноморскаго побережья и въ Кубанской области я не былъ вовсе.

Я собиралъ главнымъ образомъ только мелкихъ птичекъ, такъ какъ часто совершенно не имѣлъ времени на препаровку большихъ. Но во всѣхъ моихъ поѣздкахъ со мною было неразлучно сочиненіе проф. М. А. Мензбира „Птицы Россіи“, и я, если не могъ препаровать, то старался хоть опредѣлить убитую птицу.

Еще въ 1896 году Александръ Борисовичъ Шелковниковъ, помѣщикъ Арешскаго уѣзда Елисаветпольской губ., страстный любитель природы и коллекторъ, предоставилъ въ мое распоряженіе небольшую рукопись, содержащую біологическія наблюденія надъ нѣкоторыми болотными птицами. Я заимствовалъ изъ нея чрезвычайно интересныя описанія гнѣздовья цапель, пеликановъ и проч., каждый разъ указывая, разумѣется, на источникъ. За разрѣшеніе воспользоваться этими интересными описаніями я приношу ему здѣсь мою искреннюю благодарность. Глубокую признательность выражаю я здѣсь и проф. М. А. Мензбину, во-первыхъ, за то, что онъ далъ намъ книгу, съ которою стало возможнымъ заниматься въ Россіи орнитологіей и не въ однѣхъ только столицахъ, а, во-вторыхъ, за опредѣленіе многихъ изъ собранныхъ мною птицъ.

К. А. Сатунинъ.

Тифлисъ.

3 декабря 1906 г.

Отрядъ I. Passeriformes. Воробьинообразныя.

Сем. 1. Corvidae. Вороновыя.

1. *Corvus corax* L. Воронъ.

Мензбиръ, II, 457 *).

Воронъ встрѣчается въ Закавказьѣ не часто и только въ юго-западной его части можетъ быть названъ обыкновенною птицей. Насколько онъ рѣдокъ въ другихъ мѣстахъ Кавказскаго края, лучше всего показываетъ то обстоятельство, что за всѣ мои поѣздки по Дагестану и другимъ мѣстамъ Большого Кавказа онъ ни разу мнѣ здѣсь не встрѣтился.

Въ Талышинскихъ горахъ, на Муровъ-дагѣ (въ Маломъ Кавказѣ), на хребтѣ Топъ-іюль (юго-вост. Закавказье) и другихъ мѣстахъ я встрѣчалъ ворона или въ альпійской области, или въ такихъ мѣстахъ, гдѣ среди лѣса выдаются голыя скалы, какъ, напр., у поста Гурджаанъ въ Артвинскомъ округѣ. Въ ноябрѣ 1906 года во время поѣздки по ущелью Чороха я встрѣчалъ ворона очень часто, какъ никогда нигдѣ раньше на Кавказѣ.

2. *Corvus cornix* L. Сѣрая ворона.

Мензбиръ, II, 469.

Карга (татарск.).

Въ предѣлахъ Кавказскаго края сѣрая ворона встрѣчается рѣшительно повсюду и даже поднимается довольно высоко въ горы: Гунибъ въ Дагестанѣ, сел. Гасанризъ и Нижн. Акулисы въ Маломъ Кавказѣ, Гельская котловина и проч. Но особенно много-

*) Я вездѣ привожу сочиненіе, по которому было произведено опредѣленіе; въ подавляющемъ большинствѣ это — классическое сочиненіе проф. М. А. Мензбира „Птицы Россіи“, которое я и цитирую сокращенно „Мензбиръ“. Римская цифра означаетъ томъ, арабскія — страницу.

численную встрѣчается она по долинѣ нижняго теченія р. Куры и по морскимъ побережьямъ. Въ Тифлисѣ вороны приступаютъ къ постройкѣ гнѣздъ во второй половинѣ февраля, а со середины мая на низменности вороны встрѣчаются выводками.

3. *Corvus corone* L. Черная ворона.

Мензбиръ, II, 474.

Я встрѣчалъ черныхъ воронъ небольшими стайками по р. Курѣ близъ Тифлиса, исключительно только на весеннемъ пролетѣ, въ концѣ февраля и началѣ марта, и то довольно рѣдко. Въ восточномъ Закавказьѣ черная ворона положительно нигдѣ не гнѣздится.

Какъ видно по экземплярамъ Кавказскаго Музея, Г. И. Радае часто смѣшивалъ черную ворону съ молодыми грачами, почему къ сообщаемымъ имъ свѣдѣніямъ объ этой птицѣ нужно относиться очень осторожно.

4. *Turanocorax frugilegus* L. Грачъ.

Мензбиръ, II, 462 (*Corvus frugilegus*).

Кара-карга (татарск.).

Грачъ встрѣчается въ громадномъ количествѣ по рѣчнымъ долинамъ какъ Сѣвернаго Кавказа (напр., по Кумѣ), такъ и Закавказья, главнымъ же образомъ по Курѣ. Нижнее теченіе Куры представляетъ, повидимому, идеальную мѣстность для ихъ жизни. На высокихъ деревьяхъ по берегу рѣки они устраиваютъ колоніи своихъ гнѣздъ, а разстилающіяся по обѣимъ сторонамъ Куры степи доставляютъ имъ обильную пищу, такъ какъ именно во время выкармливанія птенцовъ кишатъ насѣкомыми. Большія колоніи грачей я видѣлъ около Джевата и въ Сальянахъ. У одного убитаго близъ Джевата 23. V. 94 грача зобъ и клювъ были полны саранчей, которую онъ несъ со степи въ гнѣздо. Въ лѣсистыхъ мѣстахъ, напр., въ мѣстности Самухъ при слияніи съ Курою рр. Іоры и Алазани я грачей не видѣлъ.

3. X. 900 я встрѣтилъ около Кагызмана громадную пролетную стаю грачей.

Истребляя массу саранчи, составляющей истинный бичъ Закавказья, грачъ является одною изъ полезнѣйшихъ здѣшнихъ птицъ.

5. *Coloeus monedula collaris* Drumm. Галка.

Мензбиръ, II, 478 (*Corvus monedula collaris*).

Тулаша (татарск.).

Кавказская галка, несомнѣнно, относится къ подвиду *C. m. collaris*, такъ какъ и у молодыхъ птицъ сѣровато-бѣлый ошейникъ выраженъ очень рѣзко.

Останется, вѣроятно, вѣчною загадкой, какимъ образомъ Г. И. Радде проглядѣлъ массовое гнѣздованіе галки въ Закавказьѣ.

Во всемъ восточномъ Закавказьѣ и Кубинскомъ уѣздѣ галка принадлежитъ къ числу самыхъ обыкновенныхъ гнѣздящихся птицъ.

Въ южномъ Дагестанѣ (Кюринскій округъ) и Кубинскомъ уѣздѣ галка гнѣздится, насколько мнѣ извѣстно, исключительно въ дуплахъ въ дубовыхъ лѣсахъ. Поэтому она очень обыкновенна и даже многочисленна въ сѣверной, лѣсистой части Кубинскаго уѣзда, но не попадалась мнѣ въ южной, степной его части. Тамъ, гдѣ есть глинистые обрывы, какъ, напр., около Аджи-Кабула, галка гнѣздится въ норахъ, вырытыхъ въ этихъ обрывахъ сизоворонками. Сама она, кажется, норъ не роетъ. Гнѣздовья въ строеніяхъ мнѣ не попадалось. Въ первой половинѣ мая каждый татарченкокъ обязательно носить на плечѣ галченка.

Зимою галки сбиваются въ большія стаи и кочуютъ въ поискахъ за пищею. Въ паркѣ Мухтаидъ въ Тифлисѣ онѣ собирались на ночлегъ съ половины августа.

6. *Pica pica* L. Сорока.

Мензбиръ, II, 483 (*Pica caudata*).

Сагаганъ (татарск.).

Вѣроятно, на Кавказѣ водится не одинъ видъ сороки, но я не умѣлъ ихъ различить, а потому говорю обо всѣхъ вмѣстѣ.

Сорока очень обыкновенна по всему Кавказскому краю.

Станціи, занимаемыя ею, — мелколѣсье, рѣчные долины, сады и выгоны у селеній. Вмѣстѣ съ послѣдними она поднимается и довольно высоко въ горы. Такъ, я встрѣтилъ ее во многихъ высоколежащихъ селеніяхъ Дагестана (Рутуль, Кази-Кумухъ, Гу-

нибь), Малаго Кавказа и западнаго Закавказскаго плоскогорья (Кагызманъ, Сарыкамышъ, Гельская котловина).

Сороки совершенно нѣтъ ни въ густолѣсистыхъ мѣстностяхъ, ни въ открытыхъ степяхъ. Такъ, на Маломъ Кавказѣ я не встрѣтилъ ея въ с. Шихаузъ, окруженномъ со всѣхъ сторонъ лѣсами, въ селеніяхъ западной, лѣсной части Ахалцихскаго у. (Гагва, напр.), а также въ Трухменской лѣтней ставкѣ въ Ставропольск. губерніи.

Гнѣздится сорока если и не совсѣмъ колоніально, то все же небольшими обществами. Когда 15. V. 95 я посѣтилъ устье р. Тертеръ, близъ сел. Чилибиляръ Джеванширскаго у., въ заросляхъ по рѣкѣ сороки и сойки гнѣздились въ такомъ большомъ количествѣ, что совершенно выжили всѣхъ другихъ птицъ. Только въ ближайшихъ садахъ слышалъ я соловья, въ заросляхъ же положительно не было ни одной мелкой птички, тогда какъ въ недалекомъ разстояніи оттуда такія же заросли кишѣли ими.

Сороки любятъ сопровождать стада, и тамъ, гдѣ пасутся буйволы, всегда можно встрѣтить и сорокъ, сидящихъ у нихъ на спинѣ и выбирающихъ паразитовъ.

Сильный снѣгъ и мятель гонять сорокъ къ человѣческому жилью, и тогда онѣ встрѣчаются здѣсь въ огромномъ количествѣ. 8. III. 98 по случаю большого снѣга весь дворикъ почтовой станціи Агдамъ, по тракту въ Шушу, былъ буквально сплошь покрытъ сороками.

7. *Garrulus garrulus* Krinicki Kalenicz. Кавказская сойка.

Мензбиръ, II, 497 (*Garrulus Krynickii*).

Кавказская сойка широко распространена какъ по всему Большому Кавказу, такъ и въ большей части Закавказья, за исключеніемъ самаго юго-восточнаго и юго-западнаго угловъ его, гдѣ она замѣнена другими близкими видами.

Въ Закавказьѣ сойка встрѣчается рѣшительно вездѣ, гдѣ есть лѣсъ, хотя бы и мелкій, или даже большіе сады.

Хотя сойка и гнѣздится на низменности, но зимою количество здѣсь этихъ птицъ значительно увеличивается.

Желуди и здѣсь составляютъ, повидимому, ея любимую пищу, потому что, по возможности, сойки придерживаются дубовыхъ лѣсовъ. Зобъ и ротъ сойки, убитой мною 27. IX. 97 въ Гори, были биткомъ набиты желудями.

8. *Garrulus garrulus hyrcanus* Blanf. Талышинская сойка.

9. *Garrulus garrulus caspius* Seeb. Каспійская сойка.

Hartert, 31.

Первая обитаетъ въ горныхъ лѣсахъ Талыша, вторая въ низменныхъ. Такъ, по крайней мѣрѣ, говоритъ Hartert *), — я же ихъ не различалъ. Зимой, во всякомъ случаѣ, онѣ живутъ вмѣстѣ. Сойки въ Талышѣ очень обыкновенны.

10. *Garrulus garrulus Anatoliae* Seeb. Малоазійская сойка.

Палуть-каргаши („дубовая ворона“, туркменск.).

Этотъ слабо отличающійся отъ *G. g. Krinickyi* подвида обитаетъ въ юго-западномъ углу Закавказья — Арвинскомъ округѣ и западной части Кареской области. Я убилъ одинъ экземпляръ въ с. Мшехъ 24. IX. 902 (по тракту Ардаганъ — Ольты). Вѣроятно, сюда же относятся и сойки гельскихъ лѣсовъ.

11. *Pyrrhocorax graculus* L. Клушица.

Мензбиръ, II, 507.

Клушица очень обыкновенна во всей альпійской области какъ Главнаго хребта, такъ и закавказскихъ горъ.

Я встрѣтилъ большую семью этихъ птицъ, кормившихся на лугу на Бусарчилъскомъ перевалѣ. Въ большомъ количествѣ я встрѣчалъ ихъ также по военно-грузинской дорогѣ отъ Казбека до Гудаура, повсюду въ Дагестанѣ, на Шахъ-дагѣ, Арапатѣ, Агри-дагѣ и Топъ-юлѣ.

Иногда онѣ спускаются и довольно низко: такъ, 17. VI. 96 я встрѣтилъ ихъ около аула Мурухъ, гдѣ онѣ встрѣчаются съ стѣрой вороной, 18. VI. 98 на невысокомъ Атлы-буюнскомъ хребтѣ между Петровскомъ и Темиръ-Ханъ-Шурою, а 1. IX. 900 около Кегартскаго монастыря въ ущельѣ того же имени (къ с.-в. отъ Эривани). Въ послѣднемъ мѣстѣ меня увѣрили, что зимою онѣ часто нападаютъ на курочекъ (*Saccabis chukar*).

12. *Pyrrhocorax alpinus* Vieill. Альпійская галка.

Мензбиръ, II, 511.

Много рѣже предыдущаго вида. Я убилъ альпійскую галку только однажды въ сел. Лаза, у подножья Шахъ-дага въ Кубин-

*) Hartert, E. Die Vögel paläarktischen Fauna, Heft 1, p. 31 (1903).

скомъ уѣздѣ, гдѣ она держалась вмѣстѣ съ клушицей, и одинъ разъ видѣлъ на перевальномъ участкѣ военно-грузинской дороги.

Сем. 2. Sturnidae. Скворцы.

13. *Sturnus caucasicus* Lorenz. Кавказскій скворецъ.

Мензбиръ, II, 519.

Сыгарчинъ (татарск.).

Прежде чѣмъ говорить о распространеніи различныхъ формъ скворцовъ на Кавказѣ, я хотѣлъ бы сдѣлать слѣдующія предварительныя замѣчанія. *Hartert* считаетъ большое количество формъ скворцовъ, описанныхъ какъ самостоятельные виды, за подвиды *Sturnus vulgaris*. Такъ, во всякомъ случаѣ, легче справиться съ ихъ номенклатурой, но, будетъ ли справедливымъ ставить на одинаковыхъ правахъ подвида такой рѣзко обособленный видъ, какъ *Sturnus caucasicus*, съ одной стороны, и мало обособленный *St. Poltorazkyi Satunini*, съ другой, это кажется мнѣ сомнительнымъ. Кромѣ того *St. caucasicus* и *St. Poltorazkyi* иногда встрѣчаются и гнѣздящимися вмѣстѣ: напр., въ паркѣ Муштандъ одинъ изъ этихъ видовъ занималъ дупла, а другой разныя помѣщенія въ зданіяхъ.

Рѣшать эти вопросы — не мое дѣло. Я долженъ былъ только указать ихъ орнитологамъ.

Для нижеслѣдующаго обзора областей гнѣздовья разныхъ формъ скворцовъ я могъ пользоваться, къ сожалѣнію, лишь небольшою частью своей коллекціи, опредѣленной проф. М. А. Мензбиромъ. Опредѣленія Радде ненадежны, а опредѣленія тѣхъ скворцовъ, которые попали въ Зоол. Музей Академіи Наукъ, я не могъ получить, несмотря на всѣ мои просьбы.

Область гнѣздовья кавказскаго скворца въ Закавказьѣ занимаетъ прикаспійскую полосу. Но вполнѣ типичныхъ *St. caucasicus* я нашелъ только въ лѣсахъ Талыша (с. Тангевонъ S. V. 97, с. Машханъ 30. V. 97 etc.) и на краю Мугани въ Белясуварѣ (10. VI. 97). Какъ было уже упомянуто, въ Тифлисѣ онъ гнѣздится вмѣстѣ съ *St. Poltorazkyi*. На Сѣверномъ Кавказѣ этотъ скворецъ гнѣздится повсюду вдоль всего Кавказскаго хребта. Въ Кавк. Музеѣ имѣются экземпляры изъ Кисловодска и изъ Хасавъ-юрта.

На пролетѣ и зимою обыкновененъ во всемъ восточномъ Закавказьѣ.

Въ Тифлисѣ я наблюдалъ, что скворцы только первое время кормятъ своихъ птенцовъ насѣкомыми, когда же они немного подрастутъ, то носятъ имъ исключительно ягоды, главнымъ образомъ тутовья.

14. *Sturnus Poltorazkyi* Satunini Buturlin.

Buturlin, Ornith. Jahrb., XV, 1904, p. 207.

Область гнѣздовья этого скворца лежитъ между областями *Sturnus caucasicus* и *Sturnus Poltorazkyi*, почему я и думалъ, что онъ, можетъ быть, представляетъ просто помѣсь этихъ двухъ видовъ.

Насколько я могу теперь сообразить по своимъ запискамъ и экземплярамъ, еще доступнымъ мнѣ, область гнѣздовья этого сомнительнаго скворца идетъ отъ Беясувара (9. VI. 97) по низовьямъ Куры (с. Бульдугъ) и по южнымъ предгорьямъ Кавказскаго хребта, гдѣ я встрѣтилъ его въ сел. Маразы (2. V. 96) и около станц. Карасахалы, гдѣ онъ гнѣзился въ норахъ рядомъ со щурками и сизоворонками; далѣе по всей Кубинской низменности (с. Дедели 29. V. 96).

15. *Sturnus Poltorazkyi* Finsch.

Сыгарчинъ (татарск.).

Очень обыкновенный скворецъ Закавказья. Область его гнѣздовья обнимаетъ центральную часть Закавказья — Тифлисскую губернію, гдѣ я въ большомъ числѣ встрѣчалъ его около Мцхета, Тифлиса и въ Борчалинскомъ у. Далѣе вмѣстѣ съ предыдущею формой я встрѣтилъ его и въ Шемахинскомъ у. (Шарадиль 28. IV. 96; Маразы 2. V. 96).

16. *Sturnus Menzbieri* Scharpe.

Мензбиръ, II, 519.

10. III. 96 я убилъ одного скворца этого вида близъ Тифлиса по дорогѣ къ Соленому озеру. Скворцы въ большомъ количествѣ держались здѣсь среди стада овецъ.

17. *Sturnus vulgaris* L. typ. Обыкновенный скворецъ.

Мензбиръ, II, 519.

Зимою вмѣстѣ съ другими скворцами я убивалъ и такихъ, которые не отличались отъ средне-русскихъ.

18. *Sturnus purpurascens* Gould.

Мензбиръ, II, 519.

Гнѣздящійся скворецъ сѣверо-западной части Предкавказья.

Въ Кавказскомъ Музеѣ есть экземпляръ изъ Майкопа, добытый 25. V. 86 О. К. Лоренцомъ.

19. *Pastor roseus* L. Розовый скворецъ.

Мензбиръ, II, 512.

Розовый скворецъ распространенъ на всемъ Кавказѣ, но въ большинствѣ мѣстностей не гнѣздится регулярно. Въ одинъ годъ онъ появляется въ данной мѣстности, обыкновенно массою, выводитъ здѣсь дѣтей, а затѣмъ въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ не появляется здѣсь болѣе на гнѣздовѣ. Такъ бывало, напр., около Тифлиса, с. Маразы Шемахинскаго уѣзда и въ другихъ мѣстахъ. Единственное мѣсто, гдѣ я каждый годъ наблюдалъ его одинаково въ громадномъ количествѣ, — Талышинская низменность.

Я встрѣчалъ розоваго скворца на гнѣздовѣ въ Ставропольской губ. по р. Калаусу (6. V. 99); на Кубинской низменности (27. V. 96) у сел. Бостанчи и др.; на южномъ склонѣ восточной части Кавказскаго хребта въ Шемахинскомъ у. близъ селенія Маразы (1. V. 96); на низменности Елисаветпольскаго (4. V. 95) и Арешскаго (V. 94) уѣздовъ Елисаветпольской губ., въ Джебранльскомъ у., по восточнымъ склонамъ Малаго Кавказа (27. V. 94); на Талышинской низменности (V. 1897 и 1898 гг.); на Эриванской равнинѣ и по долинѣ Аракса.

Какъ извѣстно, онъ пользуется большимъ уваженіемъ населенія за то, что всюду слѣдуетъ за полчищами саранчи и истребляетъ ее въ гораздо большемъ количествѣ, чѣмъ можетъ сѣбѣ. Обычай обращаться за помощью къ содѣйствію розоваго скворца вошелъ въ культъ армянскаго народа. При появленіи большой массы саранчи процессія съ духовенствомъ во главѣ направляется къ источнику св. Іакова на Араратѣ за водою, которою потомъ окропляютъ поля, послѣ чего на нихъ должны прилетѣть розовые скворцы. Даже розовый цвѣтъ этой птицы здѣшніе жители объясняютъ кровью избитой ею саранчи. Къ сожалѣнію, розовые скворцы иногда переходятъ и на растительную пищу и жестоко опустошаютъ виноградники. Въ селеніи Карачайли-Василь-оба 8. VIII. 99 я наблюдалъ, какъ они ѣли блѣлую крупноплодную шелковицу. Желая убѣдиться, что я не

обманиваюсь и что они действительно ѣдят плоды шелковицы, а не какихънибудь сидящихъ на нихъ насѣкомыхъ, я убилъ одного и вскрытіемъ окончательно убѣдился, что они ѣдятъ именно ягоды.

Въ 1897 г. около с. Сейфидоръ на Ленкоранской низменности въ стаѣ нормальныхъ молодыхъ и старыхъ розовыхъ скворцовъ я убилъ одного стараго скворца, у котораго весь розовый цвѣтъ былъ замѣненъ ярко-желтымъ.

Въ бытность мою въ ноябрѣ 1906 г. въ сел. Верхне-Марадиды Артвинскаго округа я слышалъ отъ командира Марадидскаго отряда пограничной стражи С. И. Безсомыкина что въ началѣ декабря здѣсь выпадаетъ снѣгъ и тогда съ горъ въ это закрытое ущелье, гдѣ стоитъ еще 4° тепла, спускается масса птицъ, а между ними и розовые скворцы. Онъ здѣсь уже четыре года, и наблюдаетъ ихъ ежегодно. Г. Безсомыкинъ интересуется птицами и имѣетъ сочиненіе Холодковского и Силантьева „Птицы Европы“, такъ что предположить какое-нибудь *qui pro quo* нельзя. Въ ноябрѣ здѣсь цвѣли фіалки и азалии и распустились рододендроны.

Сем. 3. Oriolidae. Иволговья.

20. Oriolus galbula L. Иволга.

Мензбиръ, II, 735.

Сары-күйнехъ (татарск.).

Иволга широко распространена въ предѣлахъ всего Кавказскаго края. Я встрѣчалъ ее въ садахъ Ставропольской губ. и Терской области, во всѣхъ подходящихъ мѣстахъ Дагестана, въ большомъ количествѣ повсюду въ восточномъ Закавказьѣ, Эриванской губ., Карсской области и по черноморскому побережью. Иволга держится въ садахъ и свѣтлыхъ лиственныхъ лѣсахъ предгорій. Въ большихъ лѣсахъ верхняго лѣснаго пояса мнѣ она не встрѣчалась, но по садамъ, расположеннымъ въ Дагестанѣ по долинамъ рѣкъ, она поднимается довольно высоко въ горы. Такъ, я встрѣтилъ ее на Гунибѣ (20. VIII. 97) и въ аулѣ Рутулъ въ верховьяхъ р. Самура (2. VII. 96).

Прилетъ иволги я наблюдалъ 24. IV. 95 на низменности Елисаветпольскаго у. у сел. Алабашлы. Парочки этихъ птицъ держались при этомъ на совершенно неподходящихъ имъ въ обыч-

ное время мѣстахъ: на сухихъ изгородахъ и т. п. Въ 1898 г. въ первый разъ замѣтилъ я иволгу на Талышинской низменности 29. IV близъ сел. Арчеванъ. Иволги, очевидно, успѣваютъ спариться еще до прилета, ибо весною я встрѣчалъ ихъ не иначе, какъ парами.

Самая поздняя имѣющаяся у меня дата, касающаяся пребыванія у насъ иволги, — 21. VIII. 96.

Сем. 4. *Fringillidae*. Вьюрковые.

Подсем. *Coccothraustinae*.

21. *Coccothraustes coccothraustes* L. Дубоносъ.

Мензбиръ, II, 657.

На гнѣздовѣ я нигдѣ дубоноса не наблюдалъ, зимою же это — довольно обыкновенная птица долины Куры. Самое раннее время появленія его осенью въ паркѣ Мухтандъ въ Тифлисѣ — 21. XI. 96, самое позднее весною тамъ же — 21. IV. 96. Уже въ первыхъ числахъ декабря самцы имѣютъ вполне развитой брачный нарядъ. Во второй половинѣ февраля они начинаютъ пѣть.

Радде также не наблюдалъ дубоноса на гнѣздовѣ, но считаетъ его гнѣздящеюся здѣсь птицею на томъ основаніи, что встрѣчалъ его въ Тифлисѣ еще въ мартѣ. Какъ видно изъ вышеизложеннаго, я находилъ здѣсь дубоноса гораздо позднѣе, но не считаю это доказательствомъ его гнѣздованія въ Закавказьѣ, такъ какъ въ это же время встрѣчается здѣсь еще и *Fringilla montifringilla*, уже, во всякомъ случаѣ, нигдѣ на Кавказѣ не гнѣздящійся. Поэтому гнѣздованіе дубоноса въ восточномъ Закавказьѣ представляется мнѣ сомнительнымъ.

22. *Chlorospiza chloris* L. Зеленушка.

Мензбиръ, II, 661.

Обыкновенная осѣдлая птица низменности восточнаго Закавказья.

Самецъ и самка очень привязаны другъ къ другу. 7. IV. 95 года я замѣтилъ на высокомъ деревѣ зеленушку-самца, который пѣлъ тренеца крылышками; выше него на вершинѣ этого же дерева сидѣла самка. Когда самецъ былъ убитъ, самка не улетала прочь.

Въ другихъ мѣстахъ Кавказа мнѣ не приходилось наблюдать зеленушку.

Подсем. *Fringillinae*.

23, a. *Carduelis carduelis* L. Щеголь.

Мензбирь, II, 651.

23, b. *Carduelis carduelis brevirostris* Zarudny.

Hartert, 70.

Распространение щегла на Кавказѣ чрезвычайно обширно. Гнѣздящимся я встрѣчалъ его отъ уровня моря до высоты выше 7000', именно: на южномъ склонѣ Главнаго хребта, въ большомъ количествѣ въ садахъ и лѣсахъ по р. Курѣ, въ талышинскихъ лѣсахъ, выше лѣсного пояса по садамъ, разведеннымъ въ глубокой рѣчной долинѣ между сс. Руаруть и Кяльвязъ (выше 6000'); на Маломъ Кавказѣ по верховьямъ Тертера. Осенью щеглы не торопятся спускаться на низменность: такъ, я встрѣтилъ ихъ въ смѣшанномъ лѣсу около Сарыкамыша еще 8. X. 900 и въ Гельской лѣсной дачѣ 30. VIII. 902 (выше 7000').

Зимую щеглы большими стаями кочуютъ на низменности и представляютъ самую легкую добычу мальчишекъ-птицелововъ, такъ что на рынкѣ въ Тифлисѣ продаются копѣйки по двѣ.

С. А. Бутурлинъ при сравненіи пяти экземпляровъ закавказскаго щегла своей коллекціи съ типомъ Заруднаго опредѣлилъ ихъ какъ *C. s. brevirostris*. Но, принадлежатъ ли къ этому подвиду всѣ закавказскіе щеглы или встрѣчается здѣсь и типичная форма, пока неизвѣстно. Типъ происходитъ изъ Баку.

24. *Chrysomitris spinus* L. Чижъ.

Мензбирь, II, 646.

Гораздо рѣже щегла. Я только однажды встрѣтилъ его на гнѣздовѣ, именно 27. V. 95 встрѣтилъ маленькую стайку чижей на границѣ лѣсной растительности въ урочищѣ Турагай на Муровъ-дагѣ. Лѣсъ состоялъ здѣсь изъ граба, дуба, клена и др. лиственныхъ породъ, хвойныхъ-же здѣсь нѣтъ вовсе; поэтому у меня осталось сомнѣніе въ томъ, что чижи здѣсь дѣйствительно гнѣздятся, тѣмъ болѣе, что еще немного выше почки на деревьяхъ едва только распускались.

Зимую чижъ очень обыкновененъ на низменности, но всегда маленькими стайками. Весною я часто наблюдалъ его въ компаніи со щеглами, а одинъ разъ съ канареечнымъ вьюркомъ. Сильный

осенній летъ чижей надъ Тифлисомъ начинается въ половинѣ октября.

Въ концѣ ноября они больше не встрѣчаются здѣсь.

25. *Acanthis cannabina* L. Рѣполовъ.

Мензбиръ, II, 613.

Громадными стаями зимуетъ на низменности р. Куры. Около Тифлиса я наблюдалъ рѣполова со середины ноября до начала апрѣля.

26. *Acanthis fringillirostris* Bonap. et Schleg. Кавказскій рѣполовъ.

Мензбиръ, II, 617.

Какъ гнѣздящаяся птица кавказскій рѣполовъ встрѣченъ мною въ восточной части Кавказскаго хребта въ предѣлахъ Шемахинскаго у. (близъ с. Маразы 2. V. 96), въ нагорной части Кубинскаго уѣзда (сс. Сусай — Мурухъ 16. VI. 96), во многихъ мѣстахъ Дагестана и на горныхъ лугахъ Малаго Кавказа. Гнѣздится преимущественно въ безлѣсныхъ мѣстностяхъ по балкамъ, поросшимъ мелкимъ кустарникомъ.

Зимою также сбивается въ большія стаи и кочуетъ по низменности. Около Тифлиса я наблюдалъ его зимою съ января до начала апрѣля. Они кормятся по полямъ и усаживаются на ночлегъ по кручамъ, поросшимъ кустарникомъ.

27. *Acanthis brevirostris* Moor.

Мензбиръ, II, 606.

Встрѣчена мною тоже только зимою близъ Тифлиса большими стаями. Можетъ быть, зимою всѣ эти виды летаютъ вмѣстѣ въ одной стаѣ. Во всякомъ случаѣ, въ это время они ничѣмъ не различаются по своимъ повадкамъ.

28. *Oraegithus pusillus* Pall. Королевскій व्यюрокъ.

Мензбиръ, II, 644 (*Serinus pusillus*).

Королевскій व्यюрокъ, или малиновка, какъ называютъ его тифлисскіе птицеловы, — обыкновенная птица альпійской области Большого и Малаго Кавказа и держится тамъ, гдѣ альпійскіе луга перемѣшаны съ обнаженными скалами и каменными осыпями. Они любятъ также кустики, ютящіеся по обрывамъ и трещинамъ

отвѣсныхъ скалъ. Тамъ, гдѣ нѣтъ скалъ и камней, ихъ не увидишь.

Зимою эта птичка спускается ниже, но на низменности не замѣчена. Только во время сильной мятели въ концѣ декабря 1905 года я видѣлъ въ Тифлисѣ одного такого въюрка, подлетѣвшаго къ вывѣшенной на выходящемъ въ садъ балконѣ клѣткѣ съ птичкой того же вида. Въ 1906 году на птичьемъ базарѣ въ Тифлисѣ королевскіе въюрки появились уже 21. X, но они были пойманы гораздо выше, въ горахъ.

Несмотря на то, что статья моя не преслѣдуетъ систематическихъ цѣлей, я позволю себѣ сдѣлать исключеніе для этой и еще другой птички и сказать нѣсколько словъ объ ихъ систематическомъ положеніи. Вопреки мнѣнію нѣкоторыхъ высокоавторитетныхъ орнитологовъ я никакъ не могу согласиться на присоединеніе королевскаго въюрка къ роду *Serinus*.

Что же общаго у *Oraegithus pusillus* и *Serinus hortulanus*? Мнѣ отвѣтить, конечно: пластическіе признаки. Но вся моя уже немалая теперь зоологическая практика привела меня къ заключенію, что эти „пластическіе“ признаки... чрезвычайъ пластичны, т. е. измѣняются очень легко, и гораздо болѣе надежнымъ признакомъ является извѣстная группировка цвѣтовъ окраски.

Несмотря на всю мою орнитологическую неопытность, я твердо убѣжденъ, что предложенное въ послѣднее время Hartert'омъ *) соединеніе въ одинъ родъ *Acanthis* (или *Carduelis*) щерловъ, чижей, чечетокъ и проч. не будетъ принято ни однимъ опытнымъ орнитологомъ.

Многочисленные африканскіе виды *Serinus*, съ которыми я случайно познакомился, поразительно однообразны по окраскѣ (въ смыслѣ сочетанія цвѣтовъ) и не имѣютъ ничего общаго съ *Oraegithus*.

Далѣе, всякій, наблюдавшій на волѣ *Oraegithus* и *Serinus*, согласится, что въ образѣ ихъ жизни нѣтъ ничего общаго.

Когда стайка *Oraegithus pusillus* съ характернымъ чириканьемъ проносится по альпійскому лугу съ одного камня на другой, никому, глядя на нихъ, и въ голову не придетъ причислить эту птичку къ роду *Serinus*, представители котораго всѣ — древесныя птицы.

*) Hartert, Die Vögel der paläarktischen Fauna, I, p. 65.

29. *Serinus canaria serinus* L. Канареечный выюрокъ.

Hartert, 83.

28. III. 96 я встрѣтилъ стайку, штукъ въ 10, этихъ птичекъ въ паркѣ Муштаидъ въ Тифлисѣ и добылъ изъ нихъ 4 штуки: 2 самцовъ и 2 самокъ.

Они сидѣли на вершинѣ высокаго дерева (гледичи) и пѣли. Я прослѣдилъ ихъ до первыхъ чиселъ апрѣля, когда долженъ былъ уѣхать. Они держались во все время въ одномъ мѣстѣ парка и, повидимому, собирались здѣсь гнѣздиться. 2. IV я добылъ еще одного самца; они летали въ это время вмѣстѣ съ чижами и зябликами.

Канареечный выюрокъ на Кавказѣ никѣмъ кромѣ меня не наблюдался. Поэтому я предполагаю, что это была случайно залетная стайка или передовая при расселеніи его къ сѣверу. Иначе трудно объяснить, почему его никто до сихъ поръ не замѣтилъ.

30. *Pyrrhula pyrrhula* Rossikowi Derjugin. Кавказскій снѣгирь.

Дерюгинъ, Ежегодн. Зоол. Муз. Имп. Ак. Наукъ, V, 1900, стр. 285.

Я встрѣчалъ снѣгиря только зимою (XI—I) въ Тифлисѣ въ паркѣ Муштаидъ. Немногіе экземпляры, добытые здѣсь мною въ ноябрѣ и декабрѣ, я опредѣлилъ сперва, какъ *Pyrrhula coccinea*, но, по свидѣтельству В. Л. Біанки, всѣ закавказскіе снѣгири относятся къ установленному Дерюгинымъ подвиду Р. р. *Rossikowi*. Замѣчу, однако, что пока число закавказскихъ экземпляровъ этой птицы въ коллекціяхъ весьма ограничено, а мои, напр., добыты въ мѣстности, гдѣ снѣгирь является случайною птицей. Изъ мѣстностей же, гдѣ зимою онъ обыкновененъ, напр., изъ Нухи, экземпляровъ пока не имѣется. Изъ соотвѣтствующей главы сочиненія Радде нельзя понять, о какомъ видѣ идетъ рѣчь.

Изъ всего этого слѣдуетъ, что пока нельзя еще рѣшить, дѣйствительно ли это — единственный снѣгирь Закавказья.

На Сѣверномъ же Кавказѣ живетъ, вѣроятно, и другой видъ.

31. *Carpodacus erythrinus roseatus* Hodgs. Чечевица.

Hartert, 108.

Я нигдѣ не нашелъ чечевицы гнѣздящеюся на низменности, хотя она здѣсь и задерживается довольно поздно, до половины мая.

Не различить голоса этой столь знакомой мнѣ птицы среди хора другихъ пѣвцовъ представляется мнѣ положительно невозможнымъ. На низменности я наблюдалъ ее съ конца апрѣля (Тифлисъ, Муштаидъ, 23. IV. 96; Талышинская низменность, с. Арчеванъ, 24. IV. 97, с. Машханъ, 29. IV. 98) до середины мая (Ахъ-су, Шемахинскаго уѣзда, 12. V. 96; Тифлисъ, Муштаидъ, 12. V. 906).

Гнѣздящеюся я нашелъ чечевицу въ горахъ Большаго Кавказа отъ пояса лѣса (приблизительно съ 3000') до альпійскихъ луговъ. Чечевица не встрѣчается въ сплошныхъ густыхъ лѣсахъ, а держится тамъ, гдѣ лѣсъ чередуется съ лугами, и особенно любитъ стоящія среди нихъ большія одиночныя деревья, на вершинѣ которыхъ самцы и поютъ обыкновенно во время высиживанія самками яицъ. Тамъ, гдѣ нѣтъ уже болѣе ни деревьевъ, ни кустарника, чечевица гнѣздится въ высокихъ бурьянахъ субальпійскихъ луговъ, особенно на громадныхъ зонтичныхъ, какъ я наблюдалъ это по дорогѣ изъ аула Микрахъ въ аулъ Курушъ, высочайшее селеніе Кавказа. Особенно много было ихъ близъ аула Пиркендъ на высотѣ выше 7000'.

На Шахъ-дагѣ, поднимаясь изъ аула Лаза, я встрѣтилъ ихъ 17. VI. 96 въ мѣстности съ очень скудною, низкою альпійскою растительностью и не могъ догадаться, гдѣ онѣ находятъ здѣсь мѣсто для устройства своихъ гнѣздъ. Самцы здѣсь поютъ усѣвшись на какой нибудь высокій обломокъ скалы, какъ и близъ Пиркенда. 16. VI. 96 я нашелъ на заросшей высокимъ бурьяномъ полянкѣ среди лѣса между селеніями Сусай и Мурухъ въ горной части Кубинскаго уѣзда гнѣздо съ пятью уже насиженными яйцами. Оно помѣщалось въ единственномъ маленькомъ кустикѣ среди этой поляны. Въ непосредственномъ сосѣдствѣ гнѣздилась и *Acrocephalus palustris*.

23. V. 96 я слышалъ чечевицу въ садахъ селенія Зизикъ, недалеко отъ г. Кубы, ниже 2000', такъ что, можетъ быть, граница гнѣздованія этой птицы лежитъ и ниже указаннаго мною предѣла. Но это было единственный только разъ.

Въ Талышинскихъ горахъ я встрѣтилъ чечевицу гнѣздящуюся около сел. Лирикъ (18. V. 97).

Помимо перечисленныхъ выше мѣстностей я встрѣчалъ чечевицу и во многихъ мѣстностяхъ нагорной части Кубинскаго уѣзда и Дагестана, а также (въ началѣ мая) и въ садахъ Терской области, но странно, что она ни разу не встрѣчалась мнѣ

въ горахъ Малаго Кавказа. Впрочемъ, въ юго-западной части Закавказья я никогда не былъ въ началѣ лѣта.

Закавказскіе экземпляры окрашены значительно ярче, чѣмъ средне-русскіе. Hartert (l. c.) относитъ кавказскіе экземпляры обыкновен. чечевицы къ подвиду *C. c. roseatus*, но говоритъ, что по окраскѣ она иногда сильно приближается къ типичной формѣ.

32. *Loxia curvirostra caucasica* Buturlin. Клестъ-еловикъ кавказскій.

Buturlin, Reichenow's Ornithol. Monatsber., Jann. 1907. p. 8.

Я встрѣтилъ клеста единственный разъ, именно 18. VIII. 1902 въ селеніи Гагва Ахалцихскаго уѣзда (восточный склонъ Месхійскаго хребта), расположенномъ среди смѣшаннаго лѣса, съ преобладаніемъ лиственныхъ породъ. Здѣсь стайка клестовъ, штукъ въ восемь, усѣлась рядышкомъ на шесть на балконѣ въ трехъ шагахъ отъ меня.

Въ бытность мою въ Бакуріанахъ мнѣ передавали, какъ особое чудо, что во время рубки лѣса зимою было найдено гнѣздо клеста съ еще голыми птенцами.

По Бутурлину (l. c.), кавказскій клестъ отличается отъ типичнаго болѣе яркимъ краснымъ цвѣтомъ у старыхъ самцовъ.

33. *Fringilla coelebs* L. Зябликъ.

Мензбиръ, II, 626.

Обыкновеннѣйшая птица всего Кавказскаго края и встрѣчень мною вездѣ, гдѣ есть сады или какая нибудь древесная растительность.

Область гнѣздовья зяблика совершенно совпадаетъ съ границами лѣснаго пояса горъ. Въ Талышинскихъ горахъ онъ найденъ мною и въ тѣхъ садахъ, которые разведены въ глубокой балкѣ между сс. Руаруть (=Рувары) и Кяльвязъ, уже выше естественной лѣсной границы. Но въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ лѣсъ спускается къ самому морю и вліяніе послѣдняго уменьшаетъ лѣтнюю жару, именно въ Талышѣ и по черноморскому побережью, и зябликъ гнѣздится на уровнѣ моря. На жаркой же низменности восточнаго Закавказья, до высоты Тифлиса, зяблика лѣтомъ не бываетъ, зато онъ весьма многочисленъ зимою. Появляется онъ здѣсь въ концѣ августа и остается, смотря по погодѣ, до середи-

ны или конца апрѣля, къ каковому времени его нарядъ получаетъ наибольшую интенсивность окраски.

Для своего мѣстожительства зябликъ выбираетъ преимущественно лиственные лѣса, но встрѣчается и въ чисто хвойныхъ, каковы лѣса около Гельской котловины.

34. *Fringilla montifringilla* L. Вьюрокъ.

Мензбиръ, II, 621.

Эта сѣверная птичка въ громадномъ количествѣ зимуетъ на низменности, а отчасти и предгорьяхъ восточнаго Закавказья. Первое время по прилетѣ сюда они, вѣроятно, держатся въ поясѣ лѣса. Только однажды я видѣлъ на тифлисскомъ птичьемъ рынкѣ одного вьюрка, пойманнаго гдѣ то въ окрестностяхъ города уже 15. X. 906. Въ громадномъ же количествѣ появляются они только послѣ выпаденія большого снѣга. Въ 1905 году я замѣтилъ перваго вьюрка въ городѣ 7. XII; съ тѣхъ поръ число ихъ все увеличивалось, но, какъ только въ январѣ снѣгъ стаялъ, откочевали и вьюрки. Въ суровую зиму 1895—96 г. громадные стаи ихъ носились по прилежащимъ къ Тифлису стенамъ. Въ мятели имъ приходилось плохо: такъ, послѣ сильной мятели и мороза, разыгравшихся 24. I. 96, я находилъ много ихъ замерзшими. Въ одной норѣ полевки (*Microtus socialis*) я нашелъ вмѣстѣ четыре штуки погибшихъ такимъ образомъ вьюрковъ. Въ этомъ году они задержались здѣсь очень поздно, и я убилъ одного въ паркѣ Мухштайдъ еще 13. IV.

35. *Montifringilla alpicola* Pall. Горный вьюрокъ.

Мензбиръ, II, 618.

26 и 27. IV. 99, проѣзжая по военно-грузинской дорогѣ, я наблюдалъ горнаго вьюрка отъ ст. Гудауръ до ст. Казбекъ и немного дальше послѣдней. Между Гудауромъ и Коби стояла еще суровая зима и лежалъ глубокий снѣгъ. Здѣсь я могъ убѣдиться, что окраска горнаго вьюрка совершенно гармонируетъ съ окружающею обстановкой и, когда онъ садится на бурый камень среди снѣжнаго поля, то совершенно сливается съ ними. Несмотря на отвратительную погоду (все было затянуто туманомъ и моросилъ мелкій дождь), вьюрки чувствовали себя, очевидно, въ самомъ разгарѣ весны. Они то сидѣли на обрывахъ и оглашали этотъ

мертвый пейзажъ своимъ чрезвычайно мелодичнымъ пѣніемъ, то перелетали волнистымъ полетомъ съ мѣста на мѣсто и гонялись другъ за другомъ. Самки попадались, однако, рѣдко, а большинство державшихся на виду птицъ были самцы. Все таки мнѣ удалось убить и пару самокъ, въ которыхъ я нашелъ яйца на сносі.

Горные вьюрки живутъ здѣсь круглый годъ и зимою попадаютъ большими стаями на самой дорогѣ, роясь въ пометѣ, какъ воробьи.

Здѣсь же наблюдалъ я ихъ и лѣтомъ 14—17. VI. 901. Они держались на тѣхъ же мѣстахъ и самцы усердно пѣли. Летящій вьюрокъ со своими бѣлыми крылышками чрезвычайно красивъ на зеленомъ фонѣ альпійскаго луга, но, едва онъ сѣлъ на камень, какъ совершенно исчезаетъ изъ вида.

Ни по своимъ повадкамъ, ни по пѣнію горный вьюрокъ несколько не похожъ на другихъ нашихъ вьюрковъ.

36. *Petronia petronia exigua* Hellmaug. Каменный воробей.

Hartert, 143.

На гнѣздовѣхъ я находилъ каменнаго воробья въ большомъ количествѣ въ разныхъ мѣстахъ Дагестана (Гимры, Леваши, Акуша), въ Талышинскихъ горахъ (Барнасарскій перевалъ) и въ Кульнахъ Эриванской губ. Вѣроятно, онъ гнѣздится и гдѣ нибудь въ горахъ около Тифлиса, но я убивалъ его здѣсь только въ ноябрѣ и весной (9. IV. 95).

Я отношу закавказскаго каменнаго воробья къ подвиду *P. p. exigua* только по свидѣтельству Hartert'a (l. c. p. 143).

37. *Passer domesticus caucasicus* M. Bogdanow. Кавказскій воробей.

Мензбиръ, II, 632.

Сырче (татарск.).

Я не могу, конечно, въ точности указать отличительныхъ признаковъ этого подвида, но разница между типичною и кавказскою формами въ общей окраскѣ такъ сильно бросается въ глаза, что отождествлять ихъ невозможно.

Домашній воробей обыкновененъ во всемъ Кавказскомъ краѣ въ плодородныхъ мѣстностяхъ и часто встрѣчается и далеко отъ жилищъ.

Гнѣздится онъ въ постройкиахъ, въ аистовыхъ гнѣздахъ, хотя гораздо рѣже черногрудого воробья, и наконецъ въ самостоятельно устроенныхъ гнѣздахъ. 10. VI. 97 я нашелъ около Белясувара (Джеватскаго уѣзда) въ заброшенномъ тутовникѣ на молодыхъ тутовыхъ деревьяхъ обширную колонію домашнихъ воробьевъ. На каждомъ деревѣ было по нѣсколько штукъ довольно большихъ круглыхъ грубо сдѣланныхъ изъ соломы гнѣздъ.

38. *Passer hispaniolensis transcaspicus* Tschusi. Черногрудый воробей.

Hartert, 157.

Кара-сырче (татарск., Кубинскаго уѣзда).

Я называю кавказскаго черногрудого воробья этимъ именемъ также только на основаніи свидѣтельства Hartert'a (l. c. 157).

Черногрудый воробей широко распространенъ въ степной части Кубинской низменности, по всей низменности восточнаго Закавказья и однажды былъ встрѣченъ мною на Закавказскомъ плоскогорьѣ въ Гельской котловинѣ.

Послѣднее мѣстонахожденіе, впрочемъ, не подтверждено документально. Именно 28. VIII. 902 я видѣлъ около гнѣзда аиста на развалинахъ старинной церкви въ с. Окамъ воробьевъ, у которыхъ въ окраскѣ было много чернаго и которыхъ я принялъ за *P. hispaniolensis*, но, когда я вернулся въ началѣ сентября съ ружьемъ, то засталъ только *Passer domesticus*. Думаю, однако, что я не ошибся, такъ какъ хорошо знаю эту птицу.

Несмотря на широкое распространеніе черногрудого воробья, быстро проѣзжающій по странѣ изслѣдователь легко можетъ проглядѣть его вслѣдствіе того, что онъ встрѣчается только спорадически болѣе или менѣе обширными колоніями. Я замѣтилъ, что распространеніе черногрудого воробья тѣсно связано съ распространеніемъ бѣлаго аиста, ибо чаще всего этотъ воробей гнѣздится въ гнѣздахъ аиста, безразлично, обитаемы они или уже покинуты ихъ настоящими владѣльцами. Гнѣзда воробья помѣщаются или въ самой толщѣ довольно безалабернаго аистоваго гнѣзда, или облѣпляютъ его круглыми комками соломы. Гораздо интереснѣе гнѣзда, устраиваемыя ими самостоятельно. Иногда они устраиваются въ нѣкоторомъ отдаленіи другъ отъ друга, иногда плотно другъ къ другу, съ общею крышей, и тогда весьма напоминаютъ гнѣзда

африканскаго общественнаго воробья. Такое гнѣздо, конечно, далеко не такъ правильно и аккуратно, какъ это рисуютъ для послѣдняго, но я и не думаю, чтобы эти рисунки были очень вѣрны. Гнѣзда перваго типа я находилъ въ Кубинскомъ уѣздѣ. Въ сел. Карачайли-Василь-оба на молодомъ засохшемъ пирамидальномъ тополѣ находилось штукъ 15 такихъ гнѣздъ, которыя размѣщались по два, по три въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ отъ главнаго ствола отходили боковыя вѣтви, и представляли собою довольно крупные грубо сдѣланные соломенные шары съ отверстіемъ сбоку.

Самое большое общее гнѣздо я встрѣтилъ въ сел. Саятъ Кубинскаго уѣзда. Оно помѣщалось на громадномъ платанѣ, тамъ, гдѣ главный стволъ раздѣлялся на нѣсколько вѣтвей, и обхватывало и стволъ и вѣтви. Насколько помню, оно имѣло болѣе двухъ аршинъ въ діаметръ и круглую сплюснутую сверху внизъ форму. Сверху оно было совершенно закрыто, а съ боковъ и снизу всюду виднѣлись многочисленныя входныя отверстія. Кругомъ хлопотали воробьи. Что въ основѣ этого сооруженія не было гнѣзда аиста, ясно изъ того, что аисты не выютъ гнѣздъ въ пол-дерева.

Хотя у черногрудаго воробья, какъ у птицы перелетной, должно было бы ожидать большей правильности во времени кладки яицъ и высиживанія птенцовъ, чѣмъ у домашняго воробья, на дѣлѣ оказывается, что въ одной и той же колоніи можно найти всѣ стадіи развитія отъ свѣжаго яйца до почти оперившихся молодыхъ. 6. VI. 96 въ селеніи Нижніе Кушчи въ одномъ гнѣздѣ, прикрѣпленномъ къ брошенному гнѣзду аиста, я нашелъ девять голыхъ птенцовъ различной величины: самый маленькій былъ вдвое меньше самаго большаго. У одной самки, убитой въ сел. Хиналугъ-оба, во рту былъ сверчокъ, — слѣдовательно, она кормила птенцовъ; въ другой найдено совершенно сформировавшееся яйцо, еще безъ скорлупы; въ этомъ же селеніи въ тотъ же день мальчишки достали мнѣ изъ гнѣзда четырехъ уже полуоперившихся молодыхъ.

Черногрудый воробей любитъ открытыя плодородныя мѣстности, такъ какъ питается почти исключительно зерномъ, — слѣдовательно, является настоящимъ паразитомъ.

Поэтому въ лѣсистыхъ мѣстахъ, какъ, напримѣръ, на Талышинской низменности, онъ нигдѣ мною на гнѣздовѣхъ не встрѣченъ. Колоніи его я встрѣтилъ въ Кубинскомъ уѣздѣ, именно въ

степной его части, по Араксу, около Мендживанскаго поста * и въ Джеванширскомъ уѣздѣ.

Самая большая колонія была осмотрѣна мною въ сел. Кеймуразъ 4. VI. 96 (въ Кубинскомъ уѣздѣ); здѣсь тростниковые воробьи вмѣстѣ со скворцами жили въ астовой колоніи изъ семи гнѣздъ.

Повсюду мѣстные жители увѣрили меня, что черногрудые воробьи остаются на зиму здѣсь же. Но я думаю, что они ошибаются. Энергично экскурсируя въ концѣ февраля и мартѣ 1895 г. въ Джеватскомъ уѣздѣ, я ни разу не видѣлъ здѣсь другихъ воробьевъ кромѣ домашнихъ. Въ началѣ же апрѣля 1897 г. всюду по тракту отъ станціи Аджи-Кабуль (5. IV) до Сальянъ (7. IV) я встрѣтилъ большія стаи черногрудыхъ воробьевъ, которые летали вмѣстѣ со скворцами. Немного позже я встрѣтилъ такіе же смѣшанные стаи и на Ленкоранской низменности.

Вся сумма моихъ наблюденій указываетъ, повидимому, на то, что черногрудый воробей прилетаетъ въ Закавказье въ началѣ апрѣля, или, быть можетъ, въ послѣднихъ числахъ марта, и по прилетѣ нѣкоторое время держится стаями, при чемъ въ это время залетаетъ и въ такіе мѣстности, гдѣ не гнѣздится (южная часть Ленкоранскаго уѣзда, Арешскій уѣздъ Елисаветпольской губ.). Отлетаетъ онъ, судя по единственному, при томъ ненадежномъ наблюденію въ Гельской котловинѣ, въ началѣ сентября. Но с. Окамъ лежитъ на высотѣ болѣе 7000', — слѣдовательно, на низменности это должно происходить позднѣе.

39. *Passer montanus* L. Полевой воробей.

Мензбиръ, II, 636.

Полевой воробей, сравнительно съ домашнимъ, встрѣчается очень рѣдко. Онъ найденъ мною въ Тифлисѣ, по долинѣ Куры въ Тифлискомъ и Елисаветпольскомъ уѣздахъ, на Маломъ Кавказѣ (с. Шихаузь — Мазра, 28. VI. 94) и во многихъ селеніяхъ Дагестана; въ нѣкоторыхъ изъ послѣднихъ я замѣтилъ, что это былъ единственный встрѣчающійся тамъ видъ, напр., въ аулѣ Цугни Даргинскаго округа (15. VIII. 97). Около Тифлиса и въ самомъ городѣ онъ встрѣчался мнѣ только зимою. Въ селеніи Алабашлы на низменности Елисаветпольскаго уѣзда 23. IV. 95 я

* А не Шахчинарскаго, какъ я ошибочно сообщилъ проф. М. А. Мензбину.

услышалъ какую то незнакомую мнѣ короткую пѣсню, и, когда убилъ птицу, къ удивленію, узналъ въ ней полевого воробья.

Я ни разу не встрѣчалъ этого воробья ни въ Талышѣ, ни на черноморскомъ побережьѣ, ни на сравнительно хорошо изслѣдованной мною Кубинской низменности.

С. А. Бутурлинъ отличилъ полевого воробья западнаго Закавказья, какъ *Passer montanus transcaucasicus* (Ibis, 1906, p. 423). Но я не знаю, относится ли это описаніе и къ воробьямъ восточнаго Закавказья, а тѣмъ болѣе Дагестана, а потому и привожу наблюдавшихся мною полевыхъ воробьевъ пока подъ именемъ *P. montanus* L., такъ какъ въ западномъ Закавказьѣ я этой птицы не наблюдалъ.

Подсем. Emberizinae.

40. *Miliaria calandra* L. Просянка.

Мензбиръ, II, 562 (*Emberiza miliaria*).

Просянка — обыкновеннѣйшая осѣдлая птица Закавказья. Она гнѣздится здѣсь отъ уровня моря до альпійскихъ луговъ. Такъ, въ Талышинскихъ горахъ я встрѣтилъ ее близъ поста Кяльвизъ 26. V. 96 на высотѣ около 7000'. Спускаются ли гнѣздящіеся столь высоко экземпляры зимою на низменность, я не знаю, но около Тифлиса она держится и зимою и лѣтомъ на однихъ и тѣхъ же мѣстахъ, и въ одинаковомъ количествѣ. Распространеніе ея связано съ распространеніемъ посѣвовъ, на которыхъ или вблизи которыхъ она постоянно держится. По обработаннымъ полямъ поднимается она и высоко въ горы. Птичка эта лѣтомъ чрезвычайно довѣрчива и подпускаетъ человѣка на нѣсколько шаговъ.

Пустынныхъ мѣстностей, каковы, напр., невысокая плоская возвышенность Бозъ-дагъ и неорошенная часть Мугани, просянка избѣгаетъ, равно какъ и сырыхъ и лѣсистыхъ мѣстностей. Уже съ конца марта слышно трескучее пѣніе просянки, при чемъ она обыкновенно сидитъ на изгороди или маленькомъ кустикѣ.

41. *Emberiza citrinella erythrogenys* Brehm. Обыкновенная овсянка.

Мензбиръ, II, 553 (*Emberiza citrinella*); Hartert, 169.

Распространеніе обыкновенной овсянки въ Закавказьѣ для меня не вполне ясно. Я не знаю даже, гнѣздится ли она тутъ, и встрѣчалъ ее главнымъ образомъ только осенью и зимою.

Съ ноября по февраль я встрѣчалъ ее небольшими стайками по долинѣ р. Куры около Тифлиса и въ Арешскомъ уѣздѣ Елисаветпольской губ., 27. IX. 98 около города Гори, 6. XI. 96 въ горной части Елисаветпольскаго уѣзда около духоборскихъ селеній и, наконецъ, одинъ разъ въ апрѣлѣ (24. IV. 97) на Талышинской низменности близъ персидской границы у сел. Алаша-кендѣ. Въ послѣднемъ мѣстѣ жители жаловались на то, что она поѣдаетъ много чалтыка (риса). Я не берусь дѣлать какой нибудь выводъ изъ столь отрывочныхъ наблюдений, хотя не могу не замѣтить, что странно было бы, если я пропустилъ ее гдѣ нибудь на гнѣздовѣ въ восточномъ Закавказьѣ.

42. *Emberiza melanosephala* Scop. Черноголовая овсянка.

Мензбиръ, II, 567.

Распространеніе этой красивой, милой птички въ предѣлахъ Кавказскаго края весьма обширно.

Въ степяхъ Сѣвернаго Кавказа она всюду обыкновенна и 8. V. 99 я нашелъ ее еще по р. Калаусу; сѣвернѣе я не былъ.

По побережью Каспійскаго моря и въ восточномъ Закавказьѣ я встрѣчалъ ее всюду какъ въ пустынныхъ степяхъ, если только тамъ попадаются хоть какіе нибудь кустики, такъ и въ культурныхъ мѣстностяхъ, и на уровнѣ моря, и довольно высоко въ горахъ. Лѣсовъ и сырыхъ мѣстностей черноголовая овсянка избѣгаетъ. Высоко въ горахъ я нашелъ ее въ урочищѣ Умутлы по склону Муровъ-дага и въ Талышинскихъ горахъ 18. V. 97 около селенія Лирикъ, гдѣ она гнѣздилась рядомъ съ *Carpodacus erythrinus*, и 27. V. 98 около сел. Кяльвизъ. Но всетаки обильнѣе всего она держится на низменности и предгорьяхъ, покрытыхъ рѣдкимъ кустарникомъ, особенно любимымъ ею держи-деревомъ (*Paliurus australis*). Я никогда не наблюдалъ, чтобы самцы усаживались для пѣнія рядомъ на одинъ кустъ, какъ объ этомъ говоритъ Палласъ. Сколько бы ни было въ данной мѣстности черноголовыхъ овсянокъ, — а иногда ихъ бываетъ очень много, — всегда каждый самецъ сидитъ отдѣльно на вершинѣ маленькаго кустика. Это положительно одинъ изъ лучшихъ пѣвцовъ Закавказья, по мелодичности и звучности своего голоса далеко оставляющій за собою здѣшняго соловья.

Гнѣздо черноголовая овсянка вѣетъ среди куста держи-дерева; часто оно бываетъ спрятано довольно плохо: 16. V. 94 я нашелъ

въ одномъ ущельѣ Бозъ-дага нѣсколько такихъ гнѣздъ въ недалекомъ другъ отъ друга разстояніи. Всѣ они содержали по пяти яицъ.

Прилетъ черноголовой овсянки я наблюдалъ на низменности Елисаветпольскаго уѣзда 20. IV. 95 у сел. Калякъ. Овсянки держались въ это время небольшою стайкой. 20. IV. 97 на Талышинской низменности въ сел. Бутасаръ мнѣ принесли продавать черноголовую овсянку, пойманную здѣсь нѣсколько дней тому назадъ. Замѣчу, что въ южной части Ленкоранскаго уѣзда эта птица врядъ ли гнѣздится на низменности, ибо мѣстность здѣсь для нея совершенно неподходящая, кромѣ узкой полосы вдоль берега моря, гдѣ я дѣйствительно и убилъ одну близъ сел. Гилякеранъ 1. V. 98.

Улетаетъ изъ Закавказья черноголовая овсянка сравнительно очень рано, уже въ августѣ. Какъ исключеніе, я видѣлъ у одного охотника 3. IX. 95 только что убитую имъ подѣ Тифлисомъ птичку этого вида.

43. *Emberiza hortulana* L. Садовая овсянка.

Мензбиръ, II. 345.

И никакъ не могу согласиться съ мнѣніемъ Радде, что садовая и горная (*Emberiza cia*) овсянки занимаютъ на Кавказѣ одну и ту же область. Такое мнѣніе вышеупомянутаго ученаго тѣмъ болѣе странно, что садовая овсянка въ Закавказьѣ только *лѣтующая* птица, а горная — *осёдлая*.

По моимъ наблюденіямъ, садовая овсянка занимаетъ въ восточномъ Закавказьѣ область предгорій, но поднимается и довольно высоко въ горы; на Маломъ Кавказѣ и южныхъ склонахъ Главнаго хребта она не встрѣчалась мнѣ, однако, выше 5000'. Въ Дагестанѣ распространена очень широко и еще въ августѣ встрѣчена мною на значительной высотѣ, именно по дорогѣ изъ аула Вихли въ Кази-Кумухъ. Впрочемъ, это могли быть и пролетныя птицы.

Садовая овсянка избѣгаетъ такихъ сухихъ, пустынныхъ мѣстностей, какія любитъ черноголовая овсянка, а держится среди болѣе обильной растительности и преимущественно по заросшимъ кустарникомъ склонамъ горъ. Прилетъ садовой овсянки на Елисаветпольской низменности я наблюдалъ одновременно съ приле-

томъ черноголовой 20. IV. 95. Стайки обонхъ видовъ попались мнѣ здѣсь одна за другой. Около Тифлиса въ 1896 г. я встрѣтилъ ее первый разъ 18. IV, около Ленкорани 18. IV. 97. Въ концѣ августа эта птичка исчезаетъ.

Пѣніе садовой овсянки довольно пріятно, но не можетъ быть и сравнено съ пѣніемъ черноголовой.

44. *Emberiza cia* par Hartert. Горная овсянка.

Hartert, 184.

Обыкновенная осѣдлая птичка всей горной области Кавказа. Нижняя граница ея гнѣздовой области здѣсь, вѣроятно, не ниже 3000'. Ни около Тифлиса, ни около Мцхета она еще не гнѣздится, а появляется здѣсь только зимою. Она любитъ крутые склоны и обрывы, поросшіе скудною горною растительностью, почему я нашелъ ее весьма многочисленною въ Арвинскомъ округѣ и Дагестанѣ, но ни разу не видалъ въ Талышинскихъ горахъ.

Зимою горная овсянка спускается ниже, но все же не доходитъ до уровня моря. Около Гудаура на Крестовомъ перевалѣ она встрѣчается еще и въ декабрѣ. Въ холодныя зимы она все же многочисленнѣе въ Мцхетѣ, чѣмъ въ ниже лежащемъ Тифлисѣ. Только глубокой снѣгъ загоняетъ ее иногда въ тифлисскіе сады. Но на высотѣ Тифлиса она всетаки остается лишь довольно короткое время — съ ноября по мартъ. Какъ видно изъ этого краткаго очерка, она имѣетъ мало общаго съ садовою овсянкой.

45. *Emberiza schoeniclus* Tschusii Reiser & Almasy. Камышевая овсянка.

Hartert, 198.

Я встрѣчалъ камышевую овсянку только въ февралѣ и мартѣ около Тифлиса на Соленомъ озерѣ. 2. II. 96 я убилъ парочку въ сырой балкѣ около упомянутаго озера, въ кустикахъ. Самецъ имѣлъ полный брачный нарядъ. 10. III. 96 я встрѣтилъ на озерѣ еще парочку: они летали по берегу и садились на плавающіе пучки камыша. Самое позднее, что я видѣлъ ихъ здѣсь, было 26. III. 900.

Я отношу ихъ къ подвиду *E. sch. Tschusii* по свидѣтельству Hartert'a (l. c. p. 198).

Сем. 5. *Alaudidae*. Жаворонковые.46. *Melanocorypha calandra* L. Большой степной жаворонокъ.47. *Melanocorypha bimaculata* Ménétr.

Мензбиръ, II, 435.

Къ сожалѣнію, какъ разъ лѣтніе экземпляры большихъ степныхъ жаворонковъ остались по большей части не опредѣленными, и я не знаю, куда ихъ дѣлъ Г. И. Радде; въ каталогъ Музея они не значатся. Поэтому я долженъ говорить объ обоихъ видахъ вмѣстѣ.

Степные жаворонки весьма обыкновенны во всѣхъ низменныхъ степяхъ восточнаго Закавказья, начиная отъ Тифлиса, а также въ степяхъ каспійскаго побережья и Сѣвернаго Кавказа.

Зимою около Тифлиса я убивалъ только *Melanocorypha calandra*; они остаются здѣсь до марта. Жаворонки же, гнѣздящіеся по каспійскому побережью, опредѣлены мною какъ *Melanocorypha bimaculata*. Оба вида наиболѣе любятъ пустынные полынные степи.

Гнѣздящійся видъ ковыльныхъ степей Сѣвернаго Кавказа опредѣленъ мною какъ *Melanocorypha calandra*.

Указаніе Hartert'a (I. с. 210) на гнѣздованіе *Melanocorypha bimaculata* на Талышинской низменности, т. е. въ южной части Ленкоранскаго уѣзда, очевидно, основано на недоразумѣніи, ибо тамъ нѣтъ ни степей, ни жаворонковъ.

48. *Calandrella brachydactyla* Leissl. Малый жаворонокъ.

Мензбиръ, II, 435.

Малый жаворонокъ найденъ мною гнѣздящимся въ горныхъ степяхъ около Тифлиса и на низменности Джеванширскаго уѣзда около Тертера. Въ началѣ мая 1899 г. онъ встрѣченъ мною на гнѣздовѣ въ степяхъ Ставропольской губерніи.

Собственно, я находилъ представителей рода *Calandrella* во всѣхъ степяхъ восточнаго Закавказья, прикаспійскихъ степяхъ (Кубинскій уѣздъ и Дагестанъ) и степяхъ Сѣвернаго Кавказа.

Какъ и представители предыдущаго рода, они любятъ пустынные полынные степи. Какъ проходитъ граница между обоими

видами, я не знаю опять таки потому, что мнѣ не удалось узнать опредѣленія многихъ изъ собранныхъ мною экземпляровъ. Поэтому для распространенія каждаго вида въ отдѣльности я привожу только тѣ мѣстности, откуда имѣю опредѣленные экземпляры.

Такимъ образомъ, область гнѣздовья *Calandrella brachydactyla* — западная часть восточно-кавказской низменности и степи Сѣвернаго Кавказа.

49. *Calandrella pisaletta* Pall. Сѣрый жаворонокъ.

Мензбиръ, II, 435.

Найденъ мною на гнѣздовѣ въ Елисаветпольскомъ уѣздѣ на Бозъ-дагѣ (25. IV. 95), на Мугани и въ степной части Кубинскаго уѣзда. Слѣдовательно, область гнѣздовья его лежитъ по Курѣ и каспійскому побережью.

50. *Galerida cristata caucasica* Tacz. Кавказскій хохлатый жаворонокъ.

Hartert, 230.

Одна изъ обыкновеннѣйшихъ птицъ всего Кавказскаго края. Держится предпочтительно на низменности, но по безлѣснымъ горамъ со степнымъ характеромъ поднимается и въ предгорья и встрѣчается также по высокимъ степямъ Эриванской губерніи и Карсской области. Всюду живетъ осѣдло. Часто поетъ, сидя на невысокомъ кустикѣ, особенно держи-дерева, чего не дѣлаютъ другіе жаворонки, кромѣ, конечно, лѣсного.

51. *Lulula arborea* L. Лѣсной жаворонокъ.

Мензбиръ, II, 452 (*Alauda arborea*).

Лѣсной жаворонокъ встрѣтился мнѣ всего только нѣсколько разъ. На весеннемъ пролетѣ я убилъ его 17. III. 96 подѣ Тифлисомъ.

20. V. 97 я нашелъ его несомнѣнно гнѣздящимся въ Талышинскихъ горахъ около с. Лирикъ. Наконецъ, 8. X. 900 я встрѣтилъ его въ смѣшанномъ лѣсу около Сарыкамышъ.

52. *Alauda arvensis* L. Полевой жаворонокъ.

Мензбиръ, II, 447.

Турагай (татарск.).

Обыкновенная осѣдлая птица всего Кавказа. Въ Закавказьѣ гнѣздится отъ высоты 2500 — 3000' до альпійскихъ луговъ: 26. V. 98 я встрѣтилъ его, напр., въ Талышинскихъ горахъ на высотѣ болѣе 7000' около селеній Руаруть и Кяльвязъ; 20. VI. 98 въ Дагестанѣ около аула Каранай, и въ другихъ мѣстностяхъ. Указаніе Радде на гнѣздованіе полевого жаворонка у Тифлиса слѣдуетъ понимать такъ, что гнѣзда жаворонковъ были принесены этому ученому въ Тифлисѣ. На высотѣ Тифлиса жаворонокъ этотъ не гнѣздится, а гнѣздится на высоколежащихъ надъ нимъ плоскихъ возвышенностяхъ со степнымъ характеромъ.

Зимой полевой жаворонокъ бываетъ весьма многочисленъ на низменности и около Тифлиса держится до конца марта.

Hartert говоритъ, что зимою на Сѣверномъ Кавказѣ очень обыкновененъ *Alauda arvensis cinerea* Ehmske, но я не зналъ отличій этой формы и поэтому не обратилъ на нее вниманія.

53. *Otocoris alpestris flava* Gmelin. Полярный жаворонокъ.Hartert, 255 (*Eremophila alpestris flava*).

Полярный жаворонокъ попадался мнѣ только на весеннемъ пролетѣ подъ Тифлисомъ (10. III. 96).

54. *Otocoris penicillata* Gould. Рогатый горный жаворонокъ.

Мензбиръ, II, 427.

Чернобровчикъ (духоборск.).

Я нашелъ этого рогатого жаворонка на гнѣздовьяхъ во многихъ мѣстностяхъ Дагестана, Малаго Кавказа и Закавказскаго плоскогорья, никогда не ниже 5000 — 6000'.

Въ суровыя зимы рогольки спускаются на низменность и бываютъ весьма многочисленны около Тифлиса, кормясь при глубокомъ снѣгѣ на дорогахъ. Въ нѣмецкой колоніи Александерсдорфъ около Тифлиса они забираются иногда даже въ конюшни, какъ и *Galerida cristata*.

Однако, и зимою они остаются въ значительномъ количествѣ на горахъ. Такъ, 9. III. 98 сильная мятель заставила меня оста-

новиться на станціи Хонашенъ по тракту изъ Агдама въ Ванкъ. Надъ снѣжными равнинами цѣлый день носились стайки рогольковъ. Рогольки обыкновенно очень быстро летятъ надъ самой землей и при этомъ издають своеобразный свистящій пискъ, чѣмъ очень напоминаютъ нѣкоторыхъ куликовъ. 7. XI. 96 при довольно ощутительномъ морозѣ и рѣзкомъ вѣтрѣ я встрѣтилъ ихъ около Кедабекскаго завода.

Долженъ замѣтить, вопреки мнѣнію Радде, что распространіе чернаго цвѣта у этого жаворонка очень постоянно, хотя, конечно, и зависитъ отъ возраста.

Нѣкоторыхъ молодыхъ, у которыхъ концы перьевъ еще не обносились, этотъ ученый принялъ за *O. alpestris*. Но и у нихъ черный цвѣтъ уже просвѣчиваетъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ онъ пока еще не проявился вполне, и легко можетъ быть обнаруженъ. Пролетные *O. alpestris* рѣзко отличаются отъ такихъ молодыхъ птицъ.

55. *Otocoris penicillata* subsp.? (*An albigula* Bonap.)?

? Hartert, 262 (*Eremophila alpestris albigula*).

Зимой 1895 года на Крестовомъ перевалѣ военно-грузинской дороги было убито нѣсколько рогатыхъ жаворонковъ какимъ то путешественникомъ, отдавшимъ ихъ для приготовленія шкурокъ одному мастеру въ Тифлисѣ, гдѣ я ихъ увидалъ.

Они имѣли расположеніе чернаго цвѣта, какъ у *O. penicillata**, но горло было не желтое, а чисто бѣлое.

Мнѣ такіе рогольки никогда не попадались.

Изъ описаній, данныхъ Hartert'омъ (l. c.), они ближе всего подходятъ къ его *Eremophila alpestris albigula* (Br.).

Сем. 6. *Motacillidae*. оКняковья.

56. *Anthus campestris* L. Полевой конекъ.

Мензбиръ, II, 748.

Я нашелъ полевого конька гнѣздящимся по всему побережью Каспійскаго моря отъ Дербента до Астары, разумѣется, въ подхо-

* Почему я и не могу считать ихъ за *O. Brandti* Dress.

дящихъ мѣстахъ; въ южной части Кубинскаго уѣзда и на Апшеронскомъ полуостровѣ его нѣтъ; затѣмъ, около Тифлиса и въ Карабахѣ въ предгорьяхъ, иногда уже довольно высоко. Въ Кубинскомъ уѣздѣ онъ встрѣченъ мною тоже въ предгорьяхъ. Полевой конекъ въ Карабахѣ и Кубинскомъ уѣздѣ попадался мнѣ только на поросшихъ хорошею травою мѣстахъ, около Тифлиса же онъ довольствуется и болѣе скудною растительностью, доставляющею ему, однако, весною достаточное прикрытіе для устройства гнѣзда.

Около Тифлиса полевой конекъ, повидимому, не живетъ осѣдло: я никогда не встрѣчалъ его здѣсь зимою. Появляется онъ здѣсь въ концѣ марта, а въ первой половинѣ апрѣля приступаетъ къ гнѣздовью. 11. IV. 99 я наблюдалъ, какъ они таскали соломинки для устройства гнѣзда. Въ началѣ іюня (6. VI. 96 въ Кубинскомъ уѣздѣ) мнѣ приходилось убивать молодыхъ. Весною, въ началѣ апрѣля, и осенью, въ концѣ августа, количество полевыхъ коньковъ подѣ Тифлисомъ замѣтно увеличивается, вѣроятно, пролетными экземплярами. Во второй половинѣ сентября они мнѣ болѣе не встрѣчались въ Закавказьѣ.

57. *Anthus trivialis* L. Лѣсной конекъ.

Мензбиръ, II, 753 (*Anthus arboreus*); Hartert, 272.

Лѣсной конекъ найденъ мною гнѣздящимся въ лѣсной области восточной части Большаго Кавказа (Кубинскій уѣздъ и южный Дагестанъ), Талышинскихъ горъ, Малаго Кавказа (Муровъ-дагъ) и западно-закавказскаго нагорья (Гельская лѣсная дача). Онъ живетъ здѣсь до границы лѣсной растительности, и 28. V. 95 одинъ экземпляръ былъ убитъ мною на Муровъ-дагѣ уже въ альпійской области.

Подѣ Тифлисомъ я встрѣчалъ лѣснаго конька только въ началѣ апрѣля на весеннемъ и въ началѣ октября на осеннемъ пролетахъ.

58. *Anthus pratensis* L. Луговой конекъ.

Мензбиръ, II, 761.

Я знаю лугового конька только какъ пролетную птицу восточнаго Закавказья. Можетъ быть, онъ и зимуетъ здѣсь, такъ какъ съ самаго моего приѣзда въ Сальяны во второй половинѣ февраля

1895 г. я наблюдалъ на выгонахъ около этого мѣстечка стайки щеврицъ, изъ которыхъ только 14. III мнѣ удалось наконецъ добыть одинъ экземпляръ, оказавшійся принадлежащимъ именно къ этому виду. 24. III того-же года я добылъ два экземпляра около мѣст. Джавать при слияніи Куры съ Араксомъ.

59. *Anthus spinoletta* L. Горный конекъ.

Мензбиръ, II, 745.

Обыкновенная птица альпійской области Большого и Малаго Кавказа. Вѣроятно, только при наступленіи очень большихъ холодовъ горные коньки покидаютъ мѣста своего гнѣздовья. 27. IV. 99 при весьма ощутительномъ холодѣ я наблюдалъ при переѣздѣ отъ Гудаура къ Коби по военно-грузинской дорогѣ стайки этихъ щеврицъ, весело бѣгавшія по свѣжнымъ полямъ.

15. VI. 901 я встрѣтилъ горныхъ коньковъ въ большомъ количествѣ гнѣздившимися у Гудаура. Безъ большого труда нашелъ я два гнѣзда, изъ которыхъ въ одномъ было 5, а въ другомъ 4 совершенно свѣжихъ яйца. Гнѣзда были устроены по склону горы и оба были защищены сверху, одно — камнемъ, другое — густымъ пучкомъ травы.

Въ октябрѣ и ноябрѣ я находилъ горныхъ коньковъ около Тифлиса. Кажется, это — единственный видъ *Anthus*, который здѣсь зимуетъ. Но и то я не помню, встрѣчалъ ли я здѣсь эту птичку въ декабрѣ и январѣ, а экземпляровъ этого времени теперь у меня нѣтъ.

60. *Budites flavus* L. et intermed. Желтая плиска.

Мензбиръ, II, 770 (*Motacilla flava*).

Желтыя плиски обыкновенны въ Закавказьѣ по сырмъ лугамъ и кочковатымъ болотамъ, но такихъ мѣстъ немного. Около Тифлиса желтыхъ плисокъ можно встрѣтить круглый годъ. Здѣсь она гнѣздится около Соленого озера (въ 8 верстахъ отъ Тифлиса). Весною и осенью кажется многочисленнѣе. Прилетаетъ она въ апрѣлѣ, а отлетаетъ, — вѣрнѣе, откочевываетъ, — въ августѣ. На каспійскомъ побережьѣ и, вѣроятно, въ мѣстностяхъ, лежащихъ ниже Тифлиса, она зимуетъ.

Каталогъ Кавказскаго Музея составленъ такъ безтолково, что трудно даже понять, какъ опредѣлилъ составитель его Г. И. Радде моихъ птицъ. Такъ ♂ убитый мною около Тифлиса 27. VIII. 95 обозначенъ „*Budites intermed. flav.*“ (№ 111 v.); два экземпляра,

добыты у Ленкорани 29. IV. 97 (№ 111 ee, ff) — „*Budites intermed. cinereoscap. typ.*“. Наконецъ, молодой экземпляръ № 111 ii опредѣленъ имъ какъ *Budites borealis*. Онъ былъ убитъ мною у Соленаго озера близъ Тифлиса 11. VIII. 96. У меня, къ сожалѣнію, нѣтъ ни времени, ни достаточной опытности, чтобы выяснитъ, что представляютъ на самомъ дѣлѣ эти формы, — поэтому я могу только пожелать, чтобы этотъ матеріалъ скорѣе попалъ въ надлежащія руки.

Въ концѣ апрѣля 1897 г. въ Ленкоранскомъ уѣздѣ по береговой полосѣ шелъ валовой пролетъ разныхъ желтыхъ плисокъ. 11. III. 95 я видѣлъ на Мугани значительныя стайки желтыхъ плисокъ, которыя держались очень строго и близко не подпускали.

Во время пролета плиски имѣютъ обыкновеніе держаться среди стадъ, чѣмъ очень затрудняютъ ихъ добычу.

61. *Budites melanocephalus* Feldegg Mich. Червоголовая плиска.

Мензбиръ, II, 776 (*Motacilla feldeggii* Mich.).

Въ Закавказьѣ внутри страны встрѣчается рѣдко, но очень обыкновенна на пролетѣ и гнѣздовѣ по берегу Каспійскаго моря въ Ленкоранскомъ уѣздѣ.

Первый разъ встрѣтилъ я этихъ плисокъ небольшими стаками по берегамъ разлива р. Аракса между Сальянами и Ленкоранью 9. IV. 97. Въ большомъ количествѣ нашелъ ихъ 16. V. 98 гнѣздящимися по морскому берегу у станціи Кумбаши. Немного времени спустя, именно 27. V. 97, я, къ удивленію своему, нашелъ этихъ же плисокъ гнѣздящимися на сырыхъ лугахъ около сел. Кяльвязъ на высотѣ около 7000'. Нигдѣ въ промежуткахъ между берегомъ моря и этою, уже альпійскою областью я черноголовой плиски не находилъ, да здѣсь имъ и держаться негдѣ, ибо все покрыто густымъ лѣсомъ.

По книгѣ проф. Мензбира я опредѣлилъ здѣшнихъ черноголовыхъ плисокъ какъ *Budites Feldeggii*, такъ какъ только у одной или двухъ я замѣтилъ на бровяхъ два, три желтыхъ перышка, у большинства же нѣтъ никакого намека на свѣтлую бровь.

62. *Budites campestris* Pall. Желтолобая плиска.

Мензбиръ, II, 767 (*Motacilla campestris*).

30. IV. 97 во время валового пролета желтыхъ плисокъ по берегу Каспійскаго моря около станц. Кумбаши я хорошо рассмотрѣлъ

среди других плисокъ одну, рѣзко отличавшуюся отъ нихъ, желтоголовую. 1. V. 98 добылъ одинъ экземпляръ (♂) на берегу моря около сел. Шахъ-Агачъ (12 в. къ югу отъ Ленкорани).

63. *Motacilla boarula melanope* Pall. Горная трясогузка.

Hartert, 300.

Довольно обыкновенна во всей горной области Закавказья. Въ восточномъ Закавказьѣ область ея гнѣздовья отъ предгорій поднимается по рѣчкамъ и ручьямъ до альпійской области. Въ мѣстахъ, обильныхъ осадками, она гнѣздится и на низменности. Такъ, въ Ленкоранскомъ уѣздѣ я нашелъ ее на р. Астаринкѣ (персидская граница) около селенія Алаша-кендъ 25. IV. 97, когда трясогузки, несомнѣнно, уже высиживали, такъ какъ, напр., 24. V. 98 я убилъ въ Талышинскихъ предгорьяхъ около сел. Тангевонъ молодую летную трясогузку этого вида. Также и на черноморскомъ побережьѣ я наблюдалъ ее въ іюлѣ 1906 г. близъ Кобулетъ на р. Дегва.

Но на жаркой сухой низменности она бываетъ только зимою. Въ Тифлисѣ горная трясогузка появляется въ октябрѣ и держится здѣсь до февраля. Чѣмъ хуже погода и чѣмъ глубже лежитъ снѣгъ, тѣмъ въ большемъ количествѣ она здѣсь появляется, даже на дворахъ самаго города.

Горная трясогузка любитъ лѣсъ и вообще хорошую растительность. 25. V. 95 я убилъ на спускѣ Сарсянгъ въ верховьяхъ р. Тертеръ парочку этихъ птичекъ на ручейкѣ, который текъ подъ сводами громадныхъ деревьевъ столь густыхъ, что къ ручейку почти не проникало солнце. И позднѣе я не разъ встрѣчалъ въ такихъ мѣстахъ горныхъ трясогузокъ въ Карабахѣ и Талышѣ. Но она встрѣчается и въ совершенно безлѣсныхъ мѣстностяхъ, какъ восточный Дагестанъ и сѣверные склоны Агридага (24. IX. 900 близъ сел. Орговъ).

64. *Motacilla alba* L. (subsp.?). Бѣлая трясогузка.

Мензбиръ, II, 784; Hartert, 302—304.

Радде опредѣлили собранныхъ мною бѣлыхъ трясогузокъ какъ *Motacilla alba* typ., *Mot. alba dukhunensis* Sykes, *M. baicalensis* Swinh., *M. intermedia alba* и *M. luzoniensis* Scop. Отъ такого списка можно притти въ отчаяніе. Къ тому же, просматривая даты, значащіяся на этихъ экземплярахъ, нельзя установить, что такая

то форма попадаетъ зимою, а такая то лѣтомъ, что внесло бы нѣкоторый свѣтъ въ отношеніе этихъ формъ другъ къ другу. Напротивъ: все перепутано въ самомъ фантастическомъ безпорядкѣ, и выходитъ, что всѣ формы встрѣчаются одновременно, и въ одномъ и томъ же мѣстѣ. Поэтому я думаю, что Радде здѣсь просто напуталъ. Несомнѣнно, на Кавказѣ гнѣздится только одна форма, которая живетъ тутъ осѣдло и отличается большимъ распространеніемъ бѣлаго цвѣта. Я не могу рѣшить, какъ ее правильнѣе назвать: *dukhunensis* или *baicalensis*? Формы эти очень близки другъ къ другу. Судя по общему географическому распространенію, это должна быть *Motacilla dukhunensis* Sykes, но рѣшать этотъ вопросъ я не берусь.

Типичная же сѣверная бѣлая трясогузка *Motacilla alba* L. встрѣчается здѣсь, вѣроятно, на пролетѣ или, быть можетъ, зимуетъ.

Область распространенія этой самой обыкновенной трясогузки въ Закавказьѣ — низменность и предгорья.

Въ самкѣ, убитой по р. Ахсу, близъ сел. Кычтанъ Шемахинскаго уѣзда С. V. 96, я нашелъ яйцо на-сносѣ, уже въ скорлупѣ.

Когда это уже было написано, я узналъ, что Бутурлинъ относитъ *закавказскую* бѣлую трясогузку къ подвиду *Motacilla alba orientalis* Zarudn., который Hartert отождествляетъ съ *M. a. dukhunensis*.

Сем. 7. Certhiidae. Пищуховыя.

65. *Certhia familiaris caucasica* Buturlin. Пищуха кавказская.

Buturlin, Reichenow's Ornith. Monatsber., Jan. 1907, p. 8.

Какъ гнѣздящаяся птица, пищуха принадлежитъ верхнему поясу лѣса. Гнѣздится преимущественно въ хвойныхъ лѣсахъ, но иногда и въ лиственныхъ: такъ, я встрѣтилъ ее 25. V. 95 на склонѣ Муровъ-дага близъ сел. Гасапризъ. Осенью я встрѣчалъ ее на восточныхъ склонахъ Месхійскаго хребта и въ Гельской лѣсной дачѣ на окраинѣ Гельской котловины (Ардаганскій округъ). Зимую пищуха спускается на низменность, и я наблюдалъ ее тогда въ разныхъ пунктахъ долины р. Куры. Въ Тифлисѣ она попадалась мнѣ съ половины октября до начала марта, но всего

многочисленнѣе бывала въ подбѣ. 22. XI. 906 я добылъ ее въ ущельѣ Чороха въ сел. Верхн. Мараиди.

У лѣснаго Бртека я видѣлъ цѣлую серію гнѣздъ пищухи, собранныхъ имъ въ Бакуріанахъ. Всѣ они были построены по одному типу: между отставшею корою и стволомъ на соснахъ.

По Бутурлину (1. с.), кавказская пищуха отличается менѣе чистою окраской нижней стороны и болѣе длинными хвостомъ и клювомъ.

66. *Tichodroma muraria* L. Стѣнолазь.

Мензбиръ, II, 666.

Я всего три раза наблюдалъ эту рѣдкую красивую птицу: въ іюнѣ 1901 г. на военно-грузинской дорогѣ близъ Дарьяльскаго ущелья, въ Дагестанѣ и въ ущельѣ Чороха близъ Артина. Въ коллекціи Шелковникова былъ экземпляръ убитой въ Нухинскомъ уѣздѣ, — слѣдовательно, на южномъ склонѣ Кавказскаго хребта.

Сем. 8. Sittidae. Поползневия.

67. *Sitta europaea caucasica* Reich. Кавказскій поползень.

Hartert, 333.

Я встрѣтилъ кавказскаго поползня почти во всѣхъ лѣсахъ восточнаго Закавказья какъ на низменности, такъ и въ горахъ до высоты приблизительно 6000': въ лѣсахъ Карабаха, по верховьямъ р. Тертера, близъ сел. Гасанриза на склонахъ Муровъ-дага, въ Талышѣ на уровнѣ моря и въ нижнемъ поясѣ лѣса, и въ низменныхъ лѣсахъ по р. Курѣ. Въ особенно большомъ количествѣ встрѣтилъ я его въ послѣднемъ мѣстѣ, именно въ лѣсистомъ мѣстѣ Самухъ при слияніи съ Курою Іоры и Алазани. Здѣсь 28. IV. 97 поползни летали уже выводками, но молодыхъ еще легко можно было отличить отъ взрослыхъ. Большія синицы (*Parus major*) здѣсь въ это время тоже уже вывели, но ихъ молодые еще не летали. На низменности поползень, вѣроятно, живетъ осѣдло, такъ какъ въ Тифлисѣ я часто наблюдалъ его и съ ноября по февраль.

Когда это было уже напечатано, С. А. Бутурлинъ обратилъ мое вниманіе на то, что талышинскій поползень, отличающійся очень яркой окраской и особенно большимъ, грубымъ клювомъ, описанъ Н. А. Заруднымъ въ „Ornith. Jahrb.“, XVI (1905), p. 140 подъ именемъ *Sitta rubiginosa*. На величину клюва ленокранскаго поползня указывалъ еще Радде.

68. *Sitta Krüperi* Pelz. Рыжегрудый поползень.

Мензбиръ, II, 800.

Въ августѣ 1902 г., при переходѣ изъ Гуріи въ Ахалцихскій уѣздъ черезъ Месхійскій хребетъ, я встрѣтилъ рыжегрудаго поползня въ большомъ количествѣ въ еловыхъ лѣсахъ и добылъ нѣсколько экземпляровъ. Этотъ поползень чрезвычайно обыкновененъ также въ Боржомѣ и расположенномъ выше него селеніи Бакуріаны. Здѣсь рыжегрудый поползень гнѣздится, и лѣсничій Бртекъ показывалъ мнѣ его гнѣзда, найденныя въ Бакуріанахъ и попавшія потомъ въ Кавказскій Музей.

Не одно лѣто прожилъ Г. И. Радде въ Боржомѣ, но что то все мѣшало ему обратить вниманіе на эту птицу, отчего она и пропущена въ его „*Ornis caucasica*“.

69. *Sitta syriaca parva* Buturlin. Кавказскій скалистый поползень.

Buturlin, Ibis, 1906, p. 417.

Скалистый поползень встрѣчался мнѣ главнымъ образомъ въ безплодныхъ горахъ Эриванской губерніи и Карсской области. Здѣсь онъ лазаетъ по отвѣснымъ скаламъ и обрывамъ. Его громкій голосъ слышенъ издалека. Моихъ наблюденій недостаточно для выясненія его вертикальнаго распространенія, тѣмъ болѣе, что въ западномъ Закавказьѣ я бывалъ только осенью. Я нашелъ его: 1. IX. 900 близъ монастыря Кегартъ въ ущельѣ того же имени, гдѣ, по словамъ настоятеля этого монастыря, онъ живетъ круглый годъ; на сѣверныхъ склонахъ Агри-дага близъ селенія Орговъ, и во многихъ другихъ мѣстностяхъ западнаго Закавказья. При подъѣмѣ изъ ущелья Аракса близъ Кагызмана, у сел. Карабагъ, на Закавказское плоскогорье (3. X. 900) три скалистыхъ поползня очень забавляли меня своимъ поведеніемъ. Они перелетали съ мѣста на мѣсто, усаживались въ - кружокъ головами другъ къ

другу, распускали крылышки и кричали и вертѣлись самымъ невозможнымъ образомъ. Затѣмъ, напрыгавшись здѣсь, перелетали на другое мѣсто и продѣлывали тамъ то же самое. Что могло означать это у нихъ въ такое позднее время года?

Бутурлинъ (I. с.) описалъ недавно эту форму скалистаго поползня изъ Ахалциха; но я не знаю, принадлежать ли къ ней всѣ наблюдавшіеся мною представители этого вида; добытые же мною экземпляры рыжихъ пятенъ на внутреннихъ опахалахъ крайнихъ рулевыхъ не имѣли.

Сем. 9. Regulidae. Корольковыя.

70. *Regulus regulus* L. Желтоволосый королекъ.

Мензбиръ, II, 849 (*Regulus cristatus*); Hartert, 394.

Желтоволосый королекъ попадался мнѣ только зимою на низменности въ долину Куры, гдѣ онъ задерживается до начала марта. Глубокою осенью я наблюдалъ его также въ Сарыкамышѣ и Гельской лѣсной дачѣ. Но въ послѣднемъ пунктѣ я его не добылъ и не вполне увѣренъ, что это былъ именно описываемый видъ.

Сем. 10. Paridae. Синицевыя.

71, a. *Parus major* L. Большая синица.

Мензбиръ, II, 828.

71, b. *Parus major caspius* Zarudn. et Loudon.

Zarudny und Loudon, Reichenow's Ornith. Monatsber., Jun./Jul. 1905, p. 108.

Обыкновеннѣйшая птица всего Кавказскаго края. Въ большомъ количествѣ гнѣздится на низменности въ садахъ и прирѣчныхъ лѣсахъ, но не поднимается высоко въ горы. Радде приводитъ въ своемъ каталогѣ синицъ изъ Боржома съ датой „V. 96“, но это еще не доказываетъ, что она тамъ гнѣздится, ибо въ это время большія синицы иногда уже бродятъ выводками. Какъ бы то ни было, а мнѣ на гнѣздовѣ большая синица никогда не

попадалась высоко въ горахъ, даже въ верхней полосѣ лѣса. Любимое мѣстопробываніе большой синицы въ восточномъ Закавказьѣ — заросли по рѣкамъ и сады. Время вывода дѣтей у большихъ синицъ значительно колеблется. 28. III. 96 въ самкѣ, убитой въ паркѣ Мухтандъ (Тифлисъ), я нашелъ яйцо на-сносѣ; 17. V. 95 у устья р. Тертеръ (близъ сел. Алпаутъ Джеванширскаго уѣзда) большія синицы уже летали выводками. 23. V. 94 въ сел. Калагойны близъ слиянія Куры и Аракса въ одномъ изъ столбовъ, подпирающихъ вышку, я нашелъ гнѣздо, въ которомъ были еще не оперившіяся дѣти.

Съ сентября около Тифлиса и во всѣхъ садахъ города большая синица появляется въ огромномъ количествѣ. При своихъ кочевкахъ она часто посѣщаетъ и совершенно безлѣсныя мѣстности и держится въ маленькихъ кустикахъ.

Прикаспійская форма отдѣлена Заруднымъ и Лоудономъ въ особый подвиѣ *P. m. caspius*, весьма, впрочемъ, слабо отличающійся.

72, a. *Periparus ater* Michalowskii Bogd. Кавказская черная синица.

Hartert, 360 (*Parus ater michalowskii*).

72, b. *Periparus ater* Derjugini Zarudn. et Loudon.

Hartert, 360 (*Parus ater derjugini*).

72, c. *Periparus ater* phaenotus Blanf.

Hartert, 361.

Я не могу съ увѣренностью указать область гнѣздовья черной синицы.

Въ виду того, что я нашелъ въ предгорьяхъ Талышинскихъ горъ 13. III. 99 около селенія Борджалы (Подгорное тожъ) много птичекъ этого вида, которыя усердно пѣли, я думаю, что онѣ здѣсь и гнѣздятся. Но нигдѣ болѣе въ такое раннее время я ихъ не наблюдалъ. Въ концѣ мая 1895 года (25—28. V) я встрѣтилъ черныхъ синицъ въ лѣсахъ по склону Муровъ-дага до границы лѣсной растительности и добылъ тутъ какъ старыхъ, такъ и молодыхъ. 9. VI. 94 въ садахъ селенія Рафиденлу онѣ летали выводками. 30. VIII и 15—16. IX. 902 я встрѣтилъ ихъ въ разныхъ мѣстахъ въ сосновыхъ лѣсахъ къ западу отъ Гельской котловины.

Зимою она попадаетъ маленькими стайками въ садахъ Тифлиса. Въ 1906 г. первую такую стайку я замѣтилъ 23. X. Въ 1894 и 1895 гг. я наблюдалъ ее въ паркѣ Муптаидъ только въ ноябрѣ. Лѣсничій Бртекъ нашелъ нѣсколько гнѣздъ этого (?) вида въ Бакуріанахъ. Они помѣчены въ каталогѣ Кавказскаго Музея 20. V. 98. Но, означаетъ ли это время нахожденія гнѣзда или поступленія его въ Музей, рѣшить теперь трудно. Къ сожалѣнію, самъ Бртекъ вовсе не писалъ этикетокъ къ собираемымъ имъ предметамъ.

Hartert называетъ закавказскую черную синицу *Parus ater michalowskii* Bogdanow, а Зарудный и Лоудонъ описали въ последнее время еще *Parus ater derjugini*. Кромѣ того въ Талышѣ и по Араксу живетъ несомнѣнно *P. a. phaenotus*. Я не берусь и не могу разбирать эти подвиды, но замѣчу, что, вѣроятно, *P. a. Michalowskii* свойственна западному Закавказью, а упомянутые мною экземпляры изъ гелъскихъ лѣсовъ легко, можетъ быть, относятся именно къ *P. a. derjugini*, равно какъ и наблюдавшіеся мною въ ноябрѣ 1906 г. въ ущельѣ Чороха (Артвинскій округъ).

73. *Cyanistes coeruleus* L. Лазоревка.

Мензбиръ, II, 806.

На низменностяхъ восточнаго Закавказья и предгорьяхъ осѣдлая птица. Особенно многочисленна въ заросляхъ по Курѣ отъ Тифлиса до Сальянъ и въ Талышинской низменности.

Въ предгорьяхъ Джеванширскаго уѣзда я убилъ молодую 25. V. 95. Высоко въ горахъ, даже въ верхнемъ поясѣ лѣса я никогда лазоревки не наблюдалъ, хотя, по Радде, она и водится еще въ Боржомѣ. Зимою въ долинѣ Куры число ихъ значительно увеличивается.

По имѣющимся въ доступной мнѣ литературѣ даннымъ я не могъ выяснитъ, относится ли наша лазоревка къ типичной формѣ или нѣтъ.

74. *Aegithalos irbyi caucasicus* Lorenz. Кавказская долгохвостая синица.

Мензбиръ, II, 837 (*Acredula*).

Также обыкновенная гнѣздящаяся птица Кавказа. Часто встрѣчается во всѣхъ лѣсахъ низменныхъ и горныхъ, за исключеніемъ Талыша, гдѣ вполне замѣнена слѣдующимъ видомъ.

3. III. 96 въ убитой на низменности Арешскаго уѣзда самкѣ я нашель уже яйцо на-сносѣ. 23. V. 96 на Кубинской низменности я встрѣтилъ этихъ синицъ летающими выводками. Молодыхъ легко было узнать по короткому хвосту. Зимой стайки долгохвостыхъ синицъ бродятъ повсюду и часто попадаютъ въ тифлисскихъ садахъ.

75. *Aegithalos tephronotus* Günth. Талышинская долгохвостая синица.

Мензбиръ, II, 837 (*Acredula*).

Обыкновенная осѣдлая птица талышинскихъ лѣсовъ. Я встрѣчалъ здѣсь выводки уже съ половины апрѣля.

76. *Anthoscopus pendulinus caspius* Poelzam. Каспійскій ремезъ.
Hartert, 390.

Ремезъ обыкновененъ, хотя и мало замѣтенъ по всѣмъ рѣчнымъ долинамъ восточнаго Закавказья и побережью Каспійскаго моря. Я чаще находилъ его старыя гнѣзда, которыя очень замѣтны зимою, чѣмъ самое птичку. Последнюю я наблюдалъ только въ Саллянахъ и на Талышинской низменности. Гнѣзда они строятъ обыкновенно на свѣшивающихся, по большей части надъ водою, вѣтвяхъ ивы, между двумя расходящимися сучками. 14. VI. 97 я нашель въ Саллянахъ только что начатое гнѣздо, помѣщавшееся въ развилинѣ нависшей надъ Курюю вѣтки, и слѣдилъ за его постройкой до 17. VI, когда долженъ былъ уфхаты. Матеріаломъ для постройки служилъ ивовый пухъ, который усердно таскали обѣ птички. За 2^{1/2} сутокъ наблюденія онѣ удлиннили гнѣздо всего на толщину большого пальца.

Пустыя гнѣзда ремезовъ въ значительномъ количествѣ я находилъ недалеко отъ Тифлиса въ маленькомъ лѣскѣ по правому берегу Кумы противъ ст. Авчалы, въ Джаватѣ, Аралыхѣ и др. мѣстахъ.

77. *Panurus biarmicus russicus* Brehm. Усатая синица.

Hartert, 405.

Въ подходящихъ мѣстахъ живетъ по всему каспійскому побережью отъ Ленкорани до устья Волги, какъ я могъ убѣдиться по шкуркамъ въ коллекціяхъ разныхъ любителей. Въ Ленкорани я видѣлъ у лѣсничаго П. О. Василевскаго экземпляръ, добытый въ камышахъ Ленкоранскаго морца (Ольховское озеро).

По письменному сообщенію О. Д. Плеске, встрѣчается и въ низовьяхъ Кубани и въ Терской области.

Сем. 11. Laniidae. Сорокопутовые.

78, а. *Enneoctonus collurio* L. Жуланъ.

Мензбиръ, II, 717 (*Lanius collurio*).

78, б. *Enneoctonus collurio Kobylini* Buturlin. Закавказскій жуланъ.

Buturlin, Ibis, 1906, p. 416.

Обыкновеннѣйшая птица всего Кавказскаго края. Я встрѣчалъ его въ подходящихъ мѣстахъ рѣшительно повсюду, но чаще всего онъ встрѣчается все же на низменности. Любимѣйшее мѣстопробываніе жулана — изгороди вокругъ садовъ и обработанныхъ полей. По дорогамъ и изгородямъ онъ поднимается высоко въ горы, но въ альпійской области я его никогда не видалъ. Излишне, пожалуй, говорить, что онъ не встрѣчается ни въ сплошныхъ густыхъ лѣсахъ, ни среди лишенной даже кустиковъ степи. Но въ саду Лѣтней Трухменской ставки, кругомъ которой на большое протяженіе тянутся лишенные всякой кустарниковой заросли степи, жуланъ гнѣздится. На черноморскомъ побережьѣ около Кобулетъ это — положительно самая обыкновенная птица, встрѣчающаяся на каждомъ шагу, тогда какъ авифауна тамъ вообще бѣдна.

Въ восточное Закавказье жуланъ прилетаетъ въ самомъ началѣ апрѣля, въ Тифлисъ въ 1895 г. прилетѣлъ 7. IV. Около половины іюня встрѣчаются молодые еще плохо летающіе. Исчезаетъ изъ Закавказья довольно рано, уже въ августѣ; въ послѣднихъ числахъ этого мѣсяца я уже никогда его не встрѣчалъ.

С. А. Бутурлинъ въ недавнее время описалъ (Ibis, 1906, p. 416) жулана западнаго Закавказья какъ особый подвижъ *Enneoctonus collurio Kobylini*. Еще раньше на особенности закавказскаго жулана (изъ Ленкорани) указывалъ Радде и сѣверно-кавказскаго — Лоренцъ. Поэтому, вѣроятно, всѣ кавказскіе жуланы относятся именно къ этому подвиду, но, можетъ быть, на Сѣверномъ Кавказѣ, напримѣръ, въ ставропольскихъ степяхъ, встрѣчается и типичная форма, почему въ заголовкѣ этой статьи я и ставлю оба названія.

79. *Lanius senator* L. Красноголовый сорокопуть.Мензбиръ, II, 715 (*Lanius rufus*); Hartert, 434.

Я встрѣтилъ этого сорокопута только по Бозъ-дагу. 3. V. 95 убилъ одного, вѣроятно, пролетного, на этой возвышенности въ Елисаветпольскомъ у., и въ значительномъ количествѣ встрѣчалъ его въ ущельяхъ Бозъ-дага въ Арешскомъ у. Экскурсируя 16. V. 94 вмѣстѣ съ А. Б. Шелковниковымъ, мы нашли въ одномъ изъ ущелій вышеупомянутой возвышенности нѣсколько гнѣздъ красно-головатаго сорокопута, которыя помѣщались довольно открыто въ кустахъ держи-дерева (*Paliurus australis*).

80. *Lanius minor* Gmel. Черноголовый сорокопуть.

Мензбиръ, II, 723.

Очень обыкновененъ повсюду на низменности и невысоко въ предгорьяхъ. На Сѣверномъ Кавказѣ я нашелъ его гнѣздящимся въ Лѣтней Трухменской ставкѣ. Держится въ садахъ, мелколѣсѣхъ и рѣчныхъ долинахъ. 27. IV. 95 въ Елисаветпольскомъ у. на Курѣ я встрѣтилъ, очевидно, только что прилетѣвшую стайку этихъ птицъ. Въ восточномъ Закавказьѣ улетаетъ въ августъ, — кажется, еще раньше жулана.

Вильконскій считаетъ его не гнѣздящимся въ изслѣдованной имъ мѣстности, но въ концѣ іюля я нашелъ въ дельтѣ р. Кинтришъ выводокъ, державшійся въ чащѣ, гдѣ, очевидно, было ихъ гнѣздо. Не думаю, чтобы такіе молодые выводки были способны на длинныя перекочевки.

81. ? *Lanius excubitor* L. Большой сорокопуть.

Мензбиръ, II, 728.

6. XI. 96 я убилъ одного большого сорокопута въ нагорной части Елисаветпольскаго у. близъ селенія Ново-Горѣлое. Онъ ѣлъ полевку, насаженную на сухую колючку.

Сем. 12. *Ampelidae*. Свиристелевыя.82. *Bombycilla garrula* L. Свиристель.Мензбиръ, II, 708 (*Ampelis garrulus*); Hartert, 456.

Въ суровыя зимы мѣстные охотники часто приносили мнѣ для опредѣленія свиристелей, убитыхъ около Тифлиса или въ лѣсахъ

Тифлисского уѣзда. Птица эта появляется здѣсь всегда маленькими стайками и служить предвѣстникомъ холодной зимы.

Сем. 13. Sylviidae. Славковые.

83. *Aëdon familiaris* Ménétr. Краснохвостка, тугайный соловей.

Мензбиръ, II, 974 (*Sylvia familiaris*).

Краснохвостка обыкновенна во всей низменности восточнаго Закавказья, но держится только на низменности, нисколько не поднимаясь въ предгорья. Самый западный пунктъ, гдѣ я ее встрѣтилъ, очевидно, еще на прилетѣ — сел. Мансурлы Елисаветпольскаго уѣзда на Курѣ (2. V. 95) и сел. Бабы на Араксѣ (Джебранльскаго уѣзда). По побережью Каспійскаго моря эта птичка еще очень обыкновенна въ южной, степной части Кубинскаго уѣзда, но въ сѣверной, лѣсной его части уже не встрѣчается.

Я встрѣчалъ тугайнаго соловья обыкновенно въ безплодныхъ выжженныхъ солнцемъ мѣстахъ со скудною растительностью. Если замѣтишь гдѣ нибудь среди солончака два-три кустика тамариска, то, навѣрное, здѣсь же встрѣтишь и *Aëdon familiaris*. Онъ любитъ также находящіеся среди степи сухія канавы и рвы, которые, вѣроятно, представляютъ ему удобство для устройства гнѣзда. Человѣка онъ боится мало и охотно держится среди самыхъ селеній и гнѣздится даже въ маленькихъ палисадникахъ передъ домами (Сальяны).

Прилетаетъ эта интересная птичка въ восточное Закавказье въ самомъ началѣ мая; отлета мнѣ наблюдать не приходилось, такъ какъ осенью я никогда не бывалъ въ обитаемыхъ ею мѣстахъ.

Хотя я и не занимаюсь специально систематикой птицъ, но не могу не высказать здѣсь, что, по моему мнѣнію, тугайный соловей вполне заслуживаетъ того, чтобы быть отдѣленнымъ отъ славокъ въ особый родъ. Кто видѣлъ его на волѣ, вполне согласится со мною, что по своимъ повадкамъ онъ скорѣе напоминаетъ чекана, чѣмъ славку. Подобно чекану онъ избѣгаетъ густой растительности, обыкновенно прыгаетъ по землѣ и, вскочивъ на какую нибудь кочку или камень, въ два пріема задираетъ кверху хвостикъ и „чакаетъ“ совсѣмъ какъ чеканъ. Только когда онъ поетъ, садится гдѣ нибудь на кустикъ, — однако, невысоко отъ земли. Пѣніе его чрезвычайно пріятно и превосходить пѣніе соловья Гафиза.

Долженъ замѣтить здѣсь, что слово „бюль-бюль“ переводить обыкновенно *соловей*, и такового оно дѣйствительно обозначаетъ книжно. Но народъ называетъ этимъ именемъ вообще всякую маленькую пѣвчую птичку. Одинъ мулла рассказывалъ мнѣ, что бюльбюлей есть семь сортовъ: красный, желтый и т. д.

84. *Sylvia nisoria* Bechst. Ястребинная славка.

Мензбиръ, II, 946.

Я встрѣчалъ ястребинную славку во второй половинѣ апрѣля на Талышинской низменности (сел. Вель, 19. V. 97) и въ концѣ этого мѣсяца въ долинѣ р. Куры, гдѣ, по Радде, она гнѣздится, именно 26. V. 95 въ садахъ сел. Карасахкаль на Курѣ (Елисаветпольскаго уѣзда). Но вообще это — довольно рѣдкая здѣсь птица.

85. *Sylvia cinerea fuscipile* Landb. Сѣрая славка.

Мензбиръ, II, 950.

На низменности восточнаго Закавказья сѣрая славка обыкновенна повсюду, но распространена преимущественно на низменности и только невысоко поднимается въ предгорья. Держится она въ густомъ кустарникѣ какъ среди рѣчныхъ тугаевъ, такъ и въ открытой степи. Любитъ кустики гребенщика (*Tamarix*), гдѣ встрѣчается вмѣстѣ съ *Aëdon familiaris* и *Sylvia mystacea*.

86. *Sylvia hortensis* Bechst. Садовая славка.

Мензбиръ, II, 955.

Въ восточномъ Закавказьѣ столь же рѣдка, какъ и ястребинная славка. На гнѣздовьяхъ я наблюдалъ ее, собственно, только одинъ разъ — 12. V. 96 въ сел. Ахсу Шемахинскаго уѣзда у южнаго подножья Кавказскаго хребта, еще на низменности.

На весеннемъ пролетѣ въ Тифлисѣ я наблюдалъ ее въ началѣ апрѣля (6. IV. 98), на осеннемъ — во второй половинѣ августа (21. VIII. 96).

87. *Sylvia curruca* L. Славка-завирушка.

Мензбиръ, II, 960.

Славка-пересмѣшка довольно обыкновенна на низменности восточнаго Закавказья и въ лѣсномъ поясѣ поднимается довольно

высоко въ горы: такъ, я встрѣтилъ ее въ предгорьяхъ Муровъ-дага (24. V. 95) и въ горной части Кубинскаго уѣзда.

Экземпляры, добытые 30. IV. 97 на островѣ Сари, отличались довольно замѣтно отъ другихъ, но, къ сожалѣнію, были потеряны при возвращеніи оттуда.

Я упоминалъ уже, что Радде уничтожилъ мои этикетки и написалъ свои, при чемъ страшно все перепуталъ. Въ особенности это относится къ этому виду. Экземпляры № 47 f—1, помѣченные „Тифлисъ, 29. VIII. 93“, убиты не въ Тифлисѣ и не въ указанное время, ибо въ 1893 г. я здѣсь птицъ еще не собиралъ.

Осенній пролетъ въ Тифлисѣ бываетъ въ концѣ августа.

88. *Sylvia mystacea* Ménétr. Усатая славка.

Мензбиръ, II, 964.

Первый разъ я встрѣтилъ парочку этихъ птичекъ недалеко отъ слиянія Куры съ Араксомъ около селенія Джеватъ въ маленькихъ кустикахъ по берегу Аракса 23. III. 95. На другой день я нашелъ ихъ во множествѣ въ садахъ сел. Калагойны на Араксѣ, въ трехъ верстахъ отъ устья, на муганской сторонѣ. Самцы усердно пѣли. Во время дальнѣйшаго моего путешествія въ томъ-же году мнѣ удалось прослѣдить усатую славку до сел. Алабашлы Елизаветпольскаго уѣзда на западъ, — западнѣе я не изслѣдовалъ, — т. е. почти до рѣчки Шамхоръ.

Въ 1897 году я во множествѣ нашелъ ее около Сальянъ и отсюда къ югу вплоть до Ленкорани и Астары.

Такимъ образомъ, оказалось, что видъ этотъ распространенъ по всей низменной части долины р. Куры и при томъ вездѣ здѣсь обыкновененъ. По каспійскому же побережью я прослѣдилъ его отъ нашей персидской границы къ сѣверу до рѣчки Чагаджикъ-чай въ Кубинскомъ уѣздѣ, гдѣ встрѣтилъ его 26. VI. 96 въ мелкихъ чахлахъ заросляхъ иштата и другихъ колючихъ деревьяхъ. Убитыя здѣсь птицы были старыя, въ очень обтрепанномъ перѣ.

Усатая славка держится преимущественно въ садахъ и небольшихъ кустикахъ, особенно въ гребенщикѣ, который небольшими группами попадаетъ и среди голой степи. Въ лѣсахъ и густыхъ заросляхъ, „джонгляхъ“, какъ ихъ называетъ Радде, я никогда ее не встрѣчалъ. Весною, скоро послѣ прилета, эта птичка вовсе не боязлива и подпускаетъ очень близко, такъ что въ это время

очень легко можно добыть сколько угодно экземпляровъ. Но позже она становится очень осторожною; къ тому же, растительность развивается, кустарники покрываются листьями, и найти усатую славку въ маѣ уже трудно. 2. VI. 97 въ Сальянахъ, въ тѣхъ мѣстахъ, которыя въ апрѣлѣ кишѣли этими славками, очевидно, здѣсь гнѣздящимися, я не встрѣтилъ уже ни одной, несмотря на самые тщательные поиски. Вѣроятно, послѣ вывода молодыхъ онѣ откочевываютъ въ другое мѣсто.

Усатая славка — очень подвижная птичка и, подобно пѣночкамъ, находится въ непрестанномъ движеніи. Въ брачную пору самецъ на короткое время выбирается на выдающійся сучекъ, поетъ свою хорошенькую пѣсенку и снова ныряетъ въ чащу.

89. *Sylvia atricapilla* L. Черноголовая славка.

Мензбиръ, II, 966.

Черноголовка гнѣздится по садамъ и тугаямъ низменности восточнаго Закавказья, а также, вѣроятно, и въ предгорьяхъ. Относительно послѣднихъ у меня есть, впрочемъ, только одно свое личное наблюденіе, именно я слышалъ въ горной части Шемахинскаго уѣзда въ сел. Астраханкѣ ея характерное пѣніе 19. V. 96. На низменности же я находилъ ее около сел. Бегманлу Джебраилскаго уѣзда (7. VI. 94) на Араксѣ, въ часто уже упоминавшемся сел. Ахсу Шемахинскаго уѣзда (12. V. 96), и на Талышинской низменности около пограничнаго мѣстечка Астара (21. IV. 97). Около Тифлиса она появляется въ концѣ марта и исчезаетъ въ концѣ сентября. 7. IV. 96 я наблюдалъ здѣсь цѣлую стайку этихъ птичекъ, очевидно, пролетную.

90. *Phylloscopus nitidus* Blyth. Желтобрюхая пѣночка.

Мензбиръ, II, 916.

Желтобрюхая пѣночка — довольно обыкновенная птица лѣсовъ и садовъ восточной части Кавказскаго хребта. Я нашелъ ее гнѣздящеюся въ Шемахинскомъ уѣздѣ: въ садахъ сел. Маразы, на родникѣ Халтава (2. V. 96), въ Астраханкѣ (5. V. 96) на южномъ склонѣ хребта и въ лѣсу у сел. Алты-агачъ, на самомъ перевалѣ, здѣсь очень невысокомъ (20. V. 96); на сѣверномъ склонѣ хребта — въ лѣсахъ горной части Кубинскаго уѣзда, близъ сел. Сусай (15. VI. 96) и др.

Въ Ленкоранскомъ уѣздѣ, какъ о томъ отмѣтилъ въ своемъ каталогѣ Радде, *я ея не находилъ*. Экземпляръ, помѣченный этимъ ученымъ, по непонятнымъ мнѣ причинамъ, какъ найденный въ Ленкоранскомъ уѣздѣ (№ 58 f), на самомъ дѣлѣ добытъ мною въ сел. Астраханкѣ Шемахинскаго уѣзда.

91. *Phylloscopus trochillus* L. Пѣночка-весничка.

Мензбиръ, II, 926.

Лѣтомъ въ Закавказьѣ я нигдѣ не встрѣчалъ пѣночки-веснички.

Весною она появляется въ Тифлисѣ гораздо позже пѣночки-кузнечика, именно въ первой половинѣ апрѣля, и въ долинѣ р. Куры задерживается до конца этого мѣсяца. Въ Ленкоранскомъ же уѣздѣ она встрѣчается уже въ началѣ марта (4. III. 96).

Осенью весничка появляется тоже раньше кузнечика, именно уже въ первой половинѣ августа и держится здѣсь до начала сентября.

92. *Phylloscopus collybita* Vieill. Пѣночка-кузнечикъ.

Мензбиръ, II, 931.

На гнѣздовьяхъ я нашелъ пѣночку-кузнечика въ лѣсномъ поясѣ центрального Закавказья и южнаго Дагестана. Гнѣздится ли она на низменности, я не знаю.

Весною она появляется около Тифлиса въ началѣ марта и держится до начала апрѣля, а осенью въ началѣ октября. Какъ весенній, такъ и осенній пролетъ этой пѣночки очень обилень и всѣ окрестные кусты и самые сады города во время валового пролета бываютъ полны этими птичками. Держатся онѣ, однако, вразсыпную.

93. *Phylloscopus Lorenzi* Severts. Кавказская пѣночка.

Lorenz, Beitr. z. Kenntniss der Ornithol. Fauna an d. Nordseite des Kaukasus, p. 28; Мензбиръ, II, 937 (*Ph. sindianus*); Hartert, 506.

Только однажды, именно 22. X. 95 я добылъ одинъ экземпляръ этого вида въ паркѣ Мухтаидъ въ Тифлисѣ.

Курьезно, что этотъ экземпляръ отмѣченъ въ каталогѣ Радде и подъ именемъ *Ph. sindianus* и подъ именемъ *Ph. tristis*.

94. *Nypolais icterina* Vieill. Лѣсная малиновка.

Мензбиръ, II, 903.

Я нашелъ лѣсную малиновку гнѣздящуюся въ большомъ числѣ въ узкомъ ущельѣ р. Ленкоранки близъ сел. Руа, а затѣмъ и въ другихъ мѣстахъ Талышинской низменности, напр., въ лѣсу около селенія Бутасаръ.

Ущелье р. Ленкоранки близъ сел. Руа было удивительно похоже на средне-русскій лѣсной оврагъ, вродѣ тѣхъ, которые въ бывшее время прорѣзывали Воробьевы горы подъ Москвой. Стѣны его, конечно, были грандіознѣе, но такъ же круты, а дно такъ же ровно и такъ же поросло тонкими высокими ольхами, на верхушкахъ которыхъ и пѣли лѣсныя малиновки. Тутъ же жили западный соловей и сѣрые мухоловки, и, къ довершенію сходства, раздавался крикъ вертишейки. Словомъ, птичья фауна была та же, что подъ Москвой.

Странно, что лѣсной малиновки не нашелъ Радде, который только Талышъ подробно и изслѣдовалъ. Это — очень замѣтная птичка здѣшнихъ лѣсовъ.

95. *Iduna calligata* Licht. Бормотушка.

Мензбиръ, II, 907.

Бормотушка встрѣчена мною только на узкой поросшей мелкимъ кустарникомъ полосѣ по морскому берегу въ южной части Ленкоранскаго уѣзда въ маѣ (сел. Кассаларъ, 6. V. 97; с. Шах-Агачъ, 29. V. 97) и около Сальянъ (20. V. 97). Какъ показываетъ время ея нахожденія, она здѣсь гнѣздится.

96. *Iduna pallida* Hempr. et Ehrenb. Блѣдная малиновка.

Мензбиръ, II, 909.

Блѣдная малиновка очень обыкновенна по всему каспійскому побережью, гдѣ я встрѣчалъ ее отъ Ленкорани до Низовой пристани (сел. Михайловское) Кубинскаго уѣзда.

Здѣсь она держится главнымъ образомъ въ садахъ на высокихъ деревьяхъ. Самцы поютъ на самой верхушкѣ дерева и имѣютъ обыкновеніе съ пѣніемъ перелетать съ верхушки одного дерева на верхушку другого, при чемъ, часто трепеща крылышками, сперва поднимаются косо вверхъ, а затѣмъ спускаются, описавъ такимъ

образомъ дугу. Внутри страны я встрѣтилъ эту птичку только около Тертера Джеванширскаго уѣзда, — слѣдовательно, у подножья Карабахскихъ горъ, 2. VI. 95 въ низкихъ заросляхъ по канавѣ, и въ садахъ сел. Ахсу Шемахинскаго уѣзда.

Когда прилетаетъ къ намъ эта птичка, я не знаю. Могу только замѣтить, что позже всѣхъ другихъ мелкихъ птичекъ. Я встрѣчалъ ее не раньше 1. VI. Описываемыя эволюціи самчики продѣлывали въ первой половинѣ іюня.

Во всей Кубинской низменности блѣдная малиновка очень многочисленна, но въ предгорьяхъ, даже на небольшой высотѣ, напримѣръ, около сел. Кимиль, ея уже нѣтъ. Въ камышовыхъ заросляхъ эта птичка никогда не встрѣчается.

97. *Acrocephalus phragmitis* Bechst. Камышовка-барсучекъ.

Мензбиръ, II, 880.

Къ концѣ апрѣля 1897 г. я добылъ нѣсколько экземпляровъ камышовки-барсучка на низменности южной части Ленкоранскаго уѣзда, въ садахъ и въ камышахъ озера Каладагна около сел. Арчеванъ (сел. Вель, 12. IV. 97; оз. Каладагна, 23. IV. 97). Судя по тому, что 12. V. 98 я нашелъ ее около станицы Кумбашин, и по болѣе позднимъ находкамъ Радде, эта птичка здѣсь гнѣздится.

Въ камышахъ озеръ Черепашьяго и Лиси около Тифлиса я часто наблюдалъ въ концѣ апрѣля, повидимому, этотъ видъ; но, гнѣздится ли онъ здѣсь или только пролетаетъ, я навѣрное не знаю.

98. *Acrocephalus turdoides* Meyer. Дроздовидная камышовка.

Мензбиръ, II, 887.

Дроздовидная камышовка такая замѣтная птица, что прослѣдить ея распространеніе очень легко, хотя и далеко не легко ее добыть. Я встрѣчалъ ее рѣшительно вездѣ, гдѣ есть вода и камышовыя заросли — отъ станицы Государственной Терской области на Сѣверномъ Кавказѣ до ленкоранскихъ морцовъ въ Закавказьѣ. Тамъ, гдѣ по берегамъ Куры существуютъ обширныя камышовыя заросли, озерки и старыя русла, именно въ предѣлахъ Джеванширскаго, Шупинскаго и Джеватскаго уѣздовъ Елисаветпольской и Бакинской губ., дроздовидная камышовка встрѣчается

въ громадномъ количествѣ. Около Тифлиса она встрѣчается въ небольшомъ числѣ на озерахъ Черепашьемъ, Лиси и Соленомъ. На послѣднемъ бываетъ иногда многочисленна. Въ окрестности Тифлиса дроздовидная камышовка прилетаетъ во второй половинѣ апрѣля.

99. *Acrocephalus palustris* Bechst. Болотная камышовка.

Мензбиръ, II, 893.

Болотная камышовка встрѣчена мною на гнѣздовѣ въ горной части Шемахинскаго и Кубинскаго уѣздовъ и южномъ Дагестанѣ. Здѣсь она держится вовсе не на болотахъ, а на лугахъ и лѣсныхъ полянахъ, покрытыхъ высокою травянистою растительностью, среди которой и гнѣздится. Я заключаю это изъ того, что часто наблюдалъ въ такихъ мѣстахъ парочки, поведеніе которыхъ ясно показывало, что у нихъ по-близости находится гнѣздо; найти таковое мнѣ, однако, не удавалось. Въ Дагестанѣ въ долинѣ р. Самура эта птичка по хлѣбнымъ полямъ поднимается до аула Рутулъ. Въ Шемахинскомъ уѣздѣ я наблюдалъ болотную камышовку во второй половинѣ мая (с. Кюрдамичъ, 19. V. 96), въ Кубинскомъ уѣздѣ — въ срединѣ іюня, къ каковому времени и относится ея гнѣздованье.

Одинъ разъ, именно 10. V. 95, я встрѣтилъ ее на низменности Арешскаго уѣзда.

На пролетѣ я наблюдалъ ее въ Тифлисѣ въ концѣ августа.

100. *Acrocephalus streperus* Vieill. Тростниковая камышовка.

Мензбиръ, II, 896.

Я встрѣчалъ тростниковую камышовку только на осеннемъ пролетѣ въ Тифлисѣ. Она появляется здѣсь въ августѣ и бываетъ весьма многочисленна во всѣхъ садахъ города и въ окрестностяхъ.

Acrocephalus dumetorum Blyth.

Такъ какъ Радде уничтожилъ мои этикетки, то я теперь совсѣмъ не могу рѣшить, откуда происходитъ экземпляръ № 73а съ датой „Тифлисъ, IV. 93“. Во всякомъ случаѣ, въ апрѣлѣ 1893 года я еще не жилъ на Кавказѣ.

101. *Cettia cetti* Marm. Соловьиная камышовка.

Мензбиръ, II, 875.

Я добылъ только одинъ экземпляръ соловьиной камышовки 23. IV. 97 на Каладагнинскомъ морцѣ въ южной части Ленкоранскаго уѣзда. Птичка эта вовсе не рѣдка здѣсь, но условія, при которыхъ она встрѣчается, дѣлаютъ добываніе ея необычайно труднымъ. Въ Ленкоранскомъ уѣздѣ эти маленькія птички жили на заросшихъ камышомъ топяхъ, гдѣ держались у самой земли, т. е. у поверхности топи, да притомъ въ такой темнотѣ, что едва можно было, подѣхавъ въ удобномъ мѣстѣ на лодкѣ, разглядѣть маленькую птичку, быстро мелькающую среди частыхъ толстыхъ стеблей камыша. Далеко въ такой гущинѣ не видно, близко стрѣлять нельзя. Кромѣ того, птичку не приходится видѣть долѣе одного мгновенія. Вотъ почему она сравнительно рѣдко дѣлается добычею коллектора.

Сем. 14. *Turdidae*. Дроздовыя.Подсем. *Saxicolinae*.102. ? *Pratincola rubicola* L. Черноголовый чеканъ.

Мензбиръ, II, 1011.

Г. И. Радде отнесъ къ этому виду одинъ экземпляръ, убитый мною около Тифлиса 11. IV. 96, и другой — около Шемахи 8. V. 96, слѣдовательно, уже гнѣздящійся тамъ. Эти опредѣленія кажутся мнѣ сомнительными.

103. *Pratincola Hemprichii* Ehrenb. et intermed. Бѣлохвостый чеканъ.

Мензбиръ, II, 1014.

У Тифлиса я наблюдалъ луговыхъ чекановъ на пролетѣ по сырмъ лугамъ въ концѣ марта.

Въ большомъ количествѣ найдены были мною эти чеканы на гнѣздовѣ въ маѣ 1896 г. въ предгорьяхъ Кавказскаго хребта въ Шемахинскомъ уѣздѣ. Они держались здѣсь по сырмъ лугамъ. Большинство добытыхъ въ этой мѣстности чекановъ отмѣчено проф. М. А. Мензбиромъ, какъ „intermed.“.

По немногу, главнымъ образомъ все въ мартѣ, я встрѣчалъ бѣлохвостаго чекана во многихъ мѣстахъ долины р. Куры и на Талышинской низменности. Но онъ, вѣроятно, не гнѣздится здѣсь.

104. *Pratincola rubetra* L. Луговой чеканъ.

Мензбиръ, II, 1017.

На низменности я находилъ лугового чекана весною (во второй половинѣ апрѣля) на хорошихъ лугахъ по долинѣ р. Куры: близъ Тифлиса у Соленого озера, въ Елисаветпольскомъ (18. IV. 95) и Арешскомъ уу. Елисаветпольской губ., и на Талышинской низменности (с. Вель, 19. IV. 97; Сейдакеранъ, 4. V. 95). Вѣроятно, онъ и гнѣздится здѣсь, на что указываетъ какъ нахождение его на Талышинской низменности еще въ маѣ, такъ и то обстоятельство, что въ августѣ я встрѣчалъ его близъ Тифлиса выводками. Однако, это — только предположенія. Несомнѣнно же на гнѣздовѣхъ я встрѣтилъ его по военно-грузинской дорогѣ близъ станц. Гудауръ (7000'), а на черноморскомъ побережьѣ — близъ Кобулетъ въ 1906 году.

Рѣдкости этотъ чеканъ въ Закавказьѣ, во всякомъ случаѣ, не представляетъ, но вообще онъ нигдѣ не попадаетъ въ большое количество.

105. *Saxicola oenanthe* L. Каменка обыкновенная.

Мензбиръ, II, 1022.

„Чакъ-чакъ“ (татарск., всѣ камени).

Вмѣстѣ съ *Saxicola isabellina* это — самые обыкновенные представители рода *Saxicola* на протяженіи всего Кавказскаго края.

Въ долинѣ Куры и около Тифлиса обыкновенная каменка появляется довольно поздно, только въ концѣ марта, и исчезаетъ довольно рано. Мнѣ кажется это довольно страннымъ, но около Тифлиса по крайней мѣрѣ, гдѣ я весною экскурсировалъ довольно часто, я положительно не встрѣчалъ ее раньше 30. III. По прилетѣ камени нѣкоторое время держатся по пашнямъ и лугамъ, а затѣмъ уже занимаютъ для вывода дѣтей свои обычныя каменистыя мѣста: каменные россыпи, глинистые обрывы и особенно каменистыя русла рѣкъ, по которымъ поднимаются очень высоко въ горы, даже среди лѣсистыхъ мѣстностей. Около Тифлиса обыкновенная каменка гнѣздится на высотѣ около 2000'; на Арабатѣ осенью, уже при довольно холодной погодѣ я встрѣтилъ ее

на высотѣ около 9000'; въ Талышинскихъ горахъ около Кяльвяза находилъ, несомнѣнно, на гнѣздовѣ на высотѣ 7000', и на такой же высотѣ въ многихъ мѣстностяхъ Дагестана. Гнѣздится ли эта птичка въ восточномъ Закавказьѣ гдѣ нибудь на уровнѣ моря, я не знаю. Но на черноморскомъ побережьѣ около Кобулетъ она гнѣздится на морскомъ берегу, который одинъ только удовлетворяетъ, по своей обнаженности, требованіямъ каменки въ этой сплошь покрытой роскошною растительностью странѣ.

Въ предѣлахъ Кавказскаго края обыкновенная каменка встрѣчается рѣшительно повсюду: отъ Чернаго моря до Каспійскаго и отъ ставропольскихъ степей до Талышинскихъ горъ и Агридага.

На зиму обыкновенная каменка въ Закавказьѣ рѣшительно нигдѣ не остается. Талышинскіе экземпляры, добытые на высотѣ 7000' близъ перевала Барнасаръ, по-моему, сильно отличались по окраскѣ отъ другихъ, но это пусть разберутъ уже специалисты-орнитологи.

106. *Saxicola isabellina* Rüpp. Каменка-плясунья.

Мензбиръ, II, 1028.

Очень обыкновенна во всѣхъ пустынныхъ степяхъ Сѣвернаго Кавказа и восточнаго Закавказья, держится также по невысокимъ бесплоднымъ горамъ, а въ западномъ Закавказьѣ, за немѣнѣемъ болѣе удобнаго мѣста, живетъ на морскомъ берегу вмѣстѣ съ *S. oenanthe*. Высоко въ горы нигдѣ не поднимается. Самое высокое наблюдавшееся мною мѣстонахожденіе этой каменки, перевалъ черезъ гору Такилту Эриванской губ., къ югу отъ мѣстечка Кульпы, не превышало 4000'.

12. V. 99 я встрѣтилъ на Сѣверномъ Кавказѣ въ ставропольской степи парочку, гнѣздившуюся въ оставленной норѣ суслика у аула Башанта.

Камней, какъ нѣкоторыя другія каменки, каменка-плясунья не любитъ. Любимое ея мѣстопробываніе — пустынные солончаковыя степи. Здѣсь она устраиваетъ гнѣздо въ оставленной норѣ какого нибудь грызуна. Едва порхающихъ молодыхъ я встрѣчалъ на низменности восточнаго Закавказья въ концѣ апрѣля. Въ началѣ мая они летаютъ уже порядочно. Въ противоположность *S. oenanthe*, *S. isabellina* положительно не любитъ и избѣгаетъ каменистыхъ мѣстностей. Скорѣе ее можно встрѣтить на выгонахъ

и склонахъ горъ, покрытыхъ скудною растительностью, но никогда на обнаженныхъ скалахъ.

Въ небольшомъ числѣ каменка-плясунья остается въ Закавказьѣ на зиму, и не только на низменности, но иногда даже и у Тифлиса. Нормально же появляется здѣсь уже въ февралѣ.

Около сел. Мансурлы Елисаветпольскаго уѣзда я нашелъ гнѣздо этой птички, устроенное довольно глубоко въ оставленной норѣ песчанки (*Gerbillus caucasicus*).

107. *Saxicola deserti* Temm. Пустынная каменка.

Мензбиръ, II, 1030.

Я встрѣчалъ пустынную каменку только около Тифлиса. Отдѣльныя парочки и молодыя встрѣчались по скалистому кряжу одной изъ возвышенностей около города.

Лѣтомъ мнѣ не приходилось здѣсь экскурсировать, но въ августѣ я убивалъ молодыхъ и старыхъ, поэтому считаю пустынную каменку рѣдкою, но гнѣздящеюся птицею окрестностей Тифлиса.

108. *Saxicola melanoleuca* Güld.

Мензбиръ, II, 1031.

Рѣдкая у насъ птица. Одинъ экземпляръ этого вида (♂) былъ добытъ А. Б. Шелковниковымъ въ Арешскомъ у. 30. III. 94.

109. *Saxicola aurita* Temm.

Мензбиръ, II, 1026.

Я видѣлъ только одинъ экземпляръ этого рѣдкаго вида (♂), тоже добытый г. Шелковниковымъ тамъ же, мѣстн. Мазить-дара (въ Бозъ-дагѣ) Арешск. у., 30. III. 94.

110. *Saxicola torio* Ehrenb. Каменка-плѣшанка.

Мензбиръ, II, 1033.

Я наблюдалъ каменку-плѣшанку: около Тифлиса; по глинистымъ обрывамъ плоскаго хребта Бозъ-дагъ, тянущагося черезъ Елисаветпольскій и Арешскій уѣзды; въ южныхъ предгорьяхъ Кавказскаго хребта и на Талыпинской низменности. Въ послѣдней мѣстности она бываетъ только на пролетѣ, въ остальныхъ же, повидимому, гнѣздится; по крайней мѣрѣ, въ августѣ я встрѣчалъ около Тифлиса выводки, а въ другихъ перечисленныхъ здѣсь мѣстахъ наблюдалъ ее во время гнѣздованья.

Каменка-плѣшанка держится предпочтительно на глинистых обрывахъ, но встрѣчается и на скалахъ, которыя другіе чеканы этой группы избѣгаютъ, предпочитая болѣе мягкую почву.

111. *Saxicola Finschi* Heugl. Черногорлый чеканъ.

Мензбиръ, II, 1037.

Черногорлый чеканъ любитъ мѣста, гдѣ глинистые обрывы чередуются съ выходами скалъ, — поэтому истинное царство его представляетъ самая восточная часть Кавказскаго хребта — отъ восточной части Шемахинскаго у. до Апшеронскаго полуострова. Онъ держится здѣсь приблизительно на высотѣ Шемахи. Въ маѣ 1896 г. я встрѣчалъ его здѣсь всюду въ большомъ количествѣ, несомнѣнно, на гнѣздовѣхъ.

Въ значительномъ же количествѣ я встрѣтилъ его гнѣздящимся и въ Талышинскихъ горахъ, близъ поста Кяльвязъ на высотѣ 7000', и осенью по сѣверному склону Агри-дага; особенно много было ихъ на горѣ Такялту къ югу отъ Кульпъ, Эриванской губерніи.

Зимою этотъ чеканъ спускается на низменность, и однажды въ декабрѣ былъ убитъ въ Арешскомъ уѣздѣ.

112. *Saxicola vittata* Hempr. et Ehrenb.

Зарудный въ своей „Орнитологической фаунѣ Закаспійскаго края“ * говоритъ про этого чекана: „между прочимъ довольно часто гнѣзвился къ 1884 и 1886 гг. въ пустынныхъ горахъ около Баку“.

21. VI. 97 на плоскихъ скалистыхъ кряжахъ на сѣверномъ берегу Апшеронскаго полуострова около сел. Мардакянъ я наблюдалъ пару какихъ то неизвѣстныхъ мнѣ чекановъ. Вѣроятно, они принадлежали къ этому виду.

Подсем. *Ruticillinae*.

113. *Ruticilla phoenicurus* L. Обыкновенная горихвостка.

Мензбиръ, II, 1001.

На Сѣверномъ Кавказѣ я наблюдалъ обыкновенную горихвостку въ нѣсколькихъ пунктахъ Ставропольской губ., между

* Матеріалы къ познанію фауны и флоры Россійской Имперіи. Отд. зоологич. Вып. II, стр. 59 (1896).

прочимъ 10. V. 99 въ саду при Лѣтней Трухменской ставкѣ, среди голой степи, тянущейся на много верстъ кругомъ.

Въ восточномъ Закавказьѣ она очень обыкновенна на низменности и въ предгорьяхъ. Рѣзкой разницы между распространениемъ *Rut. phoenicurus* и *Rut. mesoleuca* въ вертикальномъ направленіи я не замѣтилъ. Она найдена мною въ послѣдней трети апрѣля и началѣ мая на Талышинской низменности (с. Тангерудъ, 22. IV. 97; с. Машханъ, 23. IV. 97; с. Вель, 25. IV. 98), въ долинѣ р. Куры, въ Елисаветпольскомъ и Арешскомъ уѣздахъ (с. Сафи-Кюртъ, 19. IV. 95; с. Агаси-бегли, 22. IV. 95; Мансурлы, 2. V. 95), въ предгорьяхъ южнаго склона Кавказскаго хребта (Шемаха, 8. V. 96) и около Тифлиса. Въ окрестностяхъ послѣдняго по крайней мѣрѣ, несомнѣнно, гнѣздятся оба вида, такъ какъ въ концѣ августа я убивалъ здѣсь молодыхъ какъ *R. phoenicurus*, такъ и *R. mesoleuca*. Въ западномъ Закавказьѣ въ бассейнѣ р. Ріона горихвостка, вѣроятно, очень рѣдка, такъ какъ я ни разу не встрѣтилъ ея на своемъ пути осенью 1902 г. изъ Гуріи въ Тифлисскую губернію черезъ Месхійскій хребетъ и ни разу не видѣлъ ея, проживъ цѣлое лѣто 1906 г. въ Кобулетахъ.

Прилетъ горихвостки я наблюдалъ въ 1896 г. въ Тифлисѣ 4. IV, въ 1897 г. въ Ленкорани — 16. IV. Въ Тифлисѣ она держится до начала октября; самое позднее время наблюденія — 7. X. 95 (Муштаидъ).

114. *Ruticilla mesoleuca* Hempr. et Ehrenb. Бѣлокрылая горихвостка.

Мензбиръ, II, 1005.

Я наблюдалъ бѣлокрылую горихвостку на гнѣздовѣ въ предгорьяхъ Кавказскаго хребта (с. Боскаль Шемахинск. у., 10. V. 96) и около Тифлиса, гдѣ встрѣчалъ молодыхъ уже въ концѣ іюля.

115. *Ruticilla ochrurus* Gmel. Кавказская горихвостка-чернушка.

Мензбиръ, II, 1006.

Обыкновенная гнѣздящаяся птица альпійскаго пояса горъ. На Большомъ Кавказѣ я встрѣчалъ ее по военно-грузинской дорогѣ отъ станціи Гудауръ до ст. Казбекъ, въ Кубинскомъ у. у селенія Лаза при подножьи Шахъ-дага, и всюду въ Дагестанѣ.

Гнѣздится она въ оградахъ и зданіяхъ, сложенныхъ изъ булыжника и дикаго камня безъ цемента. У убитой 27. IV. 99 у станціи Гудауръ самки я нашель яйцо на-сносѣ. 12. VI. 901 я нашель въ такой каменной оградѣ близъ Бусарчилъскаго перевала гнѣздо этой горихвостки, съ птенцами въ пуху.

116. *Ruticilla erythrogastra* Güld.

Мензбиръ, II, 1008.

Я одинъ только разъ встрѣтилъ и добылъ эту высокогорную птицу 18. II. 96, при довольно холодной погодѣ, на скалахъ по берегу р. Куры между Мцхетомъ и Авчалами.

117. *Daulias luscini* L. Западный соловей.

Мензбиръ, II, 982 (*Erithacus luscini*).

Всѣ соловьи *бюль-бюль* (татарск.).

Одинъ экземпляръ западнаго соловья добытъ мною 7. V. 97 въ заросшей по дну ольхою, а по склонамъ разнымъ кустарникомъ узкой балкѣ р. Ленкоранки близъ сел. Руа, вмѣстѣ съ *Hypolais icterina*, при обстоятельствахъ, очень похожихъ на гнѣздовье. Интересно, что въ „*Ornis Caucasica*“ пропущены *объ* упомянутыя здѣсь птицы.

Другой экземпляръ добытъ уже, несомнѣнно, на пролетѣ 20. IV. 95 близъ сел. Азуръ-Ахметлы Елисаветпольскаго уѣзда.

118. *Daulias philomela* Bechst. Восточный соловей.

Мензбиръ, II, 978 (*Erithacus philomela*).

Восточный соловей — гнѣздящаяся птица Сѣвернаго Кавказа, гдѣ 10. V. 99 я слышалъ его въ саду Лѣтней Трухменской ставки Ставропольской губ., и центрального Закавказья. Пѣніе его раздается съ мая всюду въ садахъ окрестностей Тифлиса и даже въ большихъ садахъ самаго города.

Во второй половинѣ августа число особей этого соловья въ Тифлисѣ значительно увеличивается: вѣроятно, идетъ пролетъ. Въ это время (16. VIII) они тоже понемногу поютъ, хотя и очень несложно.

На весеннемъ пролетѣ однажды онъ былъ встрѣченъ мною и подъ Ленкоранью (сел. Вель, 11 верстъ къ югу отъ Ленкорани, 19. IV. 97). По пѣнію очень легко отличить *D. philomela* отъ *D. Hafizi*, не труднѣе, чѣмъ щегленка отъ чижа. Хотя здѣшніе

D. philomela поютъ и несравненно лучше, чѣмъ *D. Hafizi*, но все же пѣніе ихъ значительно уступаетъ пѣнію ихъ собратьевъ въ средней Россіи.

Соловей совсѣмъ не такая ужъ смиренная птичка, какъ это принято думать. Одинъ соловей, — вѣроятно, этого вида, — жившій въ саду при отдѣленіи Кавказской шелководственной станціи въ г. Нухѣ, ежедневно регулярно являлся къ червоводнѣ осматривать выбрасываемыя „подстилки“, т. е. не съѣденный шелкопрядами червями листь, на которомъ всегда остается небольшое количество отставшихъ или больныхъ червей, которыми онъ и пользовался. При этомъ онъ энергично отгонялъ не только болѣе слабыхъ птичекъ, но и нахальныхъ воробьевъ, желавшихъ также попользоваться этими остатками, и однажды (З. V. 904) на моихъ глазахъ одного изъ нихъ, съѣвшего черезчуръ близко къ нему, клюнулъ въ голову и обратилъ въ бѣгство.

119. *Daulias Hafizi* Severts. Соловей Гафиза.

Мензбиръ, II, 983 (*Erithacus hafizi*).

Этотъ соловей весьма обыкновененъ и многочисленъ во всей низменности и предгорьяхъ восточнаго Закавказья и по каспійскому побережью отъ персидской границы до Дербента. Но около Тифлиса, гдѣ его находилъ Радде („*Ornis Caucasica*“, стр. 195), я его никогда не слышалъ лѣтомъ и не убивалъ осенью на пролетѣ. Его пѣніе, очень плохое и лишь слабо напоминающее соловьиное, такъ характерно, что ошибиться и смѣшать его съ *D. philomela* невозможно. Въ Кубинскомъ у. онъ тоже многочисленъ, но такъ высоко въ горахъ, какъ это указываетъ Радде, т. е. до 5000', мнѣ никогда не попадался. Вообще онъ избѣгаетъ густыхъ высокоствольныхъ лѣсовъ и держится исключительно въ мелкихъ заросляхъ, не крупномъ рѣдкомъ лѣсу и особенно въ садахъ.

120. *Cyanecula suecica pallidogularis* Zarudn. Варакушка блѣдногорлая.

Я встрѣчалъ варакушку только подѣ Тифлисомъ на весеннемъ пролетѣ въ концѣ марта и началѣ апрѣля, и въ долинѣ Куры (Арешскій у.) въ началѣ марта.

Подѣ Тифлисомъ варакушки держались обыкновенно на днѣ глубокихъ густо заросшихъ промоннѣ, а однажды (26. III. 900) я

встрѣтилъ ихъ на совершенно голомъ берегу Соленого озера, гдѣ онѣ собирали что-то у самой воды.

Указаніемъ на то, что кавказская варакушка относится къ описанному Н. А. Заруднымъ подвиду *C. s. pallidogularis*, я объясняю С. А. Бутурлину, но описаніе этой формы мнѣ, къ сожалѣнію, неизвѣстно.

121. *Erythacus rubeculus caucasicus* Buturlin. Кавказская зарянка.

Buturlin, Reichenow's Ornith. Monatsber., Jan. 1907, p. 8.

Эта зарянка широко распространена во всемъ Закавказьѣ и живетъ здѣсь осѣдло. Гнѣздится она въ лѣсномъ поясѣ и, весьма вѣроятно, въ заросляхъ на низменности. Я могу, однако, утверждать это только относительно Талыша, гдѣ убивалъ этотъ видъ въ маѣ. Въ другихъ же мѣстахъ восточно-закавказской низменности я не наблюдалъ ея, вѣроятно, только потому, что ее невозможно замѣтить лѣтомъ при ея скрытомъ образѣ жизни въ тѣхъ непролазныхъ заросляхъ, въ которыхъ она держится. 15. VIII. 902 я встрѣтилъ зарядокъ въ заросляхъ рододендрона на Аджарскомъ хребтѣ, почти на границѣ лѣсной растительности.

13. III. 99 въ сел. Борджалы зарядки пѣли такъ усердно, какъ я раньше и не слыхалъ. 16. III, проѣзжая послѣ заката солнца лѣсомъ изъ сел. Арчеванъ въ сел. Алаша, я видѣлъ, какъ зарядки гонялись другъ за другомъ. Изъ этого я заключаю, что спариваются онѣ въ срединѣ марта. 8. V. 97 въ предгорьяхъ Талышинскихъ горъ между сс. Руа и Бибіаны я убилъ молодую, уже летную зарядку въ гнѣздовомъ нарядѣ. Я убѣдился въ томъ, что это — зарянка, только послѣ второго выстрѣла, которымъ посчастливилось убить молодую и старую вмѣстѣ. Онѣ держались въ лощинѣ среди бурелома и папоротника. Старыя очень волновались, летая надъ молодыми.

18. VI. 97 въ горной части Талыша — Зуvandѣ я находилъ уже хорошо летающихъ молодыхъ.

Зимою зарянка весьма многочисленна всюду на низменности, не исключая и тифлискихъ садовъ. Такъ какъ Радде не различалъ *E. hyrcanus* и *E. rubeculus*, то весьма странно, что онъ говоритъ о прилетѣ зарядокъ (*Ornis Caucas.*, стр. 26) въ Тифлисѣ, когда онѣ не улетаютъ отсюда и въ самыя жестокия зимы. Обыкновенная зарянка мнѣ ни разу въ Закавказьѣ не встрѣчалась. Я

особенно тщательно рассмотрѣлъ экземпляры, добытые мною въ самый разгаръ зимы при большомъ снѣгѣ и морозѣ 22. XII. 95 и 24. XII. 905, но онѣ оказались не типичными, а, какъ я думалъ раньше, *E. hyrcanus*, т. е. въ дѣйствительности *E. rubeculus caucasicus*.

Молодой экземпляръ, убитый мною въ Маяглисѣ 5. IX. 97, имѣлъ уже цвѣтъ взрослого.

Подсем. *Turdinae*.

122. *Turdus pilaris* L. Дроздъ-рябинникъ.

Мензбиръ, II, 1079.

Я встрѣчалъ рябинника только во время второй половины зимы въ долинѣ р. Куры отъ Мцхета до Арешскаго у. Елисаветпольской губ. Въ окрестностяхъ Тифлиса они держались по открытымъ мелколѣсьемъ горамъ (Авчалы, Мцхетъ) и въ тугаяхъ по р. Курѣ, а при выпаденіи большого снѣга (сравнительно, по мѣстному) появлялись и въ тифлискихъ садахъ. Такъ, во время мятели, продолжавшейся нѣсколько дней въ концѣ февраля 1898 г., въ паркѣ Муштаидъ было множество совершенно обезсиленныхъ и страшно исхудалыхъ дроздовъ разныхъ видовъ. Ни въ ноябрѣ, ни въ декабрѣ я ни разу его здѣсь не наблюдалъ.

123. *Turdus iliacus* L. Дроздъ-бѣлобровикъ.

Мензбиръ, II, 1076.

Въ противоположность мнѣнію, высказанному Радде (*Ornis Caucas.*, стр. 210), бѣлобровикъ является зимующею птицей не только Ленкорани, но, вѣроятно, и всей долины р. Куры, такъ какъ я наблюдалъ его въ Тифлисѣ съ конца ноября до начала апрѣля. Особенно многочисленны были бѣлобровики всю зиму 1896 — 97 гг. въ паркѣ Муштаидъ. Нахожденіе бѣлобровика въ этомъ паркѣ еще 6. IV. 98 кажется мнѣ очень позднимъ, такъ какъ подъ Москвою этотъ дроздъ приступаетъ къ гнѣздованью во второй половинѣ апрѣля, а прилетаетъ уже въ концѣ марта.

124. *Turdus musicus* L. Пѣвчій дроздъ.

Мензбиръ, II, 1073.

Въ долинѣ средняго теченія Куры я наблюдалъ пѣвчаго дрозда только позднею осенью (октябрь) и весною (мартъ).

Радде считаетъ пѣвчаго дрозда гнѣздящимся въ лѣсномъ поясѣ до 7000', кажется, только на томъ основаніи, что наблюдалъ его въ Боржомѣ 3. IV. Но если такой выводъ вѣренъ, то здѣсь гнѣздится и бѣлобровикъ. Однако, въ лѣтнюю пору ни въ лѣсахъ Карабаха, ни въ талышинскихъ, ни по южному склону Кавказскаго хребта и Кубинскомъ уѣздѣ я никогда никакого другого дрозда кромѣ чернаго не наблюдалъ, а пѣніе бѣлобровика и пѣвчаго дрозда такъ характерно и громко, что мудрено было бы его не услышать. Слѣдовательно, если пѣвчій дроздъ и гнѣздится здѣсь, то, вѣроятно, только въ хвойныхъ лѣсахъ, и обобщеніе Радде ни на чемъ не основано.

125. *Turdus viscivorus* L. Дроздъ-деряба.

Мензбиръ, II, 1068.

Появляется въ долинѣ средняго теченія р. Куры и въ Тифлисѣ только при выпаденіи большого снѣга въ горахъ. Убитые въ Муштанѣ 1. III. 98 были такъ истощены, что почти валились съ дерева. Вѣроятно, они голодали уже долго, ибо исхудали такъ, что ободранныя тушки казались высохшими.

Насколько я могъ выяснить, деряба гнѣздится въ полосѣ хвойнаго лѣса. Осенью (8. X. 900) я встрѣчалъ небольшія стайки дерябъ около Сарыкамыша въ смѣшанномъ лѣсу по склону хребта Саганлугъ, и въ сосновыхъ лѣсахъ по горамъ, окружающимъ Гельскую котловину (Ардаганскій округъ Карсской обл., 1. IX. 902).

126. *Merula merula* L. Черный дроздъ.

Мензбиръ, II, 1061.

Кара-тоухъ (татарск.).

Черный дроздъ, несомнѣнно, одна изъ самыхъ обыкновенныхъ и многочисленныхъ осѣдлыхъ птицъ Закавказья. Область гнѣздовья его обнимаетъ поясъ лѣсовъ приблизительно отъ 3000' до 5000', а, можетъ быть, и выше. Но это касается только внутренней части перешейки; по сырому же лѣсистому побережью Талыша и Кутаисской губ. онъ встрѣчается и лѣтомъ и, вѣроятно, гнѣздится на уровнѣ моря.

Осенью въ вост. Закавказьѣ нормально появляется на низменности въ октябрѣ раньше или позже, смотря по состоянію погоды. Но иногда единичными экземплярами встрѣчается и гораздо раньше: такъ,

въ 1894 г. я видѣлъ его около Тифлиса въ началѣ августа. Чѣмъ холоднѣе и чѣмъ больше снѣга выпало въ горахъ, тѣмъ многочисленнѣе черный дроздъ въ тифлисскихъ садахъ и заросляхъ по берегамъ Куры. Однако, не слѣдуетъ думать, что всѣ дрозды обязательно скочевываютъ зимою съ горъ на низменность. Въ безснѣжныхъ мѣстахъ въ теплую сравнительно погоду они и зимою попадаютъ довольно высоко, вѣроятно, въ мѣстахъ своего гнѣздовья. Такъ, по дорогѣ съ поста Кёръ-оглы на постъ Эрюкъ вдоль турецкой границы я встрѣтилъ чернаго дрозда 7. X. 902 на склонахъ хребта Топъ-юль на высотѣ выше 5000'; 9. X. 96 при очень холодной погодѣ на пути изъ Кедабена въ с. Загликъ (Ганджинскія горы), тоже довольно высоко; наконецъ, 8. XI. 906 въ Ликанахъ около Боржома.

Въ мартѣ черный дроздъ уже исчезаетъ съ низменности, отправляясь на мѣста своего гнѣздовья. 17. III. 96 я не встрѣтилъ уже ни одного въ долинѣ Куры у Мцхета. Съ половины марта слышно ихъ пѣніе на мѣстахъ гнѣздовья, гдѣ потеплѣе. Въ сел. Борджалы, въ предгорьяхъ Талышинскихъ горъ, я слышалъ ихъ пѣніе уже 13. III. 99.

127. *Merula torquata* L. Бѣлозобый дроздъ.

Мензбиръ, II, 1057.

Бѣлозобый дроздъ встрѣченъ мною только въ субъ-альпійской полосѣ горъ, гдѣ онъ держится въ высокихъ травянистыхъ заросляхъ. Въ Дагестанѣ близъ аула Курушъ я убилъ одного 4. VII. 96 на высотѣ около 8000'. Въ области истоковъ р. Куры къ юго-западу отъ Гельской котловины я встрѣтилъ его по р. Лаустанъ-чаю, у подошвы горы Кабахъ-тапа еще выше — 20. IX. 902, когда вся растительность тамъ уже давно погибла и мѣстами лежалъ снѣгъ.

128. *Monticola saxatilis* L. Каменный дроздъ.

Мензбиръ, II, 1053.

Каменный дроздъ попадался мнѣ довольно рѣдко, хотя мѣстами въ Эриванской губерніи онъ довольно многочисленъ. 27. IV. 99 я убилъ одного самца во время отвратительной погоды близъ станціи Гудауръ военно-грузинской дороги. 24. IX. 900 я встрѣтилъ его въ Орговскомъ ущельѣ, къ югу отъ мѣст. Игдырь

Эриванск. губ., а 23. IX. 902 около сел. Мшехъ по дорогѣ изъ Ардагана въ Ольты.

Monticola cyanus L. Голубой дроздь.

Мнѣ никогда не попадался.

Я упоминаю о немъ только для того, чтобы обратить вниманіе лицъ, пользующихся сочиненіями Г. И. Радде, особенно его каталогомъ „*Museum Caucasicum*“, I, и вслѣдующее обстоятельство.

Радде приводитъ его для окрестностей Тифлиса (*Ornis Caucas.*, стр. 203), но это врядъ-ли нужно понимать въ прямомъ смыслѣ. И по крайней мѣрѣ во время моихъ многочисленныхъ и многолѣтнихъ экскурсій здѣсь ни разу ни этого, ни предыдущаго вида не встрѣтилъ, хотя и нашелъ кое что не замѣченное Радде. А за 14 лѣтъ занятій при Кавказскомъ Музеѣ я успѣлъ убѣдиться, что Г. И. Радде ставилъ на этикетѣ „Тифлисъ“ на всякомъ предметѣ, который ему приносили въ Тифлисъ, мало заботясь о настоящемъ его происхожденіи.

Сем. 15. *Accentoridae*. Завирушковые.

129. *Accentor modularis orientalis* Sharpe.

Мевзбиръ, II, 1044.

Мнѣ не приходилось наблюдать эту завирушку на гнѣздовѣ, но зимою она очень обыкновенна на низменности восточнаго Закавказья, гдѣ я наблюдалъ ее во многихъ мѣстахъ долины р. Куры отъ Мцхета до Сальянъ и въ Талышѣ. Эта птичка обыкновенно держится въ самыхъ густыхъ заросляхъ у самой земли, такъ что даже зимою, когда кусты обнажены отъ листьевъ, замѣтить ее довольно трудно. Поэтому я не рѣшаюсь утверждать, что она здѣсь никогда не гнѣздится, ибо усмотрѣть ее въ заросляхъ лѣтомъ при ея образѣ жизни, рѣшительно невозможно. Нахожденіе завирушки на низменности еще въ концѣ апрѣля (23. IV. 95, Джевать), повидимому, указываетъ на то, что она здѣсь гнѣздится, ибо въ это время всѣ птицы тамъ приступили уже къ гнѣздовью.

Я находилъ завирушку исключительно на низменности.

130. *Accentor alpinus* Gmel. Горная завирушка.

Мензбиръ, II, 1047.

Гнѣздящаяся птица альпійскихъ луговъ. Я наблюдалъ ее въ іюнѣ на Муровъ-дагѣ (въ Ганджинскихъ горахъ), въ Талышнскихъ горахъ и на Шахъ-дагѣ (южный Дагестанъ) на высотѣ обыкновенно выше 7000'.

Альпійская завирушка — очень осторожная птица и подойти къ ней на выстрѣлъ не легко. На Шахъ-дагѣ, гдѣ 17. VI. 96 я добылъ одинъ молодой экземпляръ, она держалась на покрытомъ очень скудною растительностью альпійскомъ лугу съ разбросанными по нему крупными кусками скаль. Въмѣстѣ съ нею держались *Anthus spinoletta* и *Oraegithus pusillus*.

131. *Accentor ocularis* Radde. Завирушка Радде.

Біанки, Ежегодн. Зоолог. Муз. И. Акад. Наукъ, т. IX, стр. 142 (*Spermolegus ocularis*).

Я только разъ встрѣтилъ эту рѣдкую завирушку въ березовомъ лѣсу на склонѣ Малаго Апарата на высотѣ 8800'. Здѣсь летала цѣлая стайка этихъ птичекъ, которыя держались довольно скрытно и садились на нижнія вѣтви деревьевъ. Вслѣдствіе очень трудной ходьбы по крутому склону, покрытому очень скользкой травой, я могъ добыть только одну птичку, которая находится нынѣ въ Зоологическомъ Музеѣ Имп. Академіи Наукъ въ С.-Петербургѣ.

Радде (*Ornis Caucasica*, стр. 192) описать эту птичку такъ, что профессору М. А. Мензбину не оставалось дѣлать ничего другого, какъ соединить ее съ *Accentor fulvescens*. Изслѣдованіе моего экземпляра и экземпляровъ съ Демавенда хранителемъ орнитологическаго отдѣленія вышеупомянутаго Музея В. Л. Біанки показало, что видъ этотъ самостоятельный, но его характерные признаки, отличающіе его отъ *A. fulvescens*, были пропущены въ описаніи Радде.

Сем. 16. *Cinclidae*. Оляпковые.132. *Cinclus cinclus caucasicus* Madarasz. Кавказская оляпка.

Біанки, Русскія оляпки, „Природа и Охота“, 1905, V, стр. 8.

Оляпка въ Закавказьѣ встрѣчается довольно часто на быстрыхъ горныхъ рѣчкахъ съ прозрачною водой. Осенью 1893 г.

я наблюдалъ ее въ Карабахѣ на пути изъ сел. Мигры на Араксѣ въ мѣст. Герюсы. По военно-грузинской дорогѣ я часто встрѣчалъ ее по рр. Арагвѣ и Бѣлой, а также въ Гудомакарскомъ ущельѣ.

18. VIII. 902 я добылъ одинъ молодой экземпляръ близъ сел. Гагуа Ахалцихскаго у. на быстрой рѣчкѣ среди лѣса. Довольно часто встрѣчалъ я оляпку также въ ущельѣ р. Чороха.

Сем. 17. Troglodytidae. Крапивниковыя.

133. *Troglodytes parvulus* Koch. Крапивникъ.

Мензбиръ, II, 789.

Крапивникъ очень обыкновененъ зимою на низменности восточнаго Закавказья, но, гнѣздится ли тутъ, рѣшить мнѣ не удалось, ибо, какъ только здѣшнія заросли покроются листьями, замѣтить такихъ скрытныхъ птицъ, какъ крапивникъ и завирушка, становится чрезвычайно трудно. Однако, крапивникъ тамъ, гдѣ я наблюдалъ его гнѣздящимся, напр., подѣ Москвою, любитъ по временамъ показываться, такъ что, вѣроятно, я замѣтилъ бы его, если бы онъ гнѣзвился подѣ Тифлисомъ. На низменности, въ долинѣ Куры крапивникъ встрѣчается съ сентябрю до марта.

Въ лѣсной полосѣ онъ гнѣздится. Лѣсничій Бртекъ показывалъ мнѣ цѣлую серію гнѣздъ этой птички, собранныхъ имъ близъ сел. Бакуріани (выше Боржома) въ маѣ 1896 г. Въ нихъ было мало яицъ (2—3), но, оттого ли, что онъ ихъ собралъ черезчуръ рано, или оттого, что разбилъ, я позабылъ его спросить. Нынѣ эти гнѣзда находятся въ Кавказскомъ Музеѣ.

Сем. 18. Muscicapidae. Мухоловковыя.

134. *Siphia parva* Bechst. Краснозобая мухоловка.

Мензбиръ, II, 693 (*Muscicapa*).

Въ Талышѣ я встрѣтилъ краснозобую мухоловку гнѣздящуюся отъ уровня моря (с. Бутасаръ, 20. IV. 97) до верхней границы лѣсной растительности (близъ с. Лирикъ, 20. V. 97), которая проходитъ здѣсь очень низко. Вѣроятно, она гнѣздится во всемъ лѣсномъ поясѣ Кавказа, но мною на гнѣздовья больше не встрѣчена. Зато

на пролетѣ она чрезвычайно многочисленна во всей долинѣ Куры. Гнѣздится ли здѣсь она, я, однако, навѣрное не знаю. Одинъ разъ я нашелъ ее въ Елисаветпольскомъ у. на низменности, около селенія Саровъ еще 20. IV. 95, что, можетъ быть, указываетъ на ея гнѣздовье здѣсь, но ни въ Джеватскомъ уѣздѣ, ни въ Кубинскомъ, довольно подробно мною осмотрѣнномъ, я ее ни разу не видалъ лѣтомъ на низменности. Весною пролетъ начинается въ послѣднихъ числахъ марта или началѣ апрѣля. Въ 1895 г. 30. III появились первыя, 7. IV шелъ валовой пролетъ и паркъ Муштадъ былъ полонъ ими; въ 1896 г. первыя — 1. IV, валовой пролетъ — 7. IV, въ 1898 г. первыя — 4. IV. Въ началѣ апрѣля мѣсяца всегда приходилось уѣзжать изъ Тифлиса, но вообще на низменности я ихъ не встрѣчалъ уже болѣе послѣ 20. IV. Осенній пролетъ бываетъ столь же многочисленъ, какъ и весенній. Въ Тифлисѣ первыя осеннія мухоловки появляются въ началѣ августа и держатся въ здѣшнихъ садахъ и окрестностяхъ города, въ тугаяхъ по р. Курѣ, до второй половины октября. Однако, единичные экземпляры остаются въ теплыя зимы здѣсь зимовать, на что указываютъ слѣдующія даты добытыхъ здѣсь мною экземпляровъ: 2. XI. 95, 11. XI. 95, 19. II. 95 и 1. III. 99.

Удивительно, какъ Радде не замѣтилъ этой птички на осеннемъ пролетѣ, когда она наполняетъ всѣ сады своимъ характернымъ трескучимъ позывомъ.

135. *Hedymela semitorquata* Homeyer. Кавказская мухоловка-бѣлошейка.

Мензбиръ, II, 699 (*Muscicapa*).

Первый разъ я встрѣтилъ эту мухоловку въ лѣсу розовыхъ акацій по дорогѣ изъ сел. Тангерудъ въ сел. Арчеванъ въ южной части Талышинской низменности (Астаринскій магалъ) 22. IV. 97 и убилъ здѣсь двухъ самчиковъ. Но на низменности эта птичка не гнѣздится и позднѣе исчезаетъ отсюда. На гнѣздовья же я встрѣтилъ ее гораздо выше въ верхнемъ поясѣ лѣса, именно близъ селенія Лирикъ 17. V. 97, по дорогѣ изъ селенія Осакуджа. Я хорошо рассмотрѣлъ ее и узналъ ея пѣніе, хотя и не добылъ. Она держалась на громаднхъ отдѣльно стоящихъ букахъ.

24. IV. 98 я снова наблюдалъ ее на низменности, въ селеніи Арчеванъ, гдѣ она пѣла передъ занимаемымъ мною домомъ.

136. *Muscicapa striata* Pall. Сѣрая мухоловка.Мензбиръ, II, 704 (*Muscicapa grisola*).

Я не увѣренъ, гнѣздится ли сѣрая мухоловка на низменности р. Куры, хотя и встрѣчалъ ее здѣсь довольно поздно. Такъ, 26. IV. 95 я убилъ одинъ экземпляръ въ садахъ селенія Карасахкаль на Курѣ (Елисаветпольск. у.). Несомнѣнно уже гнѣздящаяся я нашелъ эту мухоловку въ сел. Ахсу, лежащемъ еще на низменности у начала подъема къ г. Шемахѣ, гдѣ одинъ экземпляръ убить мною 16. V. 96. На низменности южной части Ленкоранскаго у. я убилъ парочку (♂ и ♀) еще 28. IV. 98 и думаю, что здѣсь она гнѣздится. Во всякомъ случаѣ, она уже въ значительномъ количествѣ гнѣздится въ предгорьяхъ Талышинскихъ горъ, совсѣмъ невысоко. Для мѣстожительства выбираетъ свѣтлыя мѣста — широкія поляны въ лѣсу. Такъ, напр., я наблюдалъ 7. V. 97 нѣсколько экземпляровъ близъ сел. Руа, которые держались на выгорѣвшемъ мѣстѣ на обгорѣлыхъ кустахъ ежевики.

На осеннемъ пролетѣ въ Тифлисѣ я встрѣтилъ сѣрую мухоловку 29. VШ.

Сем. 19. *Hirundinidae*. Ласточковыя.137. *Hirundo rustica* L. Касатка.

Мензбиръ, II, 686.

Деревенская ласточка — обыкновенная гнѣздящаяся птица всего Кавказскаго края и встрѣчается повсюду кромѣ сплошныхъ лѣсовъ и большихъ высотъ.

Въ восточное Закавказье онѣ прилетаютъ въ самомъ началѣ марта. Въ 1895 г. въ с. Джеватъ прилетѣли 8. Ш, въ 1899 г. въ Ленкорань — 10. Ш. Молодые ласточки перваго вывода вылетаютъ въ срединѣ июня, второго — въ срединѣ августа. Отлетаютъ отъ насъ касатки около середины сентября. Въ 1895 г. онѣ исчезли изъ Тифлиса уже 17. IX. Въ сентябрѣ я наблюдалъ ихъ приготовленіе къ отлету въ Гельской котловинѣ на высотѣ около 6500'. 13. IX онѣ собирались въ маленькія стайки и, повидимому, готовились улетѣть, но на другой день онѣ все еще оставались тутъ, несмотря на бывший ночью весьма ощутительный морозецъ и густой снѣгъ. Странно было смотрѣть, какъ онѣ летали среди падающаго снѣга. Степей ласточки не избѣгаютъ, а прилетаютъ на нихъ охотиться

даже на значительное разстояніе отъ своего настоящаго мѣсто-
пробыванія. За всадникомъ въ степи всегда слѣдуетъ масса мухъ,
вьющихся преимущественно надъ головою лошади. Проѣзжая въ
южной части Кубинскаго уѣзда въ жаркую пору дня, я часто бы-
валъ окруженъ цѣлымъ роемъ ласточекъ, неустанно шнырявшихъ во-
кругъ меня на такомъ разстояніи, что ихъ можно было бы достать
рукой, и ловившихъ взлетающихъ съ лошади мухъ. Онѣ слѣдовали
такимъ образомъ за нашими лошадьми на далекое разстояніе.

138. *Chelidon urbica* L. Воронокъ.

Мензбиръ, II, 674.

Воронокъ встрѣчается несравненно рѣже касатки. Я встрѣ-
тилъ эту ласточку гнѣздящуюся въ предгорьяхъ восточной части
Кавказскаго хребта въ сел. Маразы Шемахинскаго у., около
станціи военно-грузинской дороги Гудауръ, на Алазани, по тракту
изъ Сигнаха въ Лагодехи, на станціи Чіаури и на черноморскомъ
побережьи въ Кобулетахъ, гдѣ она значительно уступала въ числѣ
деревенской ласточкѣ.

Въ сел. Маразы 2. V городскія ласточки еще только лѣ-
пили гнѣзда.

139. *Cotyle riparia* L. Береговой стрижь.

Мензбиръ, II, 679.

Наблюдалъ только осенью близъ Тифлиса. Именно 11. VIII.
96 убилъ нѣсколько экземпляровъ у Соленого озера.

Въ Кубанской области гнѣздится по обрывистымъ берегамъ
рѣкъ.

Отрядъ II. *Coraciiformes*. Ракшеобразныя.

Сем. 20. *Picidae*. Дятловыя.

Подсем. *Junginae*.

140. *Jynx torquilla* L. Вертишейка.

Мензбиръ, II, 339.

Въ Закавказьи вертишейка попадалась мнѣ довольно рѣдко.
На гнѣздовья я нашелъ ее только въ Ленкоранскомъ у., гдѣ въ

вышеописанномъ ущельѣ р. Ленкоранки около сел. Руга я встрѣтилъ ее 7. V. 97 вмѣстѣ съ *Hypolais icterina* и *Muscicapa striata*.

Около Тифлиса я находилъ вертишейку только на весеннемъ (7. IV. 95) и на осеннемъ (въ началѣ сентября 1899 г.) пролетѣ въ паркѣ Муштаидъ.

Подсем. *Picinae*.

141. *Picus martius* L. Желна.

Мензбиръ, II, 345.

Черный дятель гнѣздится въ лѣсной полосѣ Закавказья, а зимою часто попадаетъ на низменности. 25. V. 98 я встрѣтилъ его въ буковомъ лѣсу у сел. Тангевонъ Ленкоранскаго у., а 29. IV. 98 на низменности у сел. Машханъ, — слѣдовательно, этотъ дятель, подобно зяблику и другимъ птицамъ, въ Талышѣ гнѣздится и на низменности. Осенью и зимою я часто наблюдалъ его въ садахъ и тугаяхъ по р. Курѣ и въ тифлисскихъ садахъ. 30. VIII. 902 я добылъ одинъ экземпляръ въ сосновомъ лѣсу Гельской лѣсной дачи (Ардаганскій окр.).

142. *Dendrocopus major tenuirostris* Buturlin. Топкоклювый пестрый дятель.

Buturlin, Ibis, 1906, p. 412.

Агачъ-даданъ (татарск., всѣ дятлы).

Очень обыкновененъ во всей лѣсной области Кавказа, но, гнѣздится ли онъ на низменности въ Закавказьѣ, я не знаю. Я наблюдалъ его здѣсь (Тифлисъ), однако, и довольно поздно, уже въ апрѣлѣ, при чемъ онъ издавалъ особый трескъ, никогда не слышанный мною въ другую пору. Зимою онъ здѣсь очень обыкновененъ. Въ большомъ числѣ онъ остается на зиму и довольно высоко въ горахъ. Такъ, 8. XI. 96 я встрѣтилъ его довольно высоко въ Шамхорскомъ ущельѣ, Елисаветп. у.: 18. IX. 902 въ значительномъ количествѣ видѣлъ и добылъ этотъ видъ въ Гельской лѣсной дачѣ.

Между нормальными экземплярами, убитыми мною зимою подъ Тифлисомъ, попадались и очень темно окрашенные съ нижней стороны, представляющіе по окраскѣ какъ бы переходъ къ *P. Poelzami*.

143. *Dendrocopus major Poelzami Bogd.* Дятель Пельцама.Мензбиръ, II, 355 (*Picus major poelzami*).

Въ большомъ количествѣ найденъ мною на Талышинской низменности. Всѣ мои экземпляры добыты здѣсь въ разные годы въ апрѣлѣ мѣсяцѣ, но онѣ встрѣчались здѣсь и въ другое время. 1. XI. 94 я убилъ одинъ экземпляръ въ паркѣ Муштаидъ.

144. *Dendrocopus syriacus Hempr. et Ehrenb.* Сирийскій дятель.Мензбиръ, II, 356 (*Picus syriacus*).

Осенью и зимою 1894 г. въ паркѣ Муштаидъ держалось очень много дятловъ; между ними я убилъ и двухъ *D. syriacus*, но позднѣе ни разу не встрѣчалъ этого дятла. Опредѣленіе это было сдѣлано Радде. Мои экземпляры были совершенно сходны съ экземплярами Кавказскаго Музея за № 245, добытыми въ Каразахъ, нѣсколько ниже Тифлиса по Курѣ.

145. *Dendrocopus medius caucasicus Bianchi.* Кавказскій вертлявый дятель.

Бianки, Ежегодн. Зоолог. Музея ИМП. Акад. Наукъ, IX, p. I.

Вертлявый дятель обыкновенная осѣдлая птица долины Куры. Въ зиму 1894 — 95 г. ихъ было много въ Тифлисѣ въ паркѣ Муштаидъ. Мною были препарированы экземпляры, убитые: ♂ 17. XI. 94, ♂ 15. II. 95 и ♂ 21. II. 95. Этою же зимою я добылъ его въ имѣніи А. Б. Шелковникова въ Арешкомъ уѣздѣ 2. III. 95.

29. IV. 95 я нашелъ гнѣздо этого дятла въ сел. Алпаутъ въ мѣстѣ Самухъ при слияніи Куры съ Юрой и Алазанью. Молодые уже высовывали изъ дупла свои носы. Одного мнѣ приносили; онъ былъ уже вполнѣ оперенъ.

Въ срединѣ мая того же 1895 г. я встрѣтилъ много дятловъ этой группы въ низовьяхъ р. Тертера, 15. V у сел. Айриджа, 16. V у сел. Чилябилирѣ Джеванширскаго уѣзда, но ни одного здѣсь не добылъ, почему и не могу сказать, принадлежали ли они къ этому виду или иному.

146. *Picus Danfordi Hargitt*. Кавказскій малый дятель.Мензбиръ, II, 362 (*Picus minor quadrifasciatus Radde*).

По опредѣленію проф. М. А. Мензбира, добытый мною въ Ленкоранскомъ уѣздѣ малый дятель относится къ этому малоазійскому виду. Но и тифлисскіе экземпляры не отличаются отъ ленкоранскихъ.

Встрѣчается малый дятель въ Закавказьѣ не часто.

Вотъ даты моихъ экземпляровъ: ♂ 21. XI. 96 и ♀ 29. XI. 96, паркъ Муштаидъ, Тифлисъ; ♂ 24. IV. 97, сел. Арчеванъ; ♂ 27. IV. 98, сел. Бутасаръ.

Такимъ образомъ, въ Закавказьѣ малый дятель встрѣченъ пока только по долинкамъ Куры и на Талышинской низменности.

147. *Gecinus viridis Saundersi Tacz*. Зеленый дятель.Мензбиръ, II, 374 (*Gecinus viridis*).

Обыкновенная осѣдлая птица Закавказья. Гнѣздится въ садахъ, лиственныхъ лѣсахъ и тугаяхъ всего Закавказья и Кубинскаго уѣзда на низменности и въ предгорьяхъ. 30. V. 96 я нашелъ въ саду сел. Дебели гнѣздо этого дятла съ дѣтьми. На Кубинской низменности я не встрѣтилъ кромѣ этого весьма обыкновеннаго здѣсь дятла никакого другого.

Въ лиственныхъ лѣсахъ западнаго Закавказья онъ также весьма обыкновененъ. Зимой въ долинкамъ Куры я встрѣчалъ его всюду въ значительномъ количествѣ, чаще, чѣмъ другіе виды дятловъ. Въ Талышѣ весьма обыкновененъ. Высоко въ горахъ нигдѣ не встрѣченъ.

Сем. 21. *Cypselidae*. Стрижовыя.148. *Cypselus melba* L. Бѣлобрюхій стрижь.

Мензбиръ, II, 414.

Я встрѣтилъ бѣлобрюхаго стрижа только въ Дагестанѣ 27. VI. 96 у сел. Куркендъ Кюринскаго округа, гдѣ ихъ было довольно много, и въ ущельѣ Чороха близъ Артина.

149. *Cypselus affinis* Hardw. Африканскій стрижь.

Мензбиръ, II, 414.

Этого стрижа я наблюдалъ 17. VI. 96 около сел. Лаза у подножья Шахъ-дага въ Кубинскомъ уѣздѣ (собственно, южный Дагестанъ); 26. IV. 98 на перевалѣ Барнасаръ въ Талышинскихъ горахъ, между сс. Руаруть и Кяльвязъ, гдѣ онъ гнѣзился на скалахъ, и въ Кегартскомъ ущельѣ къ сѣверо-востоку отъ Эривани. Здѣсь мѣстные жители увѣряли меня, будто онъ не улетаетъ на зиму.

Сем. 22. *Caprimulgidae*. Козодоевыя.150. *Caprimulgus europaeus* L. Козодой.

Мензбиръ, II, 404.

Я встрѣчалъ козодоя нечасто, вѣроятно, вслѣдствіе его скрытнаго образа жизни. Нѣсколько экземпляровъ его я добылъ 2 и 3. V. 95 на низменности Елисаветпольскаго уѣзда и въ іюнѣ около Тифлиса на Соленомъ озерѣ, гдѣ былъ добытъ и сомнительный козодой Радде (*Caprimulgus unwini?*).

Сем. 23. *Bubonidae*. Совинныя.151. *Athene noctua caucasica* Zarudn. et Loud. Сычъ кавказскій.

Байгунъ (татарск.).

Этотъ маленькій сычикъ обыкновененъ на низменности восточнаго Закавказья и Кубинскаго уѣзда, но держится исключительно въ степныхъ мѣстностяхъ. Въ совершенно безлѣсной мѣстности гнѣздится въ порахъ, вырытыхъ въ обрывахъ; тамъ, гдѣ есть большія деревья, — въ дуплахъ.

7. IX. 900 я убилъ молодой экземпляръ въ Аралыхъ въ паркѣ. Проѣзжая послѣ заката солнца по почтовымъ трактамъ, идущимъ по степной мѣстности, напримѣръ, изъ Евлаха на ст. Барда, изъ Баку въ Кубу (нынѣ, съ проведеніемъ желѣзной дороги, упраздненъ), я часто видѣлъ этихъ сычиковъ сидящими на

телеграфной проволоки. Порою они безшумно снимались и, схватив какое нибудь насекомое, снова возвращались на мѣсто.

152. *Bubo bubo* L. Филинъ.

Мензбиръ, II, 269 (*Bubo maximus*).

Подъ Тифлисомъ я ежегодно наблюдалъ филина зимою въ паркѣ Муштаидъ и въ разное время добылъ тамъ три экземпляра.

153. *Ephialtes scops* L. Сплюшка, зорька.

Мензбиръ, II, 280 (*Scops giu*).

Зорька обыкновенна и многочисленна на низменности всего восточнаго Закавказья. Прилетъ зорьки легко замѣтитъ благодаря ея характерному крику. Въ Тифлисѣ я слышалъ ее первый разъ въ 1896 году — 6. IV, въ 1897 — 23. III, въ 1898 — 1. IV и въ 1900 — 27. III, въ паркѣ Муштаидъ. Крикъ сплюшки раздается все лѣто, но всего интенсивнѣе бываетъ въ маѣ.

Сплюшка встрѣчалась мнѣ главнымъ образомъ на низменностяхъ, гдѣ любитъ селиться въ садахъ, но встрѣчается и въ предгорьяхъ, напр., у сел. Боскаль Шемахинскаго уѣзда, 10. V. 96.

Въ началѣ августа у Тифлиса крикъ сплюшки умолкаетъ, но, улетаетъ ли она въ это время, я не знаю.

154. *Syrnium aluco* L. Лѣсная сова.

Мензбиръ, II, 301.

Я часто слышалъ крикъ этой совы въ разныхъ мѣстахъ Закавказья отъ уровня моря до верхней границы лѣсной растительности (на горѣ Муровъ-дагъ, въ урочищѣ Турагай 27. V. 95), но на глаза она попадалась мнѣ не часто, и я добылъ всего три экземпляра: два въ саду сел. Кечерли Джеванширскаго уѣзда 28. V. 94 и одинъ въ паркѣ Муштаидъ въ Тифлисѣ 1. XI. 94.

Зимою она бываетъ въ Тифлисѣ болѣе многочисленна.

155. *Syrnium aluco* Wilkowskyi Menzbier.

Зимою 1895 — 96 г. въ Тифлисѣ было убито два экземпляра темной разновидности лѣсной совы; одну изъ нихъ убили просто палкою на заборѣ въ самомъ городѣ.

156. *Nyctea nivea* L. Полярная сова.

Мензбиръ, II, 307.

Въ зиму 1902—3 г. 2 или 3 экземпляра было добыто въ окрестностях г. Петровска, Дагестанской области.

157. *Asio otus* L. Ушастая сова.

Мензбиръ, II, 318.

Я встрѣтилъ и добылъ эту сову только два раза: 15. III. 95 въ Сальянахъ и 19. IV. 95 въ сел. Сафи-Кюртъ Елисаветпольскаго уѣзда. Въ обоихъ мѣстахъ она держалась въ садахъ. Въ Сафи-Кюртъ я выгналъ ее днемъ изъ густой посадки тутовыхъ деревьевъ („тахмачаръ“).

158. *Asio accipitrinus* Pall. Бологная сова.

Мензбиръ, II, 313.

На низменности восточнаго Закавказья обыкновенна. Одинъ экземпляръ я добылъ 23. IV. 95 въ сел. Алабашлы Елисаветпольскаго уѣзда.

Сем. 24. *Urupidae*. Удодовыя.159. *Urupa eops* L. Удодъ.

Мензбиръ, II, 416.

Шена-нипики (татарск. на Араксѣ), шена-пуну (татарск. Кубинск. у.).

Гнѣздящаяся птица всего Кавказа; на зиму нигдѣ не остается, хотя и прилетаетъ очень рано.

Удодъ болѣе всего предпочитаетъ выгоны около селеній, но встрѣчается и на лужайкахъ среди лѣса, гдѣ пасется скотъ, и въ степи. Очень многочисленъ на низменности, но по удобнымъ мѣстамъ поднимается и высоко въ горы. Въ Талышинскихъ горахъ я встрѣтилъ его близъ с. Кяльвязъ, выше древесной растительности; во многихъ мѣстностяхъ Дагестана, напр., 17. VIII. 97 въ Казн-Кумухъ; 29. VIII. 902 на окраинѣ Гельской котловины на Сигнотской кочевкѣ. Прилетаетъ въ самомъ началѣ марта. исчезаетъ уже въ августѣ.

Сем. 25. *Meropidae*. Щурки.160. *Merops apiaster* L. Золотистая щурка.

Мензбиръ, II, 396.

Кызляръ-кушъ (татарск. *птица двигъ*).

Золотистая щурка весьма обыкновенна во всемъ Кавказскомъ краѣ. Такъ какъ въ концѣ девятистыхъ годовъ прошлаго столѣтія возникъ вопросъ о томъ, слѣдуетъ ли считать щурку вредною или полезною птицей, на Кавказской шелководственной станціи, зоологическимъ отдѣленіемъ которой я завѣдую, былъ собранъ обширный матеріалъ по біології этой птицы и ея распространенію на Кавказѣ *.

Область гнѣздовья золотистой щурки обнимаетъ только низменности. Она гнѣздится въ большомъ количествѣ въ степяхъ всего Сѣвернаго Кавказа (Ставропольская губ., Терская и Кубанская области) и въ восточномъ Закавказьѣ. Въ западной же его части она гнѣздится только въ небольшомъ количествѣ.

Щурка принадлежитъ къ птицамъ, прилетающимъ къ намъ очень поздно, именно въ срединѣ апрѣля. Не замѣчено большой разницы между прилетомъ ея въ Закавказье и на Сѣверный Кавказъ. На запросы Кавказской шелководственной станціи большинство наблюдателей какъ время прилета указывало 14, 15 апрѣля.

Въ Закавказье щурка прилетаетъ небольшими стайками, въ 20—30 особей, и нѣкоторое время кочуетъ. Въ мѣстахъ ея гнѣздовья въ это время пасѣкомыхъ бываетъ еще мало, поэтому она по прилетѣ посѣщаетъ пасѣки и наноситъ здѣсь большой вредъ. При преслѣдованіи своей любимой добычи щурки теряютъ всякую осторожность и какъ-бы шалѣютъ. Выстрѣлы не производятъ на нихъ никакого впечатлѣнія. О количествѣ, въ какомъ онѣ появляются весною на пасѣкахъ въ Тифлисѣ, даетъ представленіе то, что въ теченіе двухъ недѣль на пасѣкѣ Кавказской шелководственной станціи въ паркѣ Муштаидъ охотниками, охранявшими пасѣку, было убито болѣе 1200 экземпляровъ. Нападеніе на пчельникъ происходило обыкновенно слѣдующимъ образомъ. Въ пасмурный или дождливый день стайка щурокъ съ характернымъ крикомъ появлялась надъ пасѣкой и начинала ловить летающихъ пчелъ. Схвативъ пчелу, птица садилась на ближайшее дерево и

* Труды Кавказской Шелководственной Станціи, т. IX, вып. 2 (1900).

заглатывала ее, а затѣмъ снова взлетала за другою. По произведеннымъ здѣсь наблюденіямъ, каждая птица заглатывала въ теченіе трехъ минутъ пять пчелъ. Приемы ловли были очень характерны и однообразны у всѣхъ щурокъ. Обыкновенно сидящая на деревѣ щурка, замѣтивъ летящую пчелу, взлетаетъ нѣсколько кверху, затѣмъ падаетъ внизъ, дѣлая полукругъ, схватываетъ пчелу и сейчасъ-же поднимается съ нею кверху до ближайшей вѣтки, гдѣ присаживается и, задравъ кверху голову, заглатываетъ добычу. Набивъ желудокъ, щурки остаются нѣкоторое время въ покоѣ, послѣ чего отрыгаютъ погадку, состоящую изъ хитиновыхъ частей пчелъ, и снова принимаются за ловлю. Заразъ въ желудкѣ щурокъ при вскрытіи находили до 25 пчелъ. Пчелиный ядъ, очевидно, вовсе не дѣйствуетъ на нихъ, такъ какъ при вскрытіи иногда находили въ пустомъ желудкѣ щурки до 20 жалъ, воткнувшихся въ его стѣнки. Въ кишкахъ никогда не бываетъ ни малѣйшаго кусочка хитина. Когда наступаетъ время высидиванія яицъ, щурки рѣдко появляются на пасѣкахъ, только тогда, когда нѣсколько дней подрядъ стоитъ дождливая погода и онѣ не находятъ себѣ пропитанія въ мѣстахъ гнѣздовья.

Въ степяхъ Сѣвернаго Кавказа и восточномъ Закавказьѣ щурки устраиваютъ свои гнѣзда въ длинныхъ норахъ, вырытыхъ въ глинистыхъ обрывахъ холмовъ, въ промоинахъ и берегахъ пересохшихъ рѣчекъ. Для своего мѣстопробыванія онѣ выбираютъ себѣ обыкновенно степныя, часто пустынные мѣстности. Къ устройству гнѣздъ на Сѣверномъ Кавказѣ пчелоѣды приступаютъ въ началѣ мая, въ Закавказьѣ немного раньше. Несмотря на слабость своихъ ногъ, щурки сами роютъ норы для своего гнѣзда, но, при твердомъ грунтѣ, употребляютъ для этого очень много времени, почему и стараются занять свое прошлогоднее гнѣздо. Въ мягкомъ грунтѣ работа оканчивается въ нѣсколько дней. Нора вырывается горизонтально и достигаетъ длины 4 и болѣе аршинъ, смотря по твердости грунта, при діаметрѣ отъ 1½ до 2 вершковъ. Конецъ норы, т. е. помѣщеніе для гнѣзда, значительно шире прохода (около 4 вершковъ) и лежитъ ниже его. Полъ гнѣздовой камеры немного разрыхляется. Въмѣсто подстилки на концѣ такой норы обыкновенно находится слой хитиновыхъ частей различныхъ насекомыхъ, послужившихъ пищею птицѣ.

Въ срединѣ мая въ восточномъ Закавказьѣ (Арешскій и Ленкоранскій уу.) я находилъ на такой подстилкѣ отъ 5 до 7 свѣжихъ яицъ; въ то же время находилъ яйца и В. А. Зейдлицъ въ

Ставропольской губ. Но не всё щурки садятся на яйца одновременно. Случалось наблюдать, что въ то время, какъ однѣ уже высиживали, другія были еще заняты рытьемъ норъ. Вѣроятно, это были не захватившія старой норы.

Гнѣздованіе щурокъ на черноморскомъ побережьи представляетъ нѣкоторыя особенности, о которыхъ Н. Н. Шавровъ сообщаетъ слѣдующее: „Пчелоѣды водятся во всей низменной части Кутаисской губерніи и даже въ мѣстахъ довольно сырыхъ, но они здѣсь не изобилуютъ такъ, какъ въ восточномъ Закавказьи. Но, во всякомъ случаѣ, они являются здѣсь коренными обывателями и гнѣздятся всюду въ полосѣ своего распространенія небольшими колоніями. Мнѣ приходилось наблюдать ихъ гнѣздовья въ Поті при условіяхъ, весьма схожихъ съ кумбашинымъ гнѣздовьемъ въ Ленкоранскомъ уѣздѣ. Недалеко отъ моря — въ $1\frac{1}{2}$ или $\frac{3}{4}$ версты — ихъ гнѣздовья тянутся по лѣснымъ лужайкамъ въ низкой ровной мѣстности, гдѣ подпочвенная вода находится на глубинѣ $1\frac{1}{2}$ — 2 аршинъ. Для начала порокъ щурки пользуются всякою неровностью мѣстности, всякимъ крохотнымъ холмикомъ. Несмотря на песчаный рыхлый грунтъ и различныя неудобства, щурки не измѣняютъ характера своихъ норъ: мнѣ случалось раскапывать ихъ не разъ, и рѣдкая нора была менѣе 2 аршинъ длиною, обыкновенно-же между 2 и 3 аршинами. Въ этой лѣистой и болотистой мѣстности онѣ имѣютъ, повидимому, обильную пищу постоянно и, если нападаютъ отъ времени до времени на пчельники, то нападенія эти и по количеству нападающихъ, и по стремительности и назойливости представляютъ лишь слабую тѣнь того, что происходитъ, напримѣръ, въ Тифлисѣ“.

Птенцы выводятся въ началѣ іюня. Они никогда не бываютъ одинаковой величины. Обыкновенно находишь рядомъ съ еще совершенно голымъ и почти совсѣмъ оперившагося птенца. Когда у щурокъ дѣти, въ гнѣздовомъ ходѣ недалеко отъ гнѣзда всегда можно найти еще живыхъ, но искалѣченныхъ кузнечиковъ, жуковъ и т. п. Вѣроятно, эти насѣкомыя были принесены для корма птенцамъ, но вывалились.

Молодые вылетаютъ въ первой половинѣ іюня.

Въ хорошую погоду щурки уже рано утромъ вылетаютъ на добычу въ степь и, пока не сѣли на яйца, совершаютъ большіе перелеты. Въ мѣстахъ ихъ гнѣздовья постоянно можно встрѣтить небольшія стайки щурокъ, несущихся невысоко надъ землею колеблющимся полетомъ, то вразсыпную, то вытянувшись въ рядъ.

Поминутно то одна, то другая изъ нихъ какъ бы ныряетъ въ травѣ, схватываетъ какое нибудь насѣкомое и съ нимъ снова взвивается вверхъ. Вообще шурки ловятъ насѣкомыхъ, составляющихъ ихъ исключительную пищу, главнымъ образомъ на-лету, и только въ рѣдкихъ случаяхъ подбираютъ съ земли. Это бываетъ только тогда, когда сидящая на землѣ шурка замѣтитъ какое нибудь насѣкомое, что называется, у себя подъ носомъ, такъ какъ ходить, по причинѣ короткости своихъ ногъ, она не можетъ. Наѣвшись шурки летаютъ, повидному, просто для удовольствія и при этомъ поднимаются на громадную высоту. Отдыхать онѣ присаживаются обыкновенно на кустики, столбики, даже на выступы почвы или просто на землю, но, повидному, всему предпочитаютъ телеграфныя проволоки, которыя иногда бываютъ сплошь унизаны этими красивыми птичками. Однако, живая натура шурки не позволяетъ ей и во время отдыха оставаться неподвижною. Поминутно онѣ срываются съ мѣста, чтобы схватить какое нибудь насѣкомое, и, возвратившись на мѣсто, заглатываютъ его. Пищу ихъ помимо пчелъ составляютъ различныя крупныя насѣкомыя, главнымъ образомъ жуки и прямокрылыя, почему шурка, несмотря на вредъ, причиняемый на пчельникахъ, должна почитаться очень полезною птицей.

Отлетаютъ шурки изъ Закавказья въ половинѣ сентября. Одинъ наблюдатель, учитель Григорьевъ въ Касумъ-кентѣ (въ южномъ Дагестанѣ), сообщалъ, что отлетъ ихъ въ его мѣстности происходитъ въ октябрѣ, но это, очевидно, ошибочно.

На пролетѣ шурка бываетъ и на весьма возвышенныхъ мѣстахъ. Такъ, О. О. Каврайскій наблюдалъ ихъ 17. VIII. 95 въ Боржомѣ; 27. VIII. 95 близъ станціи Конорбель на оз. Хозашинъ на высотѣ 6000' въ 6 ч. утра шурки летѣли скученными стайками на западъ; въ это утро здѣсь былъ небольшой морозъ. На другой день этотъ же наблюдатель видѣлъ ихъ въ ущельѣ Куры близъ станціи Беграхатунъ (6500'). При ихъ способности къ летанію Кавказскій хребетъ, безъ сомнѣнія, не представляетъ имъ никакой преграды при перелетѣ. Вѣроятно, отъ этого зависитъ и то странное обстоятельство, что всѣ періодическія явленія въ жизни шурки (прилетъ, выводъ молодыхъ, отлетъ) происходятъ въ одно время какъ на Сѣверномъ Кавказѣ, такъ и въ Закавказьѣ.

По Н. Н. Шаврову, на черноморскомъ побережьѣ шурки начинаютъ собираться въ стаи и готовиться къ отлету уже въ началѣ августа, а во второй половинѣ августа здѣсь появляются громад-

ныя стан шурокъ, гнѣздящихся сѣвернѣе. За ними тянуть и мѣстныя, что бываетъ обыкновенно между 1 и 15 сентября.

161. *Merops persicus* Pall. Персидская шурка.

Мензбиръ, II, 401.

Распространеніе зеленой шурки на Кавказѣ ограничено узкой прибрежной полосой Каспійскаго моря. Но въ сѣверной части побережья она рѣдка и обыкновенна только въ Ленкоранскомъ уѣздѣ и около Сальянъ. Персидская шурка прилетаетъ нѣсколько позднѣе золотистой и свое гнѣздовье устраиваетъ обыкновенно на морскомъ берегу. Гнѣзда расположены, какъ и у обыкновенной шурки, небольшими колоніями. Наибольшая колонія, которую я наблюдалъ нѣсколько лѣтъ, была расположена на морскомъ берегу около станціи Кумбаши Ленкоранскаго уѣзда.

Здѣсь въ прибрежномъ пескѣ, перемѣшанномъ съ ракушей, зеленыя шурки роютъ норы для своихъ гнѣздъ. Онѣ начинаютъ рыть нору прямо съ горизонтальной поверхности и ведутъ ее внизъ подъ угломъ въ 5—6 градусовъ. Передъ помѣщеніемъ для гнѣзда небольшой выгибъ кверху. Это помѣщеніе въ нѣсколькихъ раскопанныхъ мною норахъ находилось на глубинѣ 1 — $1\frac{1}{2}$ аршина отъ поверхности почвы, при длинѣ норы до одной сажени. 13. V. 98 около станціи Кумбаши не было еще ни одной готовой норы. Слѣдуетъ замѣтить, что норы служатъ только одинъ сезонъ и шуркамъ приходится здѣсь каждый годъ рыть новыя. Яйца персидской шурки я добылъ только одинъ разъ, именно 5. VI. 98. Ихъ было въ гнѣздахъ только по четыре, — слѣдовательно, кладка не была еще закончена. Они были еще совершенно свѣжи.

Сем. 26. *Alcedinidae*. Зимородковыя.

162. *Alcedo ispida* L. Зимородокъ.

Мензбиръ, II, 381.

Обыкновененъ всюду въ Закавказьѣ, но особенно многочисленъ въ Талышѣ на низменности и на черноморскомъ побережьѣ. Зимородокъ держится преимущественно на неглубокихъ рыбообильныхъ рѣчкахъ съ чистою прозрачною водою, но встрѣчается и на ленкоранскихъ морцахъ и оросительныхъ канавахъ.

Сем. 27. *Coraciidae*. Сизоворонковыя.

163. *Coracias garrula* Semenowi Loud. et Tschusi. Сизоворонка.

Мензбиръ, II, 391 (*Coracias garrula*).

Одна изъ самыхъ обыкновенныхъ и замѣтныхъ птицъ Кавказа. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Закавказья, а въ особенности на Кубинской низменности она встрѣчается положительно на каждомъ шагу и подпускаетъ человѣка на нѣсколько шаговъ.

12. IV. 95 я наблюдалъ подѣ Тифлисомъ прилетѣть сизоворонку большому стаю; большіе я никогда ихъ обществами не видалъ. Сизоворонка любитъ открытыя мѣстности: степи, рѣдкіе лиственные лѣса, мелкія кустарниковыя поросли и т. п.

Въ Дагестанѣ я встрѣчалъ ее довольно высоко на обнаженныхъ горахъ съ самою скудною растительностью. Гнѣздится она въ выкапываемыхъ ею самою глубокихъ норахъ въ глинистыхъ обрывахъ. Пищу сизоворонки составляютъ различные крупныя насѣкомыя, что при страшной прожорливости птицы дѣлаетъ ее чрезвычайно полезною. Въ концѣ августа сизоворонки исчезаютъ изъ Закавказья.

По Бутурлину, относится къ тому-же подвиду, который описанъ изъ Закаспійской области подѣ именемъ *Coracias garrula* Semenowi.

Отрядъ III. *Cuculiformes*. Кукушкообразныя.

Сем. 28. *Cuculidae*. Кукушковыея.

164. *Cuculus canorus* L. Кукушка обыкновенная.

Мензбиръ, II, 330.

Попокъ, пуну, тутай (татарск.).

Кукушка — обыкновенная лѣтняя птица всего Кавказскаго края и въ вертикальномъ направленіи распространена отъ уровня моря до границы лѣсной растительности. Въ Талышинскихъ горахъ я встрѣтилъ ее въ садахъ, расположенныхъ въ глубокой рѣчной долинѣ между сс. Гуарутъ и Кяльвязъ, уже выше границы лѣса, на высотѣ свыше 6000'.

Кукушка любитъ болѣ открытыя мѣстности — сады, изрѣзанные полянами свѣтлые лѣса и часто держится даже на совершенно безлѣсныхъ горахъ. 1. V. 96 я слышалъ ея кукованіе на пути изъ гор. Шемахи въ сел. Мараза среди совершенно безлѣсныхъ каменныхъ горъ. 19. V. 96 въ Шемахинскомъ же уѣздѣ по дорогѣ въ сел. Алты-агачъ я замѣтилъ кукушку, которая куковала на совершенно безлѣсномъ склонѣ горы съ кое гдѣ разбросанными маленькими кустиками. Она сидѣла на очень маленькомъ кустикѣ, такъ что ее было видно издалека. Въ совершенно безлѣсной же мѣстности я часто встрѣчалъ ее въ разныхъ частяхъ Дагестана, напримѣръ, въ долинѣ Самура у сел. Мурухъ 17. VI. 96.

Въ садахъ на низменности восточнаго Закавказья она всюду очень многочисленна, также и въ тугаяхъ на р. Курѣ.

Въ сплошныхъ лиственныхъ лѣсахъ я встрѣтилъ ее въ Талышѣ на низменности и въ предгорьяхъ, и въ нагорной части Кубинскаго уѣзда, но въ крупныхъ хвойныхъ высокогорныхъ лѣсахъ мнѣ ее встрѣчать не случалось.

Кукушка прилетаетъ въ Закавказье въ началѣ апрѣля. Самое раннее наблюденіе — 5. IV. 96 Муштанлъ (Тифлисъ). Въ началѣ мая бываетъ самый разгаръ брачной жизни кукушки. 4. V. 99 въ лѣсной дачѣ Варвара на р. Курѣ (Елисаветпольскій уѣздъ) онѣ куковали по нѣсколько штукъ заразъ. Когда происходитъ отлетъ этой птицы изъ Закавказья, не знаю, но убилъ одну еще 7. IX. 900 въ Аралыхъ въ паркѣ (у подножья Арарата).

Отрядъ IV. Columbiformes. Голубинообразныя.

Сем. 29. Peristeridae. Горлицевыя.

165. *Peristera turtur* L. Горлинка.

Мензбиръ, II, 569 (*Turtur auritus*).

Куръ-куръ (татарск., по Шелковникову, Арешск. у).

Горлинка одна изъ самыхъ обыкновенныхъ гнѣздящихся птицъ всего Закавказья и Кубинскаго уѣзда. Держится она главнымъ образомъ на низменности и въ предгорьяхъ. Помимо восточ-

наго Закавказья и низменности Кубинскаго уѣзда, гдѣ она была особенно многочисленна, я встрѣтилъ ее также въ большомъ количествѣ на Эриванской равнинѣ и черноморскомъ побережьѣ.

Въ Закавказьѣ горлинка прилетаетъ уже сравнительно поздно — во второй половинѣ апрѣля. Въ 1897 г. на Талышинской низменности я замѣтилъ ее первый разъ только 22. IV (у сел. Арчевань).

На безлѣсной низменности восточнаго Закавказья горлинка устраиваетъ свое гнѣздо по большей части въ большомъ кустѣ держи-дерева (*Paliurus australis*). Экскурсируя 16. V. 94 съ А. Б. Шелковниковымъ въ Арешскомъ у., мы нашли нѣсколько такихъ гнѣздъ съ яйцами. Каждое изъ нихъ было расположено на одной горизонтальной вѣточкѣ, сдѣлано очень грубо изъ палочекъ и вѣточекъ и представляло только одинъ лотокъ, притомъ столь рѣдкій, что яйца можно было видѣть и снизу. Послѣднихъ бываетъ только два. Г. Шелковниковъ обратилъ вниманіе на тотъ фактъ, что ущелье это было совершенно безводно и до ближайшей рѣчки было не менѣе пяти верстъ. Я часто находилъ горлинокъ и въ другихъ мѣстахъ, очевидно, на гнѣздовьяхъ, но также въ совершенно безводной мѣстности, напр., на Эриванской равнинѣ.

Отлетъ горлинокъ мною не наблюдался.

166. *Peristera* sp. ?

Какая то горлинка, отличная отъ обыкновенной, была мною убита 27. IV. 97 у Гудаура, когда тамъ еще лежалъ снѣгъ и стояла отвратительная холодная погода. Къ сожалѣнію, она, по недоразумѣнію, была отдана на кухню и ощищена раньше, чѣмъ я успѣлъ ее подробно разсмотрѣть.

Сем. 30. *Columbidae*. Голубиныя.

167. *Columba livia* L. Сизый голубь.

Мензбиръ, I, 557.

Сизый голубь спорадично распространенъ по всему Кавказскому краю. Я находилъ его и на низменности (Тертеръ, 30. V. 95; низменность Елисаветпольск. уѣзда, 24. IV. 95), но гораздо чаще въ горахъ: по военно-грузинской дорогѣ, на восточной оконечности

Большого Кавказа, между с. Алты-агачъ и ст. Кизиль-Бурунъ; во многихъ мѣстахъ Дагестана; на перевалѣ между Петровскомъ и станціей Атлы-буюнъ; въ Орговскомъ ущельѣ на сѣверномъ склонѣ Агри-дага (24. IX. 900); въ Гельской котловинѣ (30. VIII, с. Окамъ) и проч.

Сколько я знаю, сизый голубъ живетъ въ Закавказьѣ осѣдло. Гнѣздится онъ на скалахъ. Въ большомъ количествѣ гнѣздится онъ въ Кульпахъ, въ заброшенныхъ штольняхъ Соляной горы.

168. *Columba palumbus* L. Витютень.

Мензбиръ, I, 587.

Осѣдлая птица восточнаго Закавказья. Гнѣздящимся я нашелъ его здѣсь во многихъ мѣстахъ низменности и предгорій: сѣверная, лѣсная половина Кубинскаго уѣзда; Алты-агачъ, Шемахинскаго у.; Талышъ. Зимой на нижнемъ теченіи Куры между Джеватомъ и Сальянами я встрѣчалъ громадныя стаи витютней. Въ это время они встрѣчаются иногда въ компаніи съ *Columba livia* и *C. oenas*.

169. *Columba oenas* L. Клинтухъ.

Мензбиръ, I, 582.

На гнѣздовьяхъ я встрѣтилъ клинтуха въ маѣ только въ лѣсахъ долины Куры и Кубинской низменности. Зимой встрѣчается въ стаяхъ вмѣстѣ съ витютнемъ, но всегда въ гораздо меньшемъ количествѣ.

Сем. 31. *Pterocletidae*. Рябковыя.

170. *Pterocles arenarius* Pall.

Мензбиръ, I, 650.

Туртушка (у мѣстныхъ русскихъ).

Маленькую стайку этихъ рябковъ я встрѣтилъ въ августѣ 1893 г. на Эриванской равнинѣ, а въ началѣ октября 1900 г. убилъ одного близъ сел. Дигоръ на Карескомъ плато.

По словамъ А. Б. Шелковникова, этотъ рябокъ нерѣдокъ въ Арешскомъ у. въ половинѣ марта на весеннемъ пролетѣ (куда?). Тогда онъ попадаетъ здѣсь стайками въ 5—6 особей на безводной полынной степи, разстилающейся подъ хребтомъ Арганъ-дагъ.

Отрядъ V. Lariformes. Чайкообразныя.

Сем. 32. Laridae. Чайковыя.

171. *Larus cachinans* Pall.

Мензбиръ, I, 125.

Чуть ли не самая обыкновенная чайка побережья морей Каспійскаго и Чернаго.

30. IV. 97 я осматривалъ громадную колонію чаекъ на сѣверо-западномъ берегу острова Сари. Въ этомъ мѣстѣ берегъ постепенно повышается. Гнѣзда находились на песчаномъ берегу, покрытомъ скудною травянистою растительностью, на той его полосѣ, гдѣ почти оканчивается пологій спускъ къ морю и начинается кустарниковая растительность. Они представляли плоскій лоточекъ изъ грубой сухой травы и помѣщались прямо на землѣ, а не въ ямочкахъ, какъ объ этомъ пишутъ въ нѣкоторыхъ сочиненіяхъ. Яицъ было отъ 1 до 3, чаще всего 2, рѣже всего 3. Большая часть яицъ была сильно насижена, только немногія — еще слабо. Тамъ, гдѣ было по три яйца, они всѣ были очень сильно насижены, уже съ вполне сформировавшимися птенцами, и представляли, вѣроятно, первую, нормальную кладку. Гнѣзда же съ меньшимъ числомъ яицъ, значительно менѣе насиженныхъ, представляли вторую кладку, такъ какъ жители рыболовныхъ ватагъ острова и Ленкорани весною собираютъ ихъ яйца цѣлыми лодками.

172. *Larus canus* L.

Мензбиръ, I, 136.

Въ большомъ количествѣ я наблюдалъ и стрѣлялъ эту чайку въ дельтѣ Волги, въ сентябрѣ 1887 г. Она держалась здѣсь стаями на взморьѣ.

На Кавказѣ я наблюдалъ ее по каспійскому побережью, но не часто.

Larus gelastes Licht. Морской голубокъ.

Мензбиръ, I, 143.

Я наблюдалъ эту чайку въ апрѣлѣ 1891 г. на островѣ Свя-

томъ изъ группы острововъ Кулалы, гдѣ она, повидимому, гнѣздилась.

На кавказскомъ побережьи мнѣ она не попадалась.

173. *Chroicocephalus ichtyaëtos* Pall. Черноголовый мартынь.

Мензбиръ, I, 147.

Черноголовый мартынь (у каспійскихъ рыбаковъ).

Въ настоящее время эта чайка не гнѣздится больше на островѣ Сари, но большое гнѣздовье ея находится на расположенныхъ близъ сѣверной оконечности этого острова мелкихъ островахъ Буранки. Держится преимущественно въ открытомъ морѣ и по его островамъ, а у береговъ перешейка встрѣчается очень рѣдко. 10. VI. 98 я встрѣтилъ этихъ чаекъ въ морѣ близъ Апшеронскаго полуострова.

174. *Chroicocephalus ridibundus* L.

Мензбиръ, I, 152.

18. III. 99 я встрѣтилъ этотъ видъ въ обществѣ другихъ у каладагнинской ватаги, расположенной на протокѣ изъ озера Каладагна (въ южной части Ленкоранскаго уѣзда) въ море.

175. *Chroicocephalus minutus* Pall.

Мензбиръ, I, 158.

Я нерѣдко встрѣчалъ и убивалъ этихъ чаекъ лѣтомъ въ разныхъ пунктахъ каспійскаго побережья.

176. *Hydrochelidon hybrida* Pall.

Мензбиръ, I, 166.

Въ изобиліи гнѣздится по болотамъ вдоль р. Куры. 7. VI. 95 я добылъ нѣсколько экземпляровъ на Курѣ близъ сел. Лямберанъ.

177. *Hydrochelidon leucoptera* Sch.

Мензбиръ, I, 169.

Я наблюдалъ эту крачку только весною. 10. II. 95 я добылъ парочку (♂ и ♀) подѣ Тифлисомъ. Въ апрѣлѣ одна птица этого вида была убита близъ ст. Евлахъ.

178. *Hydrochelidon nigra* L.

Мензбиръ, I, 172.

Около Тифлиса попадалась мнѣ только осенью. Экземпляровъ ея я здѣсь не добылъ, но думаю, что не ошибся въ опредѣленіи.

Проѣзжая по разливу р. Аракса между Сальянами и Пришибомъ (Ленкоранскій уѣздъ) 11. VI. 97, я видѣлъ этихъ крачекъ, посившихъ траву для гнѣздъ. Такое позднее гнѣздованье я объяснилъ себѣ тѣмъ, что первыя кладки погибли у нихъ отъ наводненія. Но то же самое я наблюдалъ здѣсь и въ слѣдующемъ, 1898 году 6. VI.

179. *Sterna anglica* Mont.

Мензбиръ, I, 179.

Эта чайка, столь многочисленная на островахъ сѣверной части Каспійскаго моря, на кавказскомъ побережьи попадалась мнѣ не часто. Я наблюдалъ и добылъ ее вмѣстѣ съ другими видами у каладагнинской рыболовной ватаги 18. III. 99.

28. VI. 97 я добылъ одинъ экземпляръ на озерѣ Ахъ-Зыбиръ Кубинскаго уѣзда близъ сел. Сарванъ, а 10. VII того-же года на томъ-же озерѣ близъ сел. Кутчи*.

180. *Sterna cantiaca* Gmel.

Мензбиръ, I, 192.

Одна изъ обыкновеннѣйшихъ чаекъ каспійскаго побережья.

181. *Sterna caspia* Pall. Каспійская чайка.

Мензбиръ, I, 195.

О каспійской чайкѣ нужно повторить сказанное о предыдущей. На Каспійскомъ морѣ мѣстами, особенно около рыболовныхъ ватагъ, чайки встрѣчаются въ громадномъ количествѣ и не только подпускаютъ на выстрѣлъ, но первое время не обнаруживаютъ никакого страха. Если сбитая первымъ выстрѣломъ чайка только ранена и кричитъ, другія чайки собираются надъ нею въ не-

* Какъ произносятъ на мѣстѣ, или „Куццн“, какъ называется это селеніе на картахъ.

смѣтномъ количествѣ и позволяютъ стрѣлять себя на выборъ. Около упомянутой уже мною ватаги на протокѣ изъ оз. Каладагна въ море 18. III. 99 я, не сходя съ мѣста, убилъ по крайней мѣрѣ семь видовъ *Larus* и *Sterna*, но ни препарировать, ни опредѣлить ихъ всѣхъ на мѣстѣ, къ сожалѣнію, не могъ.

182. *Sterna hirundo* L.

Мензбиръ, I, 182.

Очень обыкновенная гнѣздящаяся птица кавказскаго побережья и рѣчныхъ долинъ восточнаго Закавказья.

Я встрѣтилъ ее на озерѣ Гокчѣ, на оз. Ахъ-Зыбиръ Кубинскаго уѣзда (28. VI и 10. VII. 97), 19. VI. '94 на среднемъ теченіи Аракса у впаденія р. Бергушетъ.

183. *Sterna minuta* L.

Мензбиръ, I, 198.

Добыта мною 10. VII. 97 въ нѣсколькихъ экземплярахъ на оз. Ахъ-Зыбиръ близъ сел. Нижній Кутчи Кубинскаго уѣзда.

Отрядъ VI. *Charadriiformes*. Куликообразныя.

Сем. 33. *Oedienemidae*. Авдотковыя.

184. *Oedienemus scolopax* L. Авдотка.

Мензбиръ, I, 403 (*Oed. crepitans*).

Чобанъ-алладанъ (т. е. „пастуха обманывающая“, татарск.).

Авдотка — обыкновенная гнѣздящаяся птица пустынныхъ степей восточнаго Закавказья, Кубинскаго уѣзда и другихъ частей каспійскаго побережья. Здѣсь чаще всего я встрѣчалъ ее по морскому берегу и солончакамъ, но она держится также и въ мѣстностяхъ со сравнительно густою травой и мелкими кустарниковыми зарослями, напримѣръ, на пути со станціи желѣзной дороги Евлахъ на станцію Барда (по шущинскому тракту). Но въ Елисаветпольскомъ уѣздѣ я не встрѣтилъ ея на плодородной низменности,

тогда какъ на пустынномъ плоскомъ Везъ-дагѣ она была обыкновенна.

Характерный свистъ авдотки слышится уже съ конца марта. Самое раннее наблюденіе — 22. III. 95 у с. Бульдугъ Джеватскаго уѣзда. Въ это время она попадалась мнѣ и въ молодыхъ всходахъ пшеницы, такъ какъ степь была совершенно еще гола. Я встрѣчалъ авдотку обыкновенно подѣ вечеръ, но повсе не рѣдкость встрѣтить ее и днемъ. Завидя человѣка, она только немного отбѣгаетъ въ сторону, а затѣмъ останавливается и, повернувъ голову, съ любопытствомъ осматриваетъ его. Неопытному человѣку кажется, что ее можно легко поймать, такъ какъ при преслѣдованіи она никогда сразу не бѣжитъ далеко, а подпускаетъ на самое близкое разстояніе, затѣмъ необыкновенно быстро отбѣгаетъ на небольшое разстояніе, снова останавливается и т. д. Отсюда и произошло ея татарское названіе „обманивающая пастуха“. Въ пустынныхъ степяхъ по Курѣ и на каспійскомъ побережьи я часто наблюдалъ охоту авдотокъ еще до захода солнца. Молодые днемъ встрѣчаются чаще старыхъ. 7. IV. 95 я встрѣтилъ на разстояніи одной версты нѣсколько молодыхъ авдотокъ около сел. Лямберанъ въ пустынной степи по Курѣ. Онѣ не могли еще летать, но бѣгали очень быстро. На одну изъ нихъ налетѣлъ большой камышовый лунь, но она перевернулась на спину и такъ на него закричала, что онъ поспѣшилъ улетѣть.

У одной авдотки, убитой на берегу моря 7. VI. 96 близъ сел. Кѣланы Кубинскаго уѣзда, въ желудкѣ оказались остатки рака (*Astacus*).

Сем. 34. *Glareolidae*. Тиркушковые.

185. *Glareola pratincola* L. Луговая тиркушка.

Мензбиръ, I, 344.

Я встрѣтилъ тиркушку: въ Ставропольской губ. 7. V. 99 около сел. Дербетовки въ степи по Калаусу; въ Кубинскомъ уѣздѣ около озера Ахъ-Зыбиръ въ іюнѣ и іюлѣ 1897 г. и въ Караязской степи въ Закавказьи 23. VII. 94. Въ іюлѣ стайки ихъ состояли и изъ старыхъ, и изъ молодыхъ. Держались онѣ по заброшеннымъ сухимъ чалтыкамъ и пустыннымъ степямъ. 26. VI. 96 въ южной части Кубинскаго уѣзда на пути изъ сел. Кутчи

въ с. Кёлавы я нашёлъ на землѣ, безъ всякаго гнѣзда, два яйца, повидимому, этого вида, но, къ сожалѣнію, потерялъ ихъ дорогою.

186. *Glareola melanoptera* Nordm. Степная тиркушка.

Мензбиръ, I, 344.

27. VI. 97 близъ сел. Сарванъ на берегу оз. Ахъ-Зыбиръ въ Кубинскомъ уѣздѣ я убилъ въ стайкѣ луговыхъ тиркушекъ одинъ экземпляръ этого вида.

Сем. 35. *Cursoriidae*. Бѣгунковыя.

Cursorius gallicus Gmel. Бѣгунокъ.

Ни одинъ изъ изслѣдователей послѣдняго времени послѣ Нордманна (т. е. съ 1838 г.) не наблюдалъ бѣгунка въ Закавказьѣ. Я думаю, что, если онъ и водился здѣсь прежде, то теперь совершенно перевелся.

Сем. 36. *Charadriidae*. Ржанковыя.

Подсем. *Tringinae*.

187. *Scolopax rusticola* L. Вальдшнепъ.

Мензбиръ, I, 205.

Въ небольшомъ количествѣ гнѣздится въ лѣсахъ около сел. Бакуріани на сѣверномъ склонѣ хребта Цихисъ-Джвари. Я встрѣчалъ вальдшнепа главнымъ образомъ на осеннемъ пролетѣ и зимою около Тифлиса въ садахъ нѣмецкой колоніи Александердорфъ и въ Горійскомъ уѣздѣ. Какъ кажется, на черноморскомъ побережьи онъ зимуетъ въ большемъ количествѣ. 19. X. 906 вальдшнепъ былъ убитъ въ ущельѣ Чороха близъ сел. Марадиди.

188. *Gallinago major* L. Дупель.

Мензбиръ, I, 212 (*Scolopax*).

На Сѣверномъ Кавказѣ въ Ставропольской губ. я убилъ дупеля у сел. Предтеча 6. V. 99. Въ Закавказьи онъ встрѣчался

мнѣ только на весеннемъ пролетѣ. Въ срединѣ марта 1899 г. я встрѣчалъ около Ленкорани большія высыпки дупелей, которыхъ мѣстные охотники безжалостно истребляли, убивая иногда часа въ два — три 30 — 40 штукъ. На пролетѣ дупель встрѣчается и на Гудаурѣ, — слѣдовательно, летитъ прямо черезъ Кавказскій хребтъ.

189. *Gallinago gallinago* L. Бекасъ.

Мензбиръ, I, 217 (*Scolopax*).

16. IV. 900 у Соленого озера близъ Тифлиса я наблюдалъ блестящаго бекаса и убилъ его. За исключеніемъ этого случая, я никогда не наблюдалъ его позднюю весною и лѣтомъ. Онъ, несомнѣнно, во множествѣ зимуетъ во всемъ Закавказьѣ и держится зимою главнымъ образомъ на чалтыкахъ (рисовыхъ плантаціяхъ), представляющихъ искусственныя болота. Осенью я встрѣчалъ его единичными экземплярами подъ Тифлисомъ, въ громадномъ количествѣ въ августѣ и сентябрѣ 1902 г. въ Гельской котловинѣ и въ мартѣ 1895 г. на Мугани близъ Сальянъ.

190. *Limnocyptes gallinula* L. Горшинецъ.

Мензбиръ, I, 225 (*Scolopax*).

Горшинецъ попадался мнѣ въ небольшомъ количествѣ раннею весною въ Ленкоранскомъ уѣздѣ. 6. III. 99 около сел. Андреевки этого уѣзда, при переѣздѣ черезъ болото, горшинецъ слѣлъ около самага моего экипажа, такъ что ямщикъ стегнулъ его жнутомъ, но, къ счастью, не попалъ.

191. *Tringa minuta* Leisl. Песочникъ.

Мензбиръ, I, 234.

Песочникъ встрѣчался мнѣ зимою на Соленыхъ озерахъ около Тифлиса.

192. *Tringa alpina* L. Чернозобикъ.

Мензбиръ, I, 247.

27. VIII. 95 я убилъ одинъ экземпляръ чернозобика на Соленомъ озерѣ у Тифлиса.

193. *Tringa subarquata* Güld. Краснозобикъ.

Мензбиръ, I, 255.

15. V. 99 на соленой лужѣ близъ Ачикулакской ставки (Ставропольской губ.) я убилъ однимъ выстрѣломъ изъ стайки этихъ куликовъ трехъ самцовъ.

Около Тифлиса онъ часто попадался мнѣ осенью и зимою на Соленомъ озерѣ. Экземпляръ коллекціи здѣсь добытъ 3. IX. 95.

Подсем. *Totantinae*.194. *Pavoncella pugnax* L. Турухтанъ.Мензбиръ, I, 275 (*Totanus pugnax*).

Я встрѣчалъ турухтана зимою близъ Тифлиса на Соленыхъ озерахъ и около Ленкорани.

195. *Astītis hypoleucos* L. Перевозчикъ.Мензбиръ, I, 282 (*Totanus hypoleucos*).

Перевозчикъ очень обыкновененъ по всѣмъ рѣкамъ Кавказскаго края. Я встрѣчалъ его и въ разныхъ мѣстахъ Сѣвернаго Кавказа и всюду въ Закавказьѣ, какъ восточномъ, такъ и западномъ. По рѣкамъ онъ поднимается и довольно высоко въ горы. Я встрѣчалъ его все лѣто 1906 г. около Кобулетъ на черноморскомъ побережьѣ у устья р. Кинтришъ, гдѣ онъ, несомнѣнно, гнѣздится, ибо осенью эти кулички летали здѣсь уже выводками. Въ восточномъ Закавказьѣ я нашелъ его гнѣздящимся по Курѣ и Араксу (близъ Мендживанскаго поста 19. VI. 94), а также на многихъ мелкихъ рѣчкахъ.

196. ? *Totanus ochropus* L. Чернышъ.

Мензбиръ, I, 291.

Повидимому, этотъ видъ я наблюдалъ 29. VIII. 900 въ Мисханскомъ ущельѣ (Эриванской губ.). Болѣе онъ мнѣ не попадался.

197. *Totanus glareola* L. Фифи.

Мензбиръ, I, 295.

Фифи обыкновененъ въ Закавказьѣ, гдѣ встрѣчается по рѣкамъ, болотамъ, ручейкамъ и мочежинамъ отъ уровня моря до альпійской области. Въ іюнѣ 1900 г. я встрѣтилъ его на Бусарчиль-

скомъ перевалѣ на болотѣ, дающемъ съ сѣверной стороны ручейки въ бассейнъ Терека, а съ южной — въ бассейнъ Арагвы.

198. *Totanus glottis* L.

Мензбиръ, I, 301.

12. XI. 96 я наблюдалъ этого кулика на отмели р. Куры у сел. Карасахкаль, но добыть его мнѣ не удалось.

199. *Totanus colidris* L. Красноножка.

Мензбиръ, I, 306.

Нерѣдка въ восточномъ Закавказьѣ, особенно въ прикаспійской полосѣ по соленнымъ озерамъ. Вѣроятно, зимуетъ здѣсь, ибо 9. III. 95 я добылъ одинъ экземпляръ около Сальянъ.

200. *Numenius arquatus* L. Большой крошшепъ.

Мензбиръ, I, 321.

7. III. 99 я наблюдалъ большую стаю крошшеповъ между Сальянами и Ленкоранью.

30. VII. 906 видѣлъ стайку въ восемь особей на берегу Чернаго моря около устья р. Кинтришъ.

Подсем. *Phalaropodinae*.

201. *Phalaropus hyperboreus* L. Круглоносый плавунчикъ.

Мензбиръ, I, 313.

Я наблюдалъ плавунчика только въ Ленкоранскомъ уѣздѣ, гдѣ онъ бываетъ зимою.

Подсем. *Himantopodinae*.

202. *Recurvirostra avocetta* Briss. Шилоклювка.

Мензбиръ, I, 337 (*Himantopus avocetta*).

Я нашелъ шилоклювку гнѣздящуюся на болотахъ по среднему теченію р. Куры, на озерѣ Ахъ-Зыбиръ въ южной части Кубинскаго уѣзда и по соленнымъ лужамъ Ставропольской губ. близъ ставки Ачикулакъ.

203. *Himantopus himantopus* L. Ходулочникъ.Мензбиръ, I, 340 (*H. melanopterus*).

Ходулочникъ гнѣздится почти въ тѣхъ же самыхъ мѣстахъ, гдѣ и шилоклювка; я встрѣчалъ его въ камышовыхъ заросляхъ по болотамъ вдоль средняго теченія Куры и на озерѣ Ахъ-Зыбиръ.

Подсем. *Charadriinae*.204. *Vanellus vanellus* L. Чпбпсъ.Мензбиръ, I, 365 (*V. cristatus*).

Обыкновенная гнѣздящаяся птица низменности восточнаго Закавказья и Кубинскаго уѣзда. Кромѣ того я встрѣчалъ его также во множествѣ на Эриванской равнинѣ, по маленькимъ рѣчкамъ, какъ Тандурекъ-чай, въ южной части Эриванской губ. и въ Гельской котловинѣ. Въ восточномъ Закавказьѣ зимуетъ на низменности, гдѣ особенно охотно держится по чалтыкамъ.

205. *Eudromias cantianus* Lath. Морской зуекъ.Мензбиръ, I, 373 (*Charadrius cantianus*).

Я встрѣчалъ морского зуйка довольно часто на берегу Каспійскаго моря. Мои экземпляры были добыты мною въ Кубинскомъ уѣздѣ между селеніями Нижн. Кутчи и Кѣланы. Они кормятся на линіи прибоа. Бѣгаютъ такъ быстро, что подстрѣленныхъ нельзя догнать пѣшему.

206. *Eudromias asiaticus* Pall. Каспійскій зуекъ.Мензбиръ, I, 374 (*Charadrius asiaticus*).

Каспійскаго зуйка я часто встрѣчалъ и убивалъ на берегу моря въ Ленкоранскомъ уѣздѣ.

207. *Eudromias Geoffroyi* Wagl. Толстоклювый зуекъ.Мензбиръ, I, 376 (*Charadrius geoffroyi*).

29. V. 97 я убилъ самку этого вида на берегу Каспійскаго моря противъ сел. Шахъ-Агачъ Ленкоранскаго уѣзда. Больше я его не встрѣчалъ.

208. *Eudromias morinellus* L. Глухая сивка.Мензбиръ, I, 385 (*Charadrius morinellus*).

Я встрѣчалъ этотъ видъ только на весеннемъ пролетѣ, въ мартѣ, на среднемъ теченіи Куры, но ни одного изъ убитыхъ препарировать не пришлось. Экземпляръ 431, 1 каталога Радде съ датою „29. III. 94“ и помѣченный имъ: „Unt. Kura....Sat.“, добытъ не мною, а А. Б. Шелковниковымъ, и не на нижней Курѣ, а въ Арешскомъ уѣздѣ.

209. *Aegialites curonicus* Bes. Малый зукъ.Мензбиръ, I, 378 (*Charadrius minor*).

На гнѣздовѣ я встрѣтилъ малаго зуйка по р. Курѣ, въ Елисаветпольскомъ уѣздѣ, 28. IV. 95 я убилъ парочку (♂ и ♀) въ мѣстѣ Самухъ, и въ Ленкоранскомъ уѣздѣ. Можетъ быть, онъ гнѣздится и на Соленомъ озерѣ около Тифлиса, такъ какъ одинъ экземпляръ былъ убитъ здѣсь мною 16. IV. 900. Лѣтомъ 1906 г. я наблюдалъ его гнѣздящимся въ устьѣ рр. Дегва, Кинтришъ и Ачкуа, которыя, сливаясь вмѣстѣ, образуютъ нѣсколько мелкихъ островковъ.

210. *Aegialites hiaticula* L. Зукъ - галстушникъ.Мензбиръ, I, 381 (*Charadrius hiaticula*).

Я встрѣчалъ галстушника только осенью близъ Тифлиса на Соленомъ озерѣ, гдѣ эта птичка держалась небольшими стайками. Экземпляры моей коллекціи были добыты 3. IX. 95. У мѣстныхъ препараторовъ я видѣлъ экземпляры этого зуйка, добытые здѣсь же и въ апрѣлѣ, почему я думаю, что, можетъ быть, онъ здѣсь и гнѣздится.

Отрядъ VII. *Gruiformes*. Журавлеобразныя.Сем. 37. *Otidæ*. Дрофовыя.211. *Otis tarda* L. Дрофа.

Мензбиръ, I, 441.

Дойдахъ (татарск.).

Въ Закавказьѣ бываетъ только зимою. Въ февралѣ 1898 года

я нашелъ растерзанную какимъ то хищникомъ дрофу около Соленого озера близъ Тифлиса.

По наблюденіямъ А. Б. Шелковникова, дрофа зимуетъ въ Арешскомъ уѣздѣ въ полынныхъ степяхъ. Въ теплыя зимы появляется здѣсь лишь въ небольшомъ числѣ.

212. *Otis tetrah* L. Стрепетъ.

Мензбиръ, I, 434.

Бѣзгекъ (татарск.).

Я нашелъ стрепета гнѣздящимся въ значительномъ количествѣ въ степяхъ Елисаветпольскаго, Джеванширскаго и Шумшинскаго уу. Елисаветпольской губ. и въ степи около сел. Кумторкале, близъ гор. Петровска на каспійскомъ побережьѣ. 24. IV. 95 я убилъ близъ сел. Кадели Елисаветпольскаго уѣзда въ травянистой степи самца въ прекрасномъ брачномъ нарядѣ и еще 7. VI. 95 видѣлъ около сел. Лямберанъ въ такомъ же нарядѣ. Зимой стрепетъ появляется въ Закавказьѣ громадными стаями, и, чѣмъ холоднѣе зима, тѣмъ въ большемъ количествѣ. Заимствую изъ любезно предоставленныхъ мнѣ записокъ А. Б. Шелковникова слѣдующія относящіяся къ Арешскому уѣзду Елисаветпольской губ. наблюденія. „Зимуютъ у насъ въ громадномъ количествѣ. Держатся исключительно въ полынной степи подъ горами Арчанъ-дагъ, гдѣ кормятся сѣменами полыни, такъ что мясо ихъ получаетъ сильный запахъ этого растенія. Иногда среди зимы наблюдается перекочевка громадныхъ стай стрепетовъ вдоль подножья Арчанъ-дага. Такъ, 20 и 21. I. 94 съ утра до вечера низко надъ землею съ востока на западъ одна за другою летѣли стаи стрепетовъ. Рѣзкихъ переměнъ температуры въ эти дни не было. Въ теплыя безснѣжныя зимы прилетѣтъ крайне ограниченъ или его совсѣмъ нѣтъ. На лѣто остаются лишь отдѣльныя пары“.

Я встрѣчалъ стрепетовъ еще стаями въ концѣ марта.

Сем. 38. *Gruidae*. Журавлиныя.

213. *Grus cinerea* Bechst. Журавль.

Мензбиръ, I, 416.

Дурна (татарск.).

Въ восточномъ Закавказьѣ журавль бываетъ только весною и осенью на пролетѣ. Около Тифлиса я наблюдалъ весенній про-

летъ въ началѣ марта. 2. III. 900 въ 'окрестностяхъ Тифлиса я наблюдалъ громадную стаю журавлей, въ которой, по приближительному подсчету, было не менѣе 200 особей, такъ какъ въ меньшемъ крылѣ — они летѣли неправильнымъ треугольникомъ — было 80 особей, а оно было чуть не вдвое короче другого. Крылья были, однако, неправильны и составляющіе ихъ журавли то опережали, то догоняли другъ друга, такъ что вся линія волнообразно извивалась. Потомъ всѣ сбились въ одну кучу и стали кружиться надъ Соленымъ озеромъ, куда, кажется, въ концѣ концовъ и опустились. Въ Арешскомъ уѣздѣ г. Шелковниковъ наблюдалъ ихъ весенній пролетъ ранній 3. III. 94, поздній — 22. IV. 95.

Въ западномъ Закавказьѣ журавль гнѣздится въ громадномъ количествѣ на Закавказскомъ плоскогорьѣ, особенно же въ Гельской котловинѣ, въ области истоковъ р. Куры. Здѣсь журавли держатся все лѣто и выводятъ дѣтей на неприступныхъ болотахъ, покрывающихъ эту котловину. Во время моего пребыванія здѣсь въ сентябрѣ 1902 г. они держались по большей части большими стадами до 100 и болѣе особей, но нѣкоторые держались еще и отдѣльными парами. Я уѣхалъ оттуда 23. IX, но журавли еще не улетали, хотя уже 14. IX разразилась сильная снѣжная метель при нѣсколькихъ градусахъ холода и снѣгъ лежалъ нѣсколько дней. Журавли только собирались въ еще большія стаи и летали кругами высоко въ воздухѣ: вѣроятно, они готовились къ отлету.

Въ Тифлисѣ осенній пролетъ я наблюдалъ въ началѣ сентября въ 1898 г. (3 и 5. IX), Шелковниковъ въ Арешскомъ уѣздѣ — 17, 20 и 21. VIII. 94. Въ 1900 г. въ Кульпахъ я замѣтилъ пролетныя стаи журавлей 1 и 2. IX.

214. *Grus leucogeranus* Pall. Стерхъ.

Мензбиръ, I, 422.

Въ коллекціяхъ нѣкоторыхъ любителей я видѣлъ чучела стерха. Эти птицы были убиты гдѣ то на каспійскомъ побережьѣ къ югу отъ Апшеронскаго полуострова.

215. *Grus spec.? (an leucauchen Temm.?)* Черный журавль.

Старожилъ г. Ленкорани баронъ Б. Л. Тизенгаузенъ сообщилъ мнѣ объ этомъ загадочномъ журавлѣ слѣдующее:

„16 марта 1876 года въ Астаринскомъ магалѣ (южная часть Ленкоранскаго уѣзда) въ мѣстности Ниабутъ Асланъ (мой

охотникъ) привесъ убитаго имъ журавля, вида котораго я опредѣлить не могъ. Журавль этотъ отличался отъ обыкновенныхъ журавлей тѣмъ, что онъ былъ больше, шею имѣлъ почти бѣлую съ черноватыми полосками по бокамъ шеи; полосы эти къ туловищу уширялись. Голова этого журавля была красноватая шершавая, покрыта какъ бы бородавками краснаго цвѣта и рѣдкими жесткими волосками. Носъ сѣро-зеленоватаго цвѣта, ноги красноватыя, концы пальцевъ искрасна-черные. Крылья черно-сѣрыя съ синимъ отливомъ. Вообще все опереніе темнѣе, чѣмъ у обыкновеннаго журавля. Убитъ на большой полянѣ, покрытой осокою и мелкою травою, около деревни Санджарады на мѣстности Даштылыгджаръ. Асланъ передалъ, что онъ его убилъ, встрѣтя въ числѣ семи штукъ въ стаѣ обыкновенныхъ журавлей, которые, летя изъ Персін, остановились отдыхать на этой полянѣ. При этомъ онъ заявилъ, что мѣстнаго названія его нѣтъ, такъ какъ онъ является очень рѣдко, а онъ отличаетъ его потому, что этотъ журавль темнѣе обыкновеннаго. На другой день я отправился на это мѣсто, но журавлей тамъ уже больше не было.

„5 марта 1892 года по почтовой дорогѣ между станціею Кумбаши и русскимъ селеніемъ Николаевка (сѣверная часть уѣзда) я видѣлъ убитаго однимъ изъ жителей селенія Сарчеваръ журавля. Этотъ охотникъ мнѣ объяснилъ, что онъ его убилъ въ стаѣ обыкновенныхъ журавлей и убилъ потому, что ему показалась странною его бѣлая шея. Журавль этотъ былъ больше обыкновеннаго и отличался отъ него еще слѣдующими признаками: голова красноватая, покрытая какъ бы бородавками и темными рѣдкими волосками; шея бѣлая, по бокамъ съ черною полоскою, которая идетъ до туловища; носъ зеленовато-сѣрый, ноги красныя, концы пальцевъ черные, все опереніе темно-дымчатое. Другіе жители селенія Сарчеваръ, которымъ я показывалъ этого журавля, называли его „кечалъ дурна“ (*паршивоголовый журавль*); также говорили, что его называютъ „іюль-герсатанъ“ (*указывающій дорогу*) и „дурна чаушъ“ (*журавль-вожакъ*). Охотникъ, убившій этого журавля, говорилъ, что онъ его встрѣчалъ очень рѣдко въ своей жизни, несмотря на то, что охотится постоянно (охотнику 50 лѣтъ), и убиваетъ его лишь въ третій разъ и всегда въ стаѣ обыкновенныхъ журавлей, въ которой такихъ журавлей бываетъ не болѣе трехъ. Талышинцы называютъ его „вожакомъ“ потому, что, по ихъ замѣчанію, онъ бываетъ рѣдко и всегда въ стаѣ сидитъ на-сторожѣ, охраняетъ стадо, предупре-

ждая его объ опасности, собирает стада журавлей и руководить ими при перелетѣ“.

Сем. 39. Rallidae. Пастушковые.

216. *Fulica atra* L. Лысуха.

Мензбиръ, I, 449.

Кашкалдакъ (татарск.).

Обыкновенная осѣдлая птица низменности восточнаго Закавказья. Она держится на всѣхъ большихъ и маленькихъ озерахъ, лишь бы на нихъ росъ камышъ. Около Тифлиса она живетъ осѣдло въ большомъ количествѣ на всѣхъ расположенныхъ около него озерахъ—Черепашьемъ, Лиси и Соленомъ. Въ громадномъ количествѣ она встрѣчена мною по болотистымъ озерамъ и разливамъ по среднему теченію Куры, по разливамъ Аракса и по морцамъ Ленкоранскаго уѣзда.

Во время моего пребыванія въ имѣніи А. Б. Шелковникова въ Арешскомъ уѣздѣ татаринъ принесъ ему 9. V. 95 двѣ кладки лысухи, по 8 совершенно свѣжихъ яицъ. По словамъ г. Шелковникова, полная кладка заключаетъ 11—12 яицъ. Гнѣзда устраиваются на неглубокой водѣ. Зимой лысухи собираются громадными стаями и держатся очень строго. Да и въ другое время онѣ здѣсь гораздо осторожнѣе, чѣмъ, напримѣръ, въ Астраханской губерніи, такъ какъ татары очень цѣнятъ ихъ мясо и ожесточенно преслѣдуютъ ихъ.

217. *Gallinula chloropus* L.

Мензбиръ, I, 453.

И мнѣ, и А. Б. Шелковникову водяная курица попадалась только зимою, по среднему теченію Куры. Гнѣздится ли она здѣсь, я не знаю.

218. *Porphyrio poliocephalus* Lath. Султанка.

Мензбиръ, I, 458.

Боя-хана (татарск.); парсухъ (талышинск.).

Я встрѣчалъ султанку зимою на Мугани близъ Сальянъ и весною въ заросляхъ по разливу Аракса, на пути между Салья-

нами и Ленкоранью и, наконецъ, около самой Ленкорани на Ольховскомъ морцѣ. Однажды въ апрѣлѣ я видѣлъ съ лодки цѣлое дерево (иву), облѣпленное султанками. Онѣ любятъ сидѣть на почти вертикальномъ сучкѣ, ухватившись за него такъ, что одна лапа находится надъ другой, а туловище параллельно сучку. Биологическихъ наблюдений надъ образомъ жизни этой птицы мнѣ самому дѣлать не пришлось, — поэтому я помѣщаю здѣсь тѣ наблюденія, которыя еще въ 1903 году передалъ мнѣ баронъ Б. Л. Тизенгаузенъ.

„Самца можно отличить отъ самки лишь во время брачнаго періода, такъ какъ тогда цвѣтомъ онъ гораздо ярче и какъ-то осанистѣй. Птица эта, на большихъ ногахъ съ довольно длинными пальцами, очень хорошо бѣгаетъ въ камышовыхъ заросляхъ, дѣлая довольно большіе шаги. Большею частью она старается спастись бѣгомъ и крайне неохотно взлетаетъ; летитъ всегда по прямому направленію и тихо, тяжелымъ полетомъ; когда бѣжитъ, то хвостъ свой держитъ кверху и немного вбокъ, постоянно имъ встряхивая. Эту привычку она имѣетъ и тогда, когда стоитъ въ покоѣ, и хвостикъ настолько высоко поднимаетъ, что виденъ бѣлый цвѣтъ подхвостныхъ перьевъ.

„Султанка водится къ югу отъ устья Куры вдоль болотистыхъ береговъ Каспія, по всѣмъ морцамъ, озерамъ и болотамъ. Постоянное пребываніе султанки и любимыя мѣста ея — камышовыя заросли. Живутъ султанки небольшими стайками отъ пяти до восьми штукъ, но въ февралѣ мѣсяцѣ мнѣ случалось ихъ встрѣчать и большими стаями, до ста штукъ и болѣе, собравшихся въ открытыхъ мѣстахъ на укромныхъ лужайкахъ, находящихся среди камышей.

„Я пришелъ къ тому заключенію, что, такъ какъ султанка собирается въ большія стаи за нѣсколько времени передъ спариваніемъ, то собирается специально для спариванія, устраивая тѣмъ родъ тока. Какъ только стая услышитъ или увидитъ какую либо опасность, то всѣ султанки моментально быстро убѣгаютъ въ противоположную сторону отъ слышаннаго ими шума и бѣгутъ, сильно вытянувъ впередъ шею.

„Въ концѣ марта или первыхъ числахъ апрѣля султанки начинаютъ гнѣздиться. Гнѣзда дѣлаютъ, выбирая мѣста самыя глухія и малодоступныя, въ самыхъ густыхъ камышахъ и заросляхъ, на земляныхъ кочкахъ или старыхъ кустахъ куки или другой болотной травы и устраиваютъ ихъ слѣдующимъ образомъ: сна-

чала на земляную кочку или сухой кусть травы укладывают довольно толстый слой сухого камыша, настолько высокій, что даже во время половодья онъ не затопляется; на этотъ камышъ накладывают сухую осоку и другія мелкія травы; лотокъ гнѣзда выстилаютъ камышовыми метелками и дѣлаютъ не очень глубокимъ. Кладутъ отъ трехъ до пяти яицъ, которыя меньше утиныхъ, похожи формою и величиною на яйца лыски „кашкалдакъ“ (*Fulica atra*), но только гораздо нѣжнѣе, желто-зеленоватаго цвѣта, покрыты мутно-бурыми пятнами круглой, а иногда и продолговатой формы, и небольшой величины. Высиживаютъ ихъ отъ 22 до 25 дней; въ очень густыхъ тѣнистыхъ мѣстахъ дольше, чѣмъ на мѣстахъ, куда проникаютъ солнечные лучи. На яйцахъ большею частью сидитъ самка; самецъ хотя и помогаетъ самкѣ, но очень мало. Мнѣ случалось наблюдать, что, когда самка слѣзаетъ съ гнѣзда, она кричитъ, издавая особый звукъ, похожій на крикъ сѣрой цапли, но рѣзче, на который прибѣгаетъ, а иногда и прилетаетъ самецъ и садится на гнѣздо; тогда самка отправляется кормиться и въ отсутствіи бываетъ около полутора часа. Какъ только она вернется, самецъ сейчасъ же слетаетъ съ гнѣзда. Если самка запаздываетъ и долго не является къ гнѣзду, то самецъ пронзительнымъ крикомъ начинаетъ вызывать самку и не слѣзаетъ до тѣхъ поръ, пока она не прилетитъ. Разъ какъ-то случилось, что мой проводникъ-лодочникъ во время моихъ наблюденій убилъ слетѣвшую для корма самку. Самецъ ждалъ ее долго, постоянно испуская крики, и, видя, что самка не прилетаетъ, а солнце уже близко къ закату, прыгнулъ съ гнѣзда и побѣждалъ по слѣдамъ самки. Пробѣгавъ съ четверть часа, онъ снова вернулся къ гнѣзду и, сѣвъ опять на яйца, уже больше не испускалъ своихъ криковъ. Приѣхавъ на другой день послѣ полудня къ этому гнѣзду, я самца не засталъ, а четыре яйца были расклеваны, по всей вѣроятности, самимъ самцомъ. Маленькіе птенцы крайне некрасивы: съ большою головою, покрыты темно-бурымъ пухомъ и съ непропорціонально длинными ногами. Пока птенцы въ гнѣздѣ, гдѣ они остаются до четырехъ дней, самка и самецъ не вылѣзая поочередно прикрываютъ ихъ. Въ особенности интересно видѣть во время дождя, какъ самка и самецъ прикрываютъ птенцовъ своихъ, растопыривъ надъ ними свои крылья. Замѣчательно еще то, что самка и самецъ всходятъ и сходятъ съ гнѣзда всегда въ одномъ мѣстѣ, гдѣ гнѣздо значительно примято, и даже по илу видны въ одномъ направленіи слѣды, идущіе отъ гнѣзда, но не болѣе,

какъ фута на два. Водить птенцовъ одна самка и на землѣ ихъ прикрываетъ крыльями точно такъ же, какъ простая курица. Слѣчается, что и послѣ весь выводокъ ночуетъ въ гнѣздѣ, но, когда птенцы подрастаютъ, то нѣсколько самокъ соединяются въ одно небольшое стадо и укрываются съ птенцами въ самыя укромныя мѣста глухихъ камышей; въ это время присоединяются къ нимъ и самцы. Мѣстные жители увѣряли, что очень часто бываетъ у одного самца до трехъ самокъ; мнѣ же самому это примѣтить не удавалось; могу лишь сказать, что, когда въ мартѣ мѣсяцъ мнѣ приходилось поднимать султанокъ изъ камышей, то онѣ взлетали большею частью парами и всегда улетали по направленію къ густымъ камышамъ. У нѣкоторыхъ охотниковъ сложилось мнѣніе, что султанка въ началѣ весны отлетаетъ и является къ намъ въ концѣ сентября или началѣ октября, но это предположеніе крайне ошибочное. Я съ достовѣрностью могу сказать, что султанка не перелетная птица, да и по своему сложенію далеко летѣть не можетъ, и предположеніе, что султанка — птица перелетная, сложилось оттого, что она дѣйствительно съ марта мѣсяца по октябрь ведетъ скрытый образъ жизни. И въ это время ихъ въ Талышѣ увидѣть въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ онѣ попадаютъ обыкновенно зимою, почти что невозможно, а это происходитъ отъ того, что въ концѣ февраля султанки начинаютъ пароваться, потомъ прячутся въ густые, малодоступные камыши, гдѣ дѣлаютъ гнѣзда, высиживаютъ птенцовъ, выращиваютъ ихъ, и, наконецъ, старыя птицы линяютъ, и потомъ, за спадомъ воды въ болотахъ, въ густыхъ камышахъ онѣ имѣютъ все лѣто обильную пищу, что обыкновенно продолжается съ марта по октябрь. Зимой же, въ особенности, когда выпадаетъ снѣгъ или замерзнутъ болота, по берегамъ ихъ появляется громадное количество истощенныхъ султанокъ. Въ прежнія времена, въ то время, когда выпадали глубокіе снѣга и озеро и берега моря въ камышахъ замерзали, несчастныя султанки залетали во дворы жилыхъ домовъ, совершенно изнуренныя и настолько худыя, что никуда не были годны. Мясо султанокъ бѣлаго цвѣта, нѣжное и очень вкусное, не уступаетъ фазану.

„Въ неволѣ султанка скоро осваивается и дѣлается совершенно ручною, привыкаетъ къ дому, ходить по двору вмѣстѣ съ обыкновенными курами, при чемъ необходимо, однако, чтобы крылья были у нихъ сшиты или связаны, — въ противномъ случаѣ онѣ взлетаютъ на деревья и съ одного на другое добираются до бо-

лота. Онѣ узнають очень хорошо то лицо, которое даетъ имъ кормъ, и отличаютъ звукъ его голоса, стремительно прибѣгая на его зовъ. У меня пара султанокъ жила около трехъ лѣтъ и сдѣлалась настолько ручною, что привыкла къ свистку, и, когда приходилось имъ свистнуть или же прямо звать: „султанка, султанка!“, онѣ стремительно прибѣгали, брали изъ рукъ куски хлѣба, сначала въ клювъ, а изъ клюва въ лапу, и, стоя на одной ногѣ, преспокойно ѣли хлѣбъ, отщипывая по кусочкамъ и поднося каждый разъ лапку съ хлѣбомъ къ клюву. Но, какъ бы вы ни приучали ихъ къ дому, онѣ во время спариванія и вообще во время гнѣздованія непременно удираютъ изъ дома въ камыши, такъ что въ эту пору (февраль и мартъ) мнѣ приходилось держать ихъ взаперти. Во время линянія мои султанки постоянно прятались подъ балконъ или же за большой ларь съ ячменямъ и выходили очень рѣдко, и то лишь для того, чтобы выкупаться въ водѣ, для нихъ приготовленной. Во время линянія онѣ очень вялы и кажутся какъ бы больными.

„На свободѣ султанка питается молодыми стеблями камыша и куки, а въ концѣ лѣта любимую пищу ея служить болотный каштанъ (чилимъ). Въ неволѣ султанка питается разнаго рода зерномъ, плодами, овощами, любитъ печеный хлѣбъ, ѣсть хорошо сырое и вареное мясо и не брезгаетъ кухонными отбросами“.

219. *Crex crex* L. Коростель.

Мензбиръ, I, 461 (*Crex pratensis*).

Йельба (татарск., по Шелковникову).

Я встрѣчалъ коростеля на гнѣздовѣ въ восточномъ Закавказьѣ повсюду, гдѣ степи не имѣютъ характера пустыни (Елисаветпольскій и Арешскій уу. Елисаветп. губ.), въ Шемахинскомъ у. въ предгорьяхъ Большого Кавказа (Халтава и Маразы 2. V. 96), въ предгорьяхъ Кубинскаго у., на умѣренной высотѣ всюду въ Дагестанѣ, приблизительно до 5—6000', и на западно-кавказскомъ плоскогорьѣ, въ Эриванской губ. и Каресской области. Держится только въ мѣстностяхъ, покрытыхъ высокою густою травой, и въ хлѣбахъ. Время прилета и отлета его не замѣтилъ, но убивалъ коростелей по Курѣ уже въ первой половинѣ апрѣля, а послѣдняго убилъ въ Кульпахъ 27. IX. 900.

220. *Porzana parva* Scop.

Мензбиръ, I, 466.

Одинъ экземпляръ добытъ А. Б. Шелковниковымъ 20. III. 94. Мнѣ самому этотъ видъ не попадался.

221. *Porzana maruetta* Leach.

Мензбиръ, I, 471.

Встрѣчалъ ее весною, въ мартѣ, по среднему теченію Куры. По Шелковникову, гнѣздится въ Арешскомъ уѣздѣ.

222. *Rallus aquaticus* Briss. Водяной пастушокъ.

Мензбиръ, I, 474.

Мнѣ почему-то никогда не попадался, но въ коллекціяхъ любителей я видѣлъ многочисленные экземпляры пастушка, убитые подъ Ленкоранью, преимущественно зимою.

Отрядъ VIII. Galliformes. Куринообразныя.

Сем. 40. Tetraonidae. Тетеревиныя.

223. *Lygurus Mlocosieviczi* Taczan. Кавказскій тетеревъ.

Мензбиръ, I, 489.

Въ дополненіе къ имѣющимся свѣдѣніямъ о распространеніи кавказскаго тетерева я могу сообщить лишь слѣдующее. Онъ водится въ горахъ около Делижанскаго ущелья, въ Артвинскомъ округѣ на пограничномъ съ Турціею хребтѣ и на Аджарскомъ хребтѣ.

Сем. 41. Phasianidae. Фазаны.

224. *Coturnix coturnix* L. Перепелъ.Мензбиръ, I, 522 (*C. communis*).

Бильдерчи (татарск.).

Перепелъ гнѣздится во всемъ Кавказскомъ краѣ и всюду очень обыкновененъ. На гнѣздовѣхъ я встрѣчалъ его отъ высоты,

лишь немного превышающей уровень моря, до альпийских лугов. На низменности восточнаго Закавказья онъ встрѣчается тамъ, гдѣ есть хорошая трава (напр., Елисаветп. у.), и не встрѣчается въ пустынныхъ степяхъ. По посѣвамъ онъ распространяется до альпийской области. Я встрѣтилъ его въ періодъ гнѣздовья на альпийскихъ лугахъ многихъ мѣстъ Дагестана и на Маломъ Кавказѣ на Муровъ-дагѣ. Въ западномъ Закавказьѣ онъ гнѣздится на Закавказскомъ плоскогорьѣ и въ Гѣльской котловинѣ. Осенью (въ августѣ) я встрѣчалъ перепела и на черноморскомъ побережьѣ у Кобулетъ, но за цѣлое лѣто ни разу его не слышалъ. Осенью перепела сваливаютъ на хлѣбныя поля, при чемъ обнаруживаютъ особое пристрастіе къ просу. На пролетѣ встрѣчаются въ громадномъ количествѣ. Въ небольшомъ числѣ зимуютъ на низменности восточнаго Закавказья. Даже на высотѣ около 7500' въ Гѣльской котловинѣ я встрѣчалъ перепеловъ еще въ началѣ сентября.

225, а. *Perdix perdix* L. Сѣрая куропатка.

Мензбиръ, I, 527 (*Perdix cinerea*).

225, б. *Perdix perdix canescens* Buturlin. Закавказская сѣрая куропатка.

Buturlin, Ibis, 1906, p. 411.

Чилъ (татарск., по Шелковникову).

Сѣрая куропатка живетъ осѣдло въ плодородныхъ частяхъ низменности восточнаго Закавказья, Кубинскаго у. и Эриванской равнины. По Шелковникову, гнѣздится въ сѣверной части Арешскаго у. на плоскогорьѣ Суруджи подъ горами. Въ октябрѣ мѣсяцѣ куропатка въ значительномъ числѣ перекочевываетъ въ южную, низменную часть уѣзда, гдѣ и держится табунками до весны. Въ незначительномъ числѣ онѣ гнѣздятся и здѣсь. Зимой держатся близъ полей и рисовыхъ плантацій въ кустарникахъ и заросляхъ держи-дерева.

Въ ноябрѣ куропатки держатся въ значительномъ числѣ около г. Эривани. Эриванскія сѣрыя и каменные куропатки откармливаются главнымъ образомъ рисомъ, и потому жирнѣе и вкуснѣе куропатокъ изъ другихъ мѣстностей и цѣнятся на тифлисскомъ рынкѣ дороже послѣднихъ. Цѣна пары сѣрыхъ куропатокъ въ Тифлисѣ — отъ 80 к. до 1 р. 20 к.

На Сѣверномъ Кавказѣ я наблюдалъ сѣрую куропатку около станции Червленной Терской области въ маѣ 1899 г. среди песчаной степи. Вѣроятно, тамошняя сѣрая куропатка относится къ типичной формѣ.

226. *Caccabis chukar* Gray. Горная курочка.

Мензбиръ, I, 533.

Кягликъ (татарск.).

Обыкновенная охотная птица всего Закавказья. Вертикальное распространение горной курочки удивительно велико: она гнѣздится отъ низменности восточнаго Закавказья, лишь немного возвышающейся надъ уровнемъ моря, до высоты около 10000'. На низменности я нашелъ горную курочку на гнѣздовѣхъ у сел. Кадели Елисаветп. у. близъ Куры, гдѣ она гнѣздилась (22. IV. 95) вмѣстѣ съ турачемъ, и около с. Мансурлы въ томъ же уѣздѣ на Курѣ (1. V. 95). Въ большомъ количествѣ встрѣчается она по предгорьямъ и горамъ, лишеннымъ лѣса. На большой высотѣ я встрѣчалъ ее въ Дагестанѣ близъ ауловъ Курахъ и Курушъ, и на Маломъ Араратѣ (9500'). Отъ достойныхъ довѣрія охотниковъ я слышалъ неоднократно, что она водится у самыхъ ледниковъ вмѣстѣ съ горною индѣйкою. Что касается горизонтальнаго распространения этой птицы на Кавказѣ, то я находилъ ее въ восточномъ и южномъ Дагестанѣ, по всему южному склону Большого Кавказа (уу. Шемахинскій, Нухинскій, Сигнахскій и Душетскій и Закатальскій округъ), на всемъ Маломъ Кавказѣ, Закавказскомъ плоскогорьѣ и пограничныхъ горахъ — на Араратахъ, Агридагѣ и въ Артвинскомъ округѣ.

Любимое мѣстопробываніе курочки — каменистые склоны горъ, покрытые ксерофильною растительностью. Въ поистинѣ громадномъ количествѣ я встрѣчалъ ихъ въ ущельяхъ рѣчекъ, текущихъ съ Малаго Кавказа въ Араксъ (Агера, Бергушетъ), по сѣверному склону Агридага и около Ольтъ. На черноморскомъ побережьѣ горная курочка мнѣ не попадалась и, вѣроятно, не встрѣчается здѣсь, такъ какъ не любитъ ни сырости, ни пышной растительности. Въ ущельѣ Чороха она встрѣчается не ниже сел. Борчхи, а выше, у Артвина и по дорогѣ отсюда къ мѣст. Арданучъ обыкновенна. Изрѣдка она встрѣчается и на горахъ среди лѣсовъ, напр., на хребтѣ Цихисъ-Джвари выше сел. Бакуриани.

Пищу курочки составляют сѣмена различныхъ травъ, а также въ небольшомъ количествѣ и насѣкомыя. Тамъ, гдѣ ихъ много, какъ, напр., въ Эриванской губ. и Ольгинскомъ округѣ, не рѣдкость встрѣтить ихъ на дорогѣ, расклеивающихъ пометъ. Осенью и зимою онѣ держатся по-близости хлѣбныхъ полей и чалтыковъ и сильно раскармливаются оставшимся отъ уборки зерномъ, такъ что дѣлаются очень жирными. Яйца кладутъ въ маѣ, обыкновенно по 12 штукъ; 27. V. 95 я нашелъ въ урочищѣ Джанъ-ятагъ (Джеванширскій у. Елисаветпольской губ.) гнѣздо съ 14 сильно насиженными яйцами.

Цѣна пары курочекъ въ Тифлисѣ — отъ 90 к. (кахетинскія) до 1 р. 80 к. (эриванскія).

227. *Tetraogallus caucasicus* Pall. Кавказская горная индѣйка.

Мензбиръ, I, 540.

Я охотился на горную индѣйку только въ двухъ мѣстахъ въ Дагестанѣ — около аула Курахъ и на Шахъ-дагѣ. Здѣсь эти птицы держались около самыхъ ледниковъ и были обыкновенны, какъ и всюду въ такихъ мѣстахъ въ Дагестанѣ. По словамъ сопровождавшихъ меня лезгинъ, онѣ кладутъ яйца въ началѣ юля, отъ двухъ до четырехъ.

228. *Tetraogallus caspius* Gmel. Каспійская горная индѣйка.

Мензбиръ, I, 543.

Каспійскую горную индѣйку я встрѣтилъ только однажды — 23. IX. 900 на Зорскихъ высотахъ въ хребтѣ Агри-дагъ. Она водится и на Араратѣ, но тамъ мнѣ не встрѣтилась. Также тщетно искалъ я ее и на Талышинскихъ горахъ, но на Саваланѣ (въ Персіи) она, по словамъ мѣстныхъ жителей, нерѣдка.

229. *Attagen francolinus* L. Турачъ.

Мензбиръ, I, 545.

Турачъ (у всѣхъ народовъ восточнаго Закавказья).

Турачъ живетъ только въ степяхъ восточнаго Закавказья и область его распространенія быстро сокращается съ каждымъ годомъ. Я не могу даже ручаться, что онъ встрѣчается еще во всѣхъ тѣхъ мѣстахъ, которыя я упоминаю ниже. Перехожу къ подробному разсмотрѣнію его географическаго распространенія на Кавказѣ.

По долину Куры турачъ распространенъ, съ нѣкоторыми перерывами въ мѣстахъ, гдѣ онъ уже истребленъ, отъ станціи Пойлы (немного восточнѣе впаденія р. Акстафы) до низовьевъ, и встрѣчается еще по рукаву Акуша верстахъ въ 20 ниже Сальянъ. Къ сѣверу отъ Куры захватываетъ южную часть Арешскаго уѣзда Елисаветпольской губ. и Геокчайскій и южную часть Шемахинскаго у. Бакинской губ. По лѣвую же сторону Куры онъ еще многочисленъ въ Самухскомъ имѣніи при сліяніи съ Курюю Юры и Алазани. Въ наибольшемъ количествѣ по Курѣ онъ встрѣчается до сихъ поръ между р. Таузь и Зардобомъ. Обиліемъ турачей славятся имѣнія бековъ шамхорскихъ Далляръ и Кечелы, Кадылинское имѣніе и наконецъ Мисюсли, около ст. ж. д. того же имени, въ Геокчайскомъ уѣздѣ. Въ Шемахинскомъ у. я нашелъ его еще въ 30 верст. отъ сел. Маразы, близъ Соленого озера. Резюмируя все это, можно сказать, что сѣверную границу распространенія турача въ Елисаветпольской и Бакинской губерніяхъ отъ впаденія Юры съ Алазанью составляютъ плоская возвышенность Бозъ-дагъ и южныя предгорья восточной части Кавказскаго хребта. Къ югу отъ Куры турачъ распространенъ по низовьямъ многихъ впадающихъ въ нее рѣчекъ — Тауза, Дзегамъ, Шамхора и особенно рѣки Тертера. Между Джеватомъ и Сальянами турачъ живетъ по обѣимъ сторонамъ рѣки, но на муганской сторонѣ многочисленнѣе.

По Араксу турачъ доходитъ на западъ до Джебраильскаго уѣзда, гдѣ я въ большомъ числѣ встрѣтилъ его еще въ 1894 году около сел. Бегманлу. Но еще на памяти здѣшнихъ жителей онъ былъ распространенъ здѣсь и гораздо западнѣе, а по долину впадающихъ въ Араксъ рѣчекъ поднимался довольно высоко. Такъ, охотники въ сел. Аскелюмъ передавали мнѣ, когда я былъ тамъ въ 1894 г., что турачъ исчезъ изъ ихъ мѣстности только лѣтъ 8—10 тому назадъ (т. е. въ восьмидесятихъ годахъ). На Мугани, насколько я могъ выяснитъ во время моихъ поѣздокъ и на основаніи разспросныхъ свѣдѣній, онъ встрѣчается спорадически, на удобныхъ мѣстахъ, не страдающихъ отъ наводненій. Замѣчено, что послѣ того, какъ какую нибудь прикуринскую мѣстность постигнетъ наводненіе, турачи исчезаютъ въ ней на нѣсколько лѣтъ.

Любимое мѣстопребываніе турача — густыя заросли колючихъ кустарниковъ (держи-деревъ, гранатника, ежевики, а иногда и гребенника) вблизи воды. Поэтому чаще всего его можно встрѣ-

титъ по берегамъ рѣчекъ и оросительныхъ канавъ, а внутри сухой степи онъ не встрѣчается. По наблюденіямъ А. Б. Шелковникова, онъ вовсе не боится человѣка и часто гнѣздится въ тутовыхъ и виноградныхъ садахъ. „Весною, говоритъ этотъ наблюдатель, самцы подходили къ самому моему дому шаговъ на двѣсти, и я самъ наблюдалъ, какъ осенью, при распашкѣ земли въ саду, пара турачей бѣгала за сохою шагахъ въ ста, отыскивая пищу въ свѣжей бороздѣ“.

Тамъ, гдѣ турачей еще много, они держатся осенью и зимою небольшими стайками, хотя и не такъ сплоченно, какъ, напр., сѣрыя куропатки. При преслѣдованіи охотникомъ съ собакою такая стайка сначала бѣжитъ, а затѣмъ птицы начинаютъ сниться одна за другою, по одной или по двѣ заразъ.

Смотря по состоянію погоды, уже въ февралѣ или только въ мартѣ турачи разбиваются на пары. Токованье турачей происходитъ съ первыхъ чиселъ марта до конца мая, но крикъ ихъ бываетъ слышенъ еще и все лѣто. А. Б. Шелковниковъ наблюдалъ, что въ началѣ тока самцы ожесточенно дерутся между собою. „Я наблюдалъ, говоритъ онъ, бой двухъ самцовъ 9. III. 93 на берегу рѣчки Альджигятъ, на полянкѣ между кустами гребенщика и лоха. Разбѣжавшись турачи бросаются другъ на друга, поднимаясь при этомъ столбомъ на воздухъ аршина на полтора отъ земли. Бьютъ другъ друга клювомъ и ногами настолько сильно, что кругомъ летятъ перья. Затѣмъ расходятся, чтобы снова начать бой. Это продолжается 5—6 разъ, пока одинъ изъ самцовъ не обратится въ бѣгство побѣжденный“. Вѣроятно, такія драки бываютъ только въ самомъ началѣ любовной поры у турачей и предшествуютъ разбиванію ихъ на пары, такъ какъ позднѣе турачъ мирно живетъ со своею самкою и не ссорится съ противниками. По крайней мѣрѣ ни я, ни кто другой никогда не наблюдалъ дракъ между ними въ болѣе позднее время года, хотя наблюдать ухаживаніе самца за самкою приходилось и очень часто.

Въ обыкновенное время турачъ очень молчаливая птица. Взлетая при внезапномъ испугѣ, онъ „кокаетъ“, какъ говорятъ охотники, при чемъ голосъ самки пискливѣе. Такое же, но болѣе спокойное коканье производятъ турачи при перелетахъ, не будучи испугнута. Любовная же пѣснь турача громка и оригинальна. Голосъ его болѣе всего похожъ на голосъ молодого домашнего пѣтушка, только что пробующаго свои силы. Слогами его мож-

но передать приблизительно такъ: „Кик (отрывочно), кик-кики-и-ки!“ Въ періодъ спариванія и насиживанія пѣсня эта слышится безъ перерыва цѣлый день. Самецъ держится недалеко отъ самки и для пѣнія вскакиваетъ на какую нибудь кочку и поетъ дергаясь и вытягивая шею кверху, какъ это дѣлаютъ и домашніе пѣтухи. Въ особенности усердно поетъ турачъ въ пасмурные, сѣренькіе дни и подь вечеръ.

Ухаживая за самкою, какъ я это неоднократно наблюдалъ въ Елисаветпольскомъ и Джеванширскомъ уу., турачъ принимаетъ позу, свойственную большинству куриныхъ: онъ закидываетъ назадъ голову, выпячиваетъ свою ярко окрашенную грудь, распускаетъ вѣромъ хвостъ и опускаетъ внизъ растопыренныя крылья, которыми чертитъ по землѣ, крутятся передъ самкой. Въ этомъ положеніи онъ, пожалуй, больше всего похожъ на индюка. Самка относится довольно хладнокровно къ ухаживанію своего кавалера. Обыкновенно она спокойно ходитъ, поклеывая зернышки, самецъ же крутится передъ нею, иногда даже слегка толкаетъ ее, переминается съ ноги на ногу, заступаетъ ей дорогу, чертитъ крыльями по землѣ. По временамъ онъ вытягиваетъ шею съ стоящими на ней перьями впередъ, какъ это дѣлаютъ голуби, но, приближаясь къ самкѣ, снова закидываетъ ее на спину. Издаетъ ли онъ при этомъ какой нибудь звукъ? Могу сказать только, что въ это время, т. е. во время танцевъ, онъ не поетъ своей обычной пѣсни: для пѣнія онъ всегда останавливается. Если онъ издаетъ какой-нибудь звукъ при движеніи, то послѣдній, вѣроятно, очень тихъ, такъ какъ, наблюдая токующаго турача не далѣе, какъ въ 50—60 шагахъ, я ни разу ничего не слышалъ. Во время тока турачъ глухъ и слѣпъ: самка всегда замѣчаетъ въ это время опасность первая, а за нею летитъ уже и самецъ. Никто изъ извѣстныхъ мнѣ наблюдателей и охотниковъ не встрѣчалъ при турачѣ болѣе одной самки. Также я никогда не видалъ и не слышалъ, чтобы при одной самкѣ токовало болѣе одного пѣтуха.

Гнѣздо устраивается въ густой заросли въ небольшой ямкѣ подь кустомъ. Оно выстлано соломой и сухой травой. Кладка, по Шелковникову, въ Арешскомъ уѣздѣ начинается въ первой половинѣ апрѣля и достигаетъ полнаго комплекта, отъ 10 до 12 яицъ, въ концѣ этого мѣсяца; я находилъ полныя кладки, около 10 яицъ, въ Елисаветпольскомъ уѣздѣ въ началѣ мая. Покойной лѣсничій А. Е. Старосивильскій, съ которымъ мы вмѣстѣ наблюдали токъ турачей близъ Тертера въ Джеванширскомъ уѣздѣ, говорилъ, что

находить полныя кладки въ началѣ іюня, но, вѣроятно, яйца были уже насижены тогда. Ему принесли однажды кладку изъ 14 яицъ; нужно считать 10—12. Мнѣ не удалось выяснить, въ чемъ состоитъ роль самца при высиживаніи, но онъ не отходитъ отъ гнѣзда и развлекаетъ самку пѣніемъ. Самецъ, повидимому, не участвуетъ и въ заботѣ о выведшихся птенцахъ, ибо никогда никому не приходилось поднимать самца при выводкѣ. По мнѣнію А. Е. Старосивильскаго, турачъ *нормально* гнѣздится два раза, такъ какъ и въ самые нормальные годы, когда дичь не страдала ни отъ наводненій, ни отъ другихъ бѣдствій, ему еще въ концѣ сентября приходилось наблюдать выводки величиною съ перепелку. Можетъ быть, эту значительную плодовитостью турача и объясняется тотъ фактъ, что онъ до сихъ поръ еще не истребленъ окончательно.

Днемъ турачи держатся въ густыхъ заросляхъ, а вечеромъ выходятъ кормиться на болѣе открытыя мѣста и охотно посѣщаютъ хлѣбныя поля, особенно снятыя чалтычныя (рисовыя) поля, послѣ того, какъ они достаточно подсохнутъ. Пищу ихъ составляютъ сѣмена различныхъ растений, особенно культурныхъ—риса, пшеницы, ячменя и проса. Турачъ никогда не садится на деревья и отъ опасности всегда сперва старается спастись бѣгствомъ, а, когда видитъ, что это невозможно, взлетаетъ. Взлетая турачъ поднимается сперва столбомъ кверху, а затѣмъ уже летитъ горизонтально, довольно слабымъ и сравнительно тихимъ полетомъ.

Турача никакъ нельзя назвать осторожною птицей, и охота за нимъ не представляетъ никакого затрудненія. Его и преслѣдуютъ ожесточенно за его вкусное бѣлое мясо, которое на Кавказѣ считается самымъ вкуснымъ изъ всей дичи, и истребляютъ самымъ варварскимъ способомъ. Особенно губельны для него снѣжныя зимы, когда мальчишки-пастухи избиваютъ турачей даже просто палками.

Цѣна турачей на тифлисскомъ рынкѣ въ настоящее время колеблется отъ 1 р. 40 к. до 2 р. 50 к. за пару.

230. *Phasianus colchicus* L. Колхидскій фазанъ.

Хахобія (груз.).

Въ настоящее время въ западномъ Закавказьѣ фазанъ представляетъ большую рѣдкость. Я встрѣтилъ его здѣсь только около Чаквы.

С. А. Бутурлинъ, недавно писавшій и по-русски, и по-англійски о распространеніи настоящихъ фазановъ, считаетъ фазана Ріонской низменности за основной типъ. Но я думаю, что изъ всѣхъ кавказскихъ фазановъ этотъ имѣлъ наименѣе шансовъ понасть для описанія Линнею.

231. *Phasianus colchicus septentrionalis* Lorenz. Сѣверно-кавказскій фазанъ.

Lorenz, Journ. f. Ornith., p. 571 (1888).

До сихъ поръ еще въ значительномъ количествѣ встрѣчается въ „кизлярскихъ камышахъ“ въ дельтѣ Терека, гдѣ я встрѣтилъ его въ маѣ 1899 г. Здѣшніе фазаны не отличались отъ добытыхъ мною въ 1890 году въ дельтѣ Волги. Ни по Тереку, ни по Кумѣ, ни по Сунжѣ фазановъ больше нѣтъ. Но въ южномъ, низменномъ Дагестанѣ они еще очень многочисленны въ Кайтаго-Табасаранскомъ и Кюринскомъ округахъ и около Дербента. Но, принадлежатъ ли эти и водящіеся въ Кубинскомъ уѣздѣ фазаны именно къ этой формѣ, я не знаю. Г. Бутурлинъ о фазанахъ этой части каспійскаго побережья ничего не говоритъ. Въ Кубинскомъ уѣздѣ подъ влияніемъ строгой охраны фазаны сильно размножились.

232. *Phasianus colchicus* Lorenzi Buturlin. Закавказскій фазанъ.

Buturlin, „Ibis“, p. 386 (1904).

Крговуль (татарск.).

Этотъ фазанъ, хорошо географически обособленный отъ другихъ горными цѣпями, еще довольно многочисленъ въ восточномъ Закавказьѣ. Онъ, безъ сомнѣнія, прежде населялъ его сплошь до высоты около 2—3 тысячъ фут., но теперь во многихъ мѣстахъ истребленъ. Самымъ западнымъ пунктомъ восточнаго Закавказья, гдѣ мнѣ приходилось охотиться на фазановъ, было имѣніе Мухранъ, недалеко отъ станціи Каспи закавказской жел. дор. Далѣе къ востоку я встрѣчалъ фазановъ въ значительномъ количествѣ въ Кахетин, по Іорѣ и Алазани и по южнымъ предгорьямъ Кавказскаго хребта до Шемахинскаго уѣзда, гдѣ встрѣтилъ еще ихъ около Шарадильской почтовой станціи, въ глубокой рѣчной балкѣ и въ лѣсу около сел. Алты-агачъ. Къ югу отсюда фазаны встрѣчаются во всѣхъ удобныхъ мѣстахъ. Для своего мѣстожительства

они, повидимому, предпочитают лѣса съ густымъ подлѣдомъ и перевитые колючими вьющимися растеніями, представляющіе непролазныя крѣпи. Но по Курѣ и Араксу они попадались мнѣ иногда и въ совершенно безлѣсныхъ мѣстахъ и держались здѣсь въ густыхъ камышахъ. Въ Карабахѣ, именно въ Джеванширскомъ уѣздѣ, близъ сел. Гасанризъ я встрѣтилъ 4. VI. 95 фазана на высотѣ около 4000' на хлѣбномъ полѣ.

Весною самцы дерутся между собою, но особаго ожесточенія между ними я не замѣчалъ. Тѣ, которыхъ мнѣ приходилось наблюдать, стояли нагнувшись и вытянувъ другъ къ другу шею, а затѣмъ, захвативъ другъ друга клювами, долго таскали одинъ другого. Крикъ фазановъ слышенъ весною и лѣтомъ. Я находилъ въ Джеванширскомъ уѣздѣ, въ предгорьяхъ, яйца фазановъ съ конца мая. Такъ, 27. V. 95 въ урочищѣ Джанъ-ятагъ по Тергеру я нашелъ въ гнѣздѣ 4 совершенно свѣжихъ яйца; полныя же кладки, достигающія 15 яицъ, лишь въ началѣ іюня. По Шелковникову же на низменности Арешскаго уѣзда кладка (10 — 15 яицъ) заканчивается уже въ концѣ апрѣля.

233. *Phasianus colchicus talyschensis* Lorenz. Талышинскій фазанъ.

Lorenz, Journ. f. Ornithol., p. 572 (1888). *Ph. persicus* subsp. *talischensis*.

По Лоренцу, это — фазанъ Талышинской низменности. Еще въ 1897 году я встрѣтилъ его въ большомъ количествѣ на низменности и на островѣ Сари. Но уже въ 1899 г. онъ былъ истребленъ и на этомъ островѣ до-чиста и въ уѣздѣ сдѣлался рѣдкостью.

Отрядъ IX. *Falconiformes*. Дневныя хищныя птицы.

Сем. 42. *Pandionidae*. Скопы.

234. *Pandion haliaëtus* L. Скопа.

Мензбиръ, II, 5.

Скопа распространена по всему Кавказскому краю и въ значительномъ количествѣ встрѣчается по всѣмъ его рыбообильнымъ водамъ. Чаше всего я встрѣчалъ скопу въ Ленкоранскомъ уѣздѣ

на низменности, сильно изрѣзанной мелкими рѣчками и морцами, по берегамъ озера Гокчи и на черноморскомъ побережьѣ; въ значительно меньшемъ количествѣ — по Курѣ, Араксу и болѣе мелкимъ рѣчкамъ Закавказья, а изрѣдка — и на мелкихъ горныхъ рѣчкахъ, напр., въ верховьяхъ р. Бергушетъ въ Зангезурскомъ уѣздѣ. Словомъ, гдѣ много рыбы и гдѣ ловить ее легко, тамъ водится и скопа.

На безлѣсныхъ берегахъ озера Гокчи она устраиваетъ гнѣзда на одиночно торчащихъ скалахъ; такое гнѣздо я видѣлъ, напр., по дорогѣ изъ с. Еленовки въ Новобаязетъ близъ станціи Гаджи-Муханъ. Въ лѣсистой же Ленкоранскомъ уѣздѣ гнѣздо помѣщается обыкновенно на высокомъ, по большей части отдѣльно стоящемъ деревѣ. Въ южной части уѣзда я находилъ много такихъ гнѣздъ, но, къ сожалѣнію, ни до одного изъ нихъ не могъ добраться.

Сем. 43. Falconidae. Соколиныя.

Подсем. Falconinae.

235. *Cenchrus tinunculus* L. Обыкновенная пустельга.

Мензбиръ, II, 11 (*Tinunculus alaudarius*).

Сычанчи (татарск.).

Обыкновенная пустельга — самый обыкновенный хищникъ восточной части Закавказья; въ западной же части — въ Эриванской губ. она никогда мнѣ не попадалась и, повидимому, совершенно замѣнена тамъ бѣлокоготною пустельгою, не встрѣчающеюся въ восточной части. Однако, съ положительностью я могу сказать это только объ Эриванской губерніи.

Я встрѣчалъ обыкновенную пустельгу только на низменности. Въ особенно большомъ числѣ я встрѣтилъ ее на нижнемъ теченіи Куры отъ впаденія въ нее Аракса до Сальянъ. Здѣсь она зимуетъ, изъ другихъ же частей Закавказья на зиму отлетаетъ, но появляется уже очень рано: 3. III. 97 я наблюдалъ пролетъ этого вида большою стаею.

Въ тугаяхъ по Курѣ у Джевата и Сальянъ пустельга гнѣздится въ очень большомъ количествѣ на высокихъ тополяхъ. 24. V. 94 я нашелъ въ одномъ гнѣздѣ уже птенцовъ. Какъ это ни странно, но въ безлѣсныхъ мѣстахъ каспійскаго побережья, именно около Аджи-Кабула пустельга, за неимѣніемъ лучшаго, гнѣздится и въ порахъ, вырытыхъ въ глинистыхъ обрывахъ. Вѣроятно,

она пользуется норами, вырытыми сизоворонками. Высиживающая парочка ревниво оберегает свое гнѣздо отъ всякихъ непрошенныхъ гостей. Наблюдая за однимъ гнѣздомъ, устроеннымъ на высокомъ платанѣ въ одномъ селеніи на нижней Курѣ, я видѣлъ, какъ пустельги храбро бросались на всѣхъ пролетающихъ поблизости грачей и коршуновъ. Охотясь преимущественно на стени и истребляя массу различныхъ крупныхъ насѣкомыхъ, пустельги приносятъ несомнѣнно большую пользу. У пустельги, убитой 8. III. 95 въ Сальянахъ, въ клювѣ были земляные черви. Осенью онѣ собираются на ночлегъ вмѣстѣ, значительными обществами. Такъ, въ концѣ іюля 1899 года онѣ облюбовали для этого группу большихъ платановъ противъ моихъ оконъ въ паркѣ Муштаидъ; 24. VII я насчиталъ ихъ болѣе 50 особей. Передъ закатомъ солнца онѣ вились и хлопотали надъ этими деревьями, какъ это дѣлаютъ и галки, усаживаясь на ночлегъ, только безъ такого шума. Онѣ собирались сюда на ночлегъ до конца августа.

236. *Cenchrus cerchneis* Naum. Бѣлокоготная пустельга.

Мензбиръ, II, 17 (*Tinunculus cenchrus*).

Сычанчи (какъ и предыд.).

Область распространенія бѣлокоготной пустельги въ Закавказьѣ идетъ отъ западной части низменности восточнаго Закавказья на западъ до Чернаго моря.

По почтовому тракту отъ станціи Евлахъ ж. д. до Шуши и Джебраила я встрѣчалъ только эту пустельгу, притомъ во множествѣ; далѣе я встрѣтилъ ее по Араксу вверхъ отъ Джебраила, на Эриванской равнинѣ, Закавказскомъ плоскогорьѣ и Гельской котловинѣ. У Тифлиса встрѣчаются оба вида, но, въ то время какъ обыкновенная пустельга здѣсь очень многочисленна, бѣлокоготныя представляютъ рѣдкость. Только 15. VIII. 96 я встрѣтилъ нѣсколько экземпляровъ этого вида вмѣстѣ у Соленаго озера подъ Тифлисомъ и убилъ одну; повидимому, это былъ пролетъ.

237. *Erythropus vespertinus* L. Кобчикъ.

Мензбиръ, II, 22.

7. IX. 900 я убилъ одинъ экземпляръ (самку) въ Аралыхъ, въ паркѣ. Одинъ разъ, въ августѣ 1901 г. наблюдалъ его въ паркѣ Муштаидъ.

238. *Lithofalco aesalon* Briss. Дербникъ.

Мензбиръ, II, 30.

Во второй половинѣ августа 1899 г. я убилъ пару дербниковъ въ паркѣ Муштадъ. Судя по коллекціямъ мѣстныхъ любителей, дербникъ очень обыкновененъ около Ленкорани.

239. *Falco subbuteo* L. Чеглокъ.

Мензбиръ, II, 38.

Осенью довольно часто попадаетъ подѣ Тифлисомъ. 5. VIII. 99 я убилъ одного (♀) въ паркѣ Муштадъ. 1. IX. 900 убилъ одного на Эзносъ-яйля въ сосновомъ лѣсу (около 8000') въ Карсской области, къ сѣверо-западу отъ Гельской котловины.

240. *Falco peregrinus* Briss. Сапсанъ.

Мензбиръ, II, 44.

24. III. 95 я добылъ одинъ экземпляръ (♀) по дорогѣ изъ Джевата на станцію ж. д. Сагиры, среди голой степи. 12. V. 96 видѣлъ близъ селенія Босхаль Шемахинскаго уѣзда. Обыкновененъ сапсанъ только зимою въ Ленкоранскомъ уѣздѣ, но уже въ мартѣ и тамъ становится рѣдкимъ.

Подсем. Buteoninae.

241. *Milvus ater* Gmel. Коршунъ.

Мензбиръ, II, 80.

Чалаганъ (татарск.).

Обыкновенная и характерная птица рѣчныхъ долинъ Кавказскаго края. На Сѣверномъ Кавказѣ я встрѣтилъ его въ большомъ количествѣ по рр. Кумъ и Тереку, въ Закавказьѣ онъ особенно многочисленъ по среднему и нижнему теченію Куры. Между Джеватомъ и Сальянами онъ встрѣчается прямо въ громадномъ количествѣ. Гнѣздится онъ на высокихъ деревьяхъ прирѣчныхъ лѣсовъ.

242. *Milvus melanotis* Temm. Черноухій коршунъ.

Мензбиръ, II, 89.

Этотъ коршунъ встрѣчается въ Закавказьѣ вмѣстѣ съ предъидущимъ видомъ, но въ меньшемъ количествѣ.

Я добылъ экземпляры его въ Елисаветпольскомъ и Арешскомъ уу. Елисаветпольской губ., около Джевата и Сальянъ.

Такъ какъ признаки, отличающіе этотъ видъ отъ предыдущаго, не всегда бываютъ ясны, а живутъ оба вида вмѣстѣ, было бы весьма желательно, чтобы гг. орнитологи провѣрили хорошенько вопросъ о степени самостоятельности этого вида, котораго я по неготовленности своей здѣсь не затрагиваю.

243. *Buteo* sp.?

Въ началѣ сентября 1902 г. очень часто парами попадался въ Гѣльской котловинѣ (въ Ардаганскомъ округѣ Карсской области). Я отослалъ добытый тамъ экземпляръ проф. М. А. Мензбину, но, къ сожалѣнію, до сихъ поръ не получилъ его опредѣленія.

Подсем. *Aquilinae*.

244. *Aquila fulva* Temm. Горный орелъ.

Мензбиръ, II, 121.

Не разъ наблюдалъ и стрѣлялъ этого орла на Главномъ Кавказскомъ хребтѣ, но ни одного экземпляра не добылъ, такъ какъ раненый онъ улеталъ далеко, а застрѣленный скатывался въ такую пропасть, что достать его не было возможности. Я, однако, хорошо могъ разсмотрѣть ихъ въ сильный бинокль и увѣренъ въ своемъ опредѣленіи.

245. *Aquila heliaca* Sav. Орелъ-могильникъ.

Мензбиръ, II, 123.

Внимательно слѣди за крупными хищниками, которыхъ приносили охотники мѣстнымъ препараторамъ, я замѣтилъ, что могильникъ является довольно обыкновенною зимней птицей низменности восточнаго Закавказья, по крайней мѣрѣ окрестностей Тифлиса, гдѣ онъ встрѣчается съ конца сентября по начало апрѣля. Лѣтнихъ экземпляровъ я не видѣлъ и не знаю, попадаетъ ли онъ здѣсь и лѣтомъ.

246. *Aquila naevia* Meyer. Малый подорликъ.

Мензбиръ, II, 152.

У лѣсничаго Бртека, сдѣлавшагося потомъ препараторомъ, я видѣлъ большую серію этихъ орловъ, добытыхъ преимущественно

осенью въ Бакуріанахъ въ 1898 г. Большая часть этой коллекціи, насколько помню, была отправлена Фритчу въ Прагу.

247. *Aquila clanga* Pall. Большой подорликъ.

Мензбиръ, II, 145.

Я наблюдалъ и добылъ большого подорлика подь Тифлисомъ въ ноябрѣ 1895 г. Видѣлъ у тифлисскихъ препараторовъ и другихъ, добытыхъ въ то же время.

248. *Aquila pennata* Gmel.

Мензбиръ, II, 158.

17. VIII. 900 въ ущельѣ по дорогѣ изъ Каракиса въ Делижанъ я наблюдалъ орла-карлика, сидѣвшаго на вершинѣ сухого дерева. Онъ подпустилъ экипажъ очень близко и позволилъ хорошо разсмотрѣть себя въ бинокль.

249. *Circaëtos gallicus* Gmel. Орель-змѣядъ.

Мензбиръ, II, 169.

Демиръ-кайнахъ (татарск., Сальяны).

Весною 1894 г. мнѣ принесли орла-змѣяда, пойманнаго въ окрестностяхъ Тифлиса (на горѣ св. Давида). Позднѣе былъ пойманъ и другой экземпляръ, который также не могъ почему-то летать. Это наводитъ меня на мысль, что охота за ядовитыми змѣями не всегда сходить ему благополучно. Я нѣсколько разъ встрѣчалъ его на каспійскомъ побережьи, на Мугани и въ Кубинскомъ уѣздѣ. На Мугани я добылъ 11. VI. 97 одинъ экземпляръ около поста Домаха на разливѣ Аракса. Въ Кубинскомъ у. на пути изъ сел. Нараджанъ на Низовую пристань 30. V. 96 я замѣтилъ змѣяда на высокомъ сухомъ дубѣ. При моемъ приближеніи онъ слетѣлъ, держа въ когтяхъ длинную змѣю. Она была, очевидно, уже мертвою, такъ какъ висѣла плетью.

На жившемъ въ вольеркѣ при Кавказскомъ музеѣ орлѣ-змѣядѣ я замѣтилъ, что съ возрастомъ нижняя сторона его становится все бѣлѣе.

250. *Haliaëtos albicilla* Briss. Орланъ-бѣлохвость.

Мензбиръ, II, 96.

Обыкновенная птица побережья обонхъ морей. Наблюдать, какъ онъ охотится, мнѣ не приходилось, но я очень часто встрѣ-

чалъ его на морскомъ берегу на разной падали, выбрасываемой моремъ — тюленѣ, бѣлугѣ и т. п.

Около Тифлиса онъ является обыкновеннымъ посѣтителемъ боенъ.

Подсем. *Accipitrinae*.

251. *Accipiter nisus* L. Ястребъ-перепелятникъ.

Мензбиръ, II, 189.

Ястребъ-перепелятникъ довольно обыкновененъ на низменности восточнаго Закавказья. Я часто наблюдалъ охоту этого дерзкаго разбойника, не разъ хватавшаго воробьевъ въ нѣсколькихъ шагахъ отъ меня. Экземпляры его я добылъ на пути изъ сел. Нараджанъ на Низовую пристань, Кубинск. у. (30. V. 96); близъ сел. Кечерли (28. V. 94) и Агдамъ (3. VI. 95) Джеванширского у.; на Талышинской низменности, с. Бутасаръ (28. IV. 98), и около Тифлиса.

252. *Astur brevipes* Severts. Ястребъ-тювикъ.

Мензбиръ, II, 210.

Такъ какъ я не умѣю отличить этого ястреба на волѣ отъ предыдущаго, то могу сказать только, что я убивалъ его въ паркѣ Муштаидъ въ Тифлисѣ; экз. коллекціи добытъ 15. V. 900.

253. *Astur palumbarius* L. Ястребъ-тетеревятникъ.

Мензбиръ, II, 205.

Я неоднократно наблюдалъ тетеревятника зимою въ Тифлисѣ на дворѣ Кавказской шелководственной станціи, гдѣ онъ охотился за домашними голубями, и въ паркѣ Муштаидъ, но ни разу не удалось мнѣ подстрѣлить этого ловкаго и осторожнаго разбойника. Онъ ни разу при мнѣ не присаживался здѣсь, а всегда являлся неожиданно изъ за какого нибудь прикрытія, стремительно схватывалъ добычу и быстро исчезалъ съ нею.

254. *Circus aeruginosus* L. Камышовый лунь.

Мензбиръ, II, 235.

Непремѣнный спутникъ камышовыхъ зарослей по берегамъ рѣкъ, озеръ и болотъ восточнаго Закавказья. Тамъ, гдѣ такихъ

зарослей много, какъ, напр., по разливамъ Аракса и на Талышинской низменности, и камышовый лунь встрѣчается въ большомъ количествѣ.

255. *Circus aeruginosus unicolor* Radde. Темный камышовый лунь.

Radde, Orn. Caucasica, p. 83, Tab. III.

Два раза я убивалъ на Ольховскомъ морцѣ около Ленкорани луней, совершенно сходныхъ съ описаннымъ Радде. Экземпляръ моей коллекціи добытъ 12. IV. 97.

256. *Circus cineraceus* Mont. Луговой лунь.

Мензбиръ, II, 217.

Нерѣдокъ въ восточномъ Закавказьѣ. Я часто убивалъ его около Тифлиса осенью. У убитыхъ въ августѣ у Соленого озера близъ Тифлиса желудки были набиты одними кузнечиками. Лѣтомъ я добылъ только одинъ экземпляръ около сел. Конахъ-кендъ Шемахинскаго уѣзда (6. V. 96).

257. *Circus cyaneus* L. Полевой лунь.

Мензбиръ, II, 229.

Около Тифлиса попадался мнѣ нерѣдко весною и осенью. Одинъ молодой экземпляръ добытъ мною 1. V. 96 около города Шемахи.

258. *Circus macrurus* Gmel. Степной лунь.

Мензбиръ, II, 224.

Я добылъ только одинъ молодой экземпляръ степного луня, близъ Соленого озера у Тифлиса 27. VIII. 95.

Подсем. *Gypaëtinae*.

259. *Gypaëtos barbatus* L. Ягнятникъ.

Мензбиръ, II, 255.

Я наблюдалъ ягнятника только издали въ альпійской области Главнаго Кавказскаго хребта къ востоку отъ военно-грузинской дороги и въ горахъ близъ Ахалкалакъ зимою 1896 года.

Сем. 44. *Vulturidae*. Грифы Старого Свѣта.260. *Neophron percnopterus* L. Стервятникъ.

Мензбиръ, II, 242.

Я встрѣчалъ стервятника повсюду на Кавказѣ, какъ на низменности, такъ и въ горахъ. Гнѣздится онъ, однако, высоко въ горахъ и на низменность является только за добываніемъ пищи. Однако, я нашелъ его гнѣздовье и сравнительно очень невысоко, именно около селенія Аскелюмъ Зангезурскаго уѣзда въ ущельѣ рѣки на скалахъ не выше 3000' (въ іюль 1894 г.). Другое гнѣздовье я наблюдалъ въ Дагестанѣ близъ аула Чохъ, къ югу отъ Гуниба.

Около Тифлиса онъ въ большемъ количествѣ постоянно держится около боенъ, и почти каждый день можно наблюдать стервятниковъ, парящихъ высоко надъ городомъ. На низменности я иногда видѣлъ его отдыхающимъ на деревь.

261. *Vultur monachus* L. Сѣрый грифъ.

Мензбиръ, II, 246.

Нерѣдокъ около тифлисскихъ боенъ.

262. *Gyps fulvus* Briss. Бѣлоголовый сипъ.

Мензбиръ, II, 249.

Хотя бѣлоголовый сипъ гнѣздится тоже высоко въ горахъ на неприступныхъ скалахъ, онъ не представляетъ рѣдкости на жаркой низменности даже лѣтомъ, что, впрочемъ, весьма понятно, такъ какъ его могучія крылья могутъ въ нѣсколько минутъ унести его изъ жаркой равнины къ вѣчнымъ льдамъ. 8. V. 95 я замѣтилъ на пути изъ сел. Агдамъ въ сел. Караханлы Джеванширскаго у. этого грифа, отдохавшаго на стогу сѣна; его преслѣдовали вороны, но очень осторожно. Зимой же онъ на низменности гораздо многочисленнѣе. Во всякое время года онъ многочисленъ и на бойняхъ около Тифлиса.

31. I. 96 въ глубокой балкѣ у Тифлиса я убилъ камнемъ одного грифа, объѣвшагося падали до того, что онъ не могъ скоро подняться. Экземпляръ этотъ былъ отосланъ профессору М. А. Мензбину.

Отрядъ X. Anseriformes. Утинообразныя.

Сем. 45. Anatidae. Утиныя.

Подсем. Anserinae.

263. *Chen hyperboreus* Pall. Полярный гусь.

Куба-казъ (татарск.).

Мензбиръ, I, 722 (*Anser hyperboreus*).

Въ февралѣ 1895 года я видѣлъ на Мугани въ стаѣ другихъ гусей одного бѣлаго съ чернымъ на крыльяхъ, какъ я хорошо разсмотрѣлъ въ бинокль. Сопровождавшій меня охотникъ - татаринъ сказалъ мнѣ, что это не домашній гусь, какъ я было подумалъ въ первый моментъ, а дикій, называемый ими «кубинскимъ гусемъ» (Куба-казъ), вѣроятно, потому, что Куба лежитъ къ сѣверу отсюда. Какъ бы то ни было, но особое названіе для этого гуся показываетъ, что мѣстные жители его хорошо знаютъ. Въ одной изъ татарскихъ пѣсенъ при описаніи зимы говорится: «по небу летятъ кубинскіе гуси...».

А. Б. Шелковниковъ наблюдалъ 29. I. 95 стайку этихъ гусей въ девять особей около своей усадьбы въ Арешскомъ уѣздѣ.

На Мугани наблюдалъ его и баронъ Б. Л. Тизенгаузенъ, но до сихъ поръ этотъ гусь не попалъ въ руки ни одному собирателю.

264. *Anser anser* L. Сѣрый гусь.

Мензбиръ, I, 748 (*Anser cinereus*).

Казъ (татарск.).

Это — единственный гусь, гнѣздящійся въ Закавказьѣ. На гнѣздовья я нашелъ его по Курѣ, между Джеватомъ и Сальянами, и на Араксѣ. Въ сел. Енгикендѣ на Курѣ я видѣлъ молодыхъ гусей этого вида, ходившихъ съ домашними. По словамъ мѣстныхъ жителей, приручить ихъ окончательно не удастся, и съ наступленіемъ осени они улетаютъ и присоединяются къ своимъ дикимъ собратіямъ. Зимой тысячныя стада гусей держатся въ восточномъ Закавказьѣ и пасутся по озимымъ хлѣбамъ, которымъ наносятъ сильный вредъ.

265. *Anser albifrons* Scop. Бѣлолобая казарка.

Мензбиръ, I, 734.

Джуръ казъ (татарск., по Шелковникову).

Въ громадномъ количествѣ зимуетъ въ восточномъ Закавказьѣ. Большія стаи ихъ я видѣлъ въ Караязахъ зимою 1904 года. З. II. 95 я получилъ 2 экземпляра въ Арешскомъ у. въ имѣніи Шелковникова. 10. III. 96 наблюдалъ двѣ большія стаи на Соленомъ озерѣ близъ Тифлиса.

266. *Rufibrenta ruficollis* Pall.Мензбиръ, I, 730 (*Anser ruficollis*).

Зимою перѣдокъ на каспійскомъ побережьѣ у Ленкорани. У ленкоранскаго лѣсничаго П. О. Василевскаго я видѣлъ добытые здѣсь экземпляры. Громадными стадами держится зимою на озерахъ Мугани.

Подсем. *Cygninae*.267. *Cygnus* sp.? Лебедь.

Лебедь зимуетъ въ восточномъ Закавказьѣ въ значительномъ количествѣ, держась по болѣе глубокимъ и отдаленнымъ отъ жилья озерамъ. По Шелковникову, держится зимою и въ Арешскомъ у. на озерѣ близъ с. Наметь-Абатъ.

Къ сожалѣнію, я не знаю, къ какому виду относятся наблюдавшіеся мною и г. Шелковниковымъ лебеди.

Подсем. *Anatinae*.268. *Vulpanser tadorna* L. Пѣганка.Мензбиръ, I, 697 (*Tadorna cornuta*).

Пѣганка — осѣдлая птица восточнаго Закавказья, но встрѣчается здѣсь въ небольшомъ количествѣ.

Я наблюдалъ ее, обыкновенно парами, въ разныхъ мѣстахъ по Курѣ, въ болѣе значительномъ числѣ 9. III. 95 около Сальянъ. 14. II. 99 видѣлъ двѣ пары на Соленомъ озерѣ близъ Тифлиса. Въ 1900 г. одна пара гнѣздилась около этого озера, счастливо избѣгая обстрѣла многочисленными воскресными охотниками.

269. *Casarca rutila* Pall. Красная утка.Мензбиръ, I, 702 (*Tadorna rutila*).

Ангутъ (татарск.); гагарка (у русскихъ охотниковъ).

Обыкновенная осѣдлая птица всего восточнаго Закавказья. Я встрѣчалъ ее въ большомъ количествѣ по Курѣ, въ Кубинскомъ уѣздѣ, всюду по дорогѣ отъ Сальянъ въ Ленкорань небольшими стайками, въ большомъ числѣ на Аджи - Кабульскомъ озерѣ (4. III. 99) и на Араксѣ. Татары часто держатъ молодыхъ красныхъ утокъ вмѣстѣ съ домашней птицей. 6. VI. 94 я видѣлъ въ сел. Бегманлы Джебраильскаго у. на Араксѣ молодую утку, которую мальчишки водили, привязавъ за ногу.

270. *Anas boschas* L. Кряква.

Мензбиръ, I, 681.

Яшылбашъ-ѣрдакъ (татарск., по Шельковникову).

Одна изъ самыхъ обыкновенныхъ утокъ всего Кавказскаго края. Гнѣздится въ большомъ количествѣ по берегамъ рѣкъ, озеръ и болотъ всего восточнаго Закавказья, Кубинскаго уѣзда, Закавказскаго плоскогорья; въ громадномъ количествѣ въ Гельской котловинѣ и на черноморскомъ побережьѣ. Зимой количество кряквъ въ Закавказьѣ значительно увеличивается прилетающими съ сѣвера. На пролетѣ встрѣчается высоко въ горахъ; такъ, я встрѣтилъ ее осенью на военно - грузинской дорогѣ близъ Крестоваго перевала.

271. *Chaulelasmus streperus* L. Сѣрая утка.Мензбиръ, I, 677 (*Anas strepera*).

Мнѣ сѣрая утка попадалась въ Закавказьѣ не часто, но, есть ли это дѣло случая, такъ какъ я мало охотился здѣсь за водяною дичью, или она здѣсь дѣйствительно рѣдка лѣтомъ, не знаю. На гнѣздовѣ я встрѣтилъ ее единственный разъ на островѣ Сари, гдѣ и убилъ пару 30. IV. 97.

Зимой она довольно обыкновенна здѣсь, судя по тифлисскому базару. Я встрѣчалъ ее въ это время по долину Куры и видѣлъ убитыхъ въ Караязахъ (22. X. 906).

272. *Daphila acuta* L. Шилохвость.Мензбиръ, I, 690 (*Anas acuta* L.).

Шишъ-куйрюкъ-ёрдакъ (татарск., по Шелковникову).

Я встрѣчалъ эту утку только зимою по небольшимъ озерамъ восточнаго Закавказья и на морцахъ и итиляхъ Ленкоранскаго уѣзда. Въ это время года она здѣсь не рѣдка.

273. *Mareca penelope* L. Свѣязь.Мензбиръ, I, 693 (*Anas penelope*).

На охотѣ совмѣстно съ А. Б. Шелковниковымъ, на оуруѣ близъ сел. Наметь-Абадъ Арешскаго уѣзда 4. II. 95 была убита одна утка этого вида. По словамъ г. Шелковникова, она зимуетъ здѣсь въ значительномъ количествѣ. Зимою она нерѣдка и въ Ленкоранскомъ уѣздѣ.

274. *Spatula clypeata* Briss. Широконоска.Мензбиръ, I, 665 (*Anas clypeata*).

Я встрѣчалъ эту утку только зимою на низменности Ленкоранскаго уѣзда. По словамъ А. Б. Шелковникова, она попадаетъ зимою, хотя и рѣже другихъ утокъ, и въ Арешскомъ уѣздѣ.

275. *Pterocyanea querquedula* L. Чирокъ-трескунокъ.Мензбиръ, I, 668 (*Anas circia*).

Страннымъ образомъ, мнѣ самому не приходилось здѣсь убивать чирка-трескунка. Я видѣлъ его, однако, и въ коллекціи ленкоранскаго лѣсничаго г. Василевскаго и у А. Б. Шелковникова. По словамъ послѣдняго, онъ зимуетъ въ Арешскомъ уѣздѣ.

276. *Nettion cressa* L. Чирокъ-свистунокъ.Мензбиръ, I, 671 (*Anas cressa*).

• Джиръ-ёрдакъ (татарск.).

Обыкновенная осѣдая птица восточнаго Закавказья, столь же многочисленная здѣсь, какъ и кряква. На гнѣздовьяхъ я находилъ ее во всей долинѣ Куры и въ Ленкоранскомъ уѣздѣ. Зимою

онъ встрѣчается громадными стаями. Даже близъ самаго Тифлиса 26. XI. 95 я встрѣтилъ на Соленыхъ озерахъ и образовавшихся около нихъ отъ дождя лужахъ громаднѣйшую стаю этихъ утокъ.

277. *Marmaronetta angustirostris* Ménétr. Мраморная утка.

Мензбиръ, I, 674 (*Anas angustirostris*).

Гнѣздящаяся утка всей долины Куры (отъ Елисаветпольскаго уѣзда) и Ленкоранской низменности. Кажется, это единственная утка, отлетающая на зиму. По крайней мѣрѣ, я никогда не встрѣчалъ ее зимою, и не слыхалъ, чтобы она кѣмъ-нибудь была здѣсь найдена въ это время года.

Подсем. Fuligulinae.

278. *Aithya ferina* L. Красноголовый нырокъ.

Мензбиръ, I, 660 (*Fuligula ferina*).

Зимою въ большомъ количествѣ встрѣчается на побережьѣ обонхъ морей.

279. *Netta rufina* Pall. Красноносый нырокъ.

Мензбиръ, I, 649 (*Fuligula rufina*).

Алма-башъ-ѣрдакъ (татарск., по Шелковникову).

Въ восточномъ Закавказьѣ одна изъ обыкновеннѣйшихъ зимующихъ утокъ. Я наблюдалъ ее зимою на Соленыхъ озерахъ около Тифлиса, гдѣ эти нырки держались большими стаями на серединѣ озера. 5. II. 95 добылъ одинъ экземпляръ въ имѣніи А. Б. Шелковникова, въ Арешскомъ уѣздѣ.

280. *Fuligula marilla* L. Морской нырокъ.

Мензбиръ, I, 657.

Зимою встрѣчается на Каспійскомъ морѣ около Ленкорани. Я видѣлъ добытые здѣсь экземпляры морского нырка въ коллекціяхъ барона Б. Л. Тизенгаузена и П. О. Василевскаго.

281. *Fuligula cristata* Leach. Хохлатый нырокъ.

Мензбиръ, I. 652.

Зимуетъ въ восточномъ Закавказьѣ, но встрѣчается довольно рѣдко. Я видѣлъ стайку хохлатой чернети 4. III. 99 на Аджи-Кабульскомъ озерѣ и спустя нѣсколько дней добылъ одинъ экземпляръ у Ленкорани. А. Б. Шелковниковъ находилъ ихъ зимою въ Арешскомъ у. близъ сел. Арабъ-Басра.

282. *Glaucion clangula*. Гоголь.Мензбиръ, I, 641 (*Fuligula clangula*).

Зимою около Ленкорани гоголь очень обыкновененъ на морѣ.

283. *Nyroca nyroca* Güld. Бѣлоглазый нырокъ.Мензбиръ, I, 646 (*Fuligula nyroca*).

Ноурузъ-ѣрдакъ (татарск., по Шелковникову).

Мнѣ не встрѣчался. Въ Ленкорани я видѣлъ въ коллекціяхъ мѣстныхъ любителей экземпляры бѣлоглазого нырка, добытые здѣсь зимою. По А. Б. Шелковникову, весьма обыкновенная зимующая утка Арешскаго уѣзда.

284. *Oidemia fusca* L. Турпанъ.Мензбиръ, I, 628 (*Fuligula fusca*).

Гнѣздится на большихъ озерахъ Закавказскаго края. Я нашелъ турпана на Гокчѣ и Табисцхури, гдѣ онъ и зимуетъ (9. XI. 906). 15. VIII. 96 бывший консерваторъ Кавказскаго Музея Е. Г. Кёнигъ нашелъ на озерѣ Табисцхури гнѣздо турпана съ 7 свѣжими яйцами. Оно было расположено въ травѣ на берегу озера. Здѣсь было много такихъ гнѣздъ, но всѣ они были уже пусты. Однако, фактъ такого поздняго гнѣздованія турпана на Табисцхури не единичный. Такъ, Ѳ. Ѳ. Каврайскій во время своей поѣздки для изслѣдованія рыболовства этого озера въ 1896 году нашелъ 15 августа на его островахъ много «разныхъ утокъ, сидѣвшихъ еще на яйцахъ», а другія плавали близъ берега съ только что вылупившимися утятами*.

* Каврайскій. Отчетъ о командировкѣ для изученія р. Куры etc. «Вѣстн. Рыбопромышл.», 1901, № 7 — 10, стр. 32 (отд. оттиска).

Подсем. *Erismaturinae*.

285. *Erismatura leucocephala* Scop. Савка.

Мензбиръ, I, 610.

Самъ я ни разу не встрѣчалъ савки, но видѣлъ экземпляры ея, добытые зимою у Ленкорани, въ коллекціи барона Б. Л. Тизенгаузена и экземпляръ, добытый лѣтомъ (14. VII. 93) на озеркѣ близъ сел. Халданъ Арешскаго у., въ коллекціи А. Б. Шелковникова. Это былъ старый самецъ.

Подсем. *Merginae*.

286. *Mergus albellus* L. Лутокъ.

Мензбиръ, I, 597.

Лѣтомъ я встрѣчалъ лутка на соленыхъ лужахъ (онѣ такъ мелки, что озерами ихъ назвать нельзя) Ставропольской губ., близъ Ачикулакской ставки *.

Зимующая птица восточнаго Закавказья. 4. III. 99 я видѣлъ большое количество лутковъ на Аджи-Кабульскомъ озерѣ. 5. III. 99 встрѣчалъ его массами между Сальянами и Ленкоранью. Въ громадномъ количествѣ встрѣчается также на Мугани.

287. *Merganser serrator* L. Длинноносый крохаль.

Мензбиръ, I, 601 (*Mergus serrator*).

Въ декабрѣ 1898 г. я нашелъ на базарѣ нѣсколько экземпляровъ длинноносаго крохала, которые, по словамъ продававшихъ ихъ, были добыты въ окрестностяхъ Тифлиса.

288. *Merganser merganser* L. Большой крохаль.

Мензбиръ, I, 604 (*Mergus merganser*).

По словамъ Шелковникова, попадаетъ въ Арешскомъ у. на весеннемъ пролетѣ. Мнѣ не встрѣчался.

* При совершенно аналогичныхъ условіяхъ я встрѣтилъ лутка лѣтомъ 1887 г. около озера Эльтонъ.

Отрядъ XI. Pelargiformes. Аистообразныя.

Сем. 46. *Phoenicopteridae*. Фламинго.

289. *Phoenicopterus roseus* Pall.

Мензбиръ, I, 756.

Я встрѣчалъ фламинго только зимою, когда онъ попадаетъ довольно часто на каспійскомъ побережьи, между устьями Куры и Ленкоранью и на соленыхъ озерахъ у Сальянъ. По разспроснымъ свѣдѣніямъ, фламинго и гнѣздится въ Закавказьи, около Кизиль-агачскаго залива и въ Гиллинскихъ болотахъ на юго-восточномъ берегу озера Гокчи. Экспедиція Кавказскаго Музея въ 1905 г. въ августѣ мѣсяцѣ уже не застала ихъ тамъ, но нашла слѣды несомнѣннаго ихъ тамъ пребыванія лѣтомъ.

Сем. 47. *Ciconidae*. Аистовыя.

290. *Ciconia ciconia* L. Бѣлый аистъ.

Мензбиръ, I, 771 (*Ciconia alba*).

Хаджи-лайлахъ (татарск.).

Относительно Сѣвернаго Кавказа, въ виду существующаго по этому поводу разногласія между различными авторами, я считаю нужнымъ замѣтить, что ни въ Ставропольской губ., ни въ посѣщенной мною части Терской области аистовъ положительно нѣтъ. Направляясь отсюда по побережью Каспійскаго моря къ югу, мы въ первый разъ встрѣчаемся съ бѣлыми аистами въ южной, степной части Кубинскаго уѣзда. Здѣсь, въ селеніяхъ, расположенныхъ на низменности, уже часто встрѣчаются не только одиночныя гнѣзда, но и цѣлыя колоніи ихъ до 5—6 штукъ. Гнѣзда помѣщаются здѣсь главнымъ образомъ на высокихъ деревьяхъ. Къ югу отсюда аистъ обыкновененъ во всемъ восточномъ Закавказьи, гдѣ селится поблизости чалтыковъ и болотъ, доставляющихъ ему обильную пищу. Даже по долинамъ рѣкъ и чалтыкамъ онъ не поднимается въ горы сколько-нибудь высоко. Въ распространеніи его въ Закавказьи замѣчается нѣкоторая спорадичность, почему я считаю полезнымъ подробно перечислить мѣстности, гдѣ онъ мною наблюдался. Въ Бакинскомъ и Шемахинскомъ уѣздахъ (кромѣ его прикуринской части) онъ мнѣ ни разу не попадался. Въ Джеватскомъ уѣздѣ и сѣ-

верной части Ленкоранскаго встрѣчается далеко не часто, въ несравненно меньшемъ числѣ, чѣмъ въ Кубинскомъ, а въ южной, лѣсистой части послѣдняго уѣзда онъ и вовсе мнѣ не попадался. Отъ прикаспійской полосы къ западу по долинѣ Куры и Аракса бѣлый анстъ становится все многочисленнѣе и очень обыкновенъ въ уѣздахъ Арешскомъ, Джеванширскомъ, Шупинскомъ и Джебраилъскомъ. Отсюда къ западу онъ встрѣченъ мною во множествѣ по всему ущелью Аракса и низовьямъ впадающихъ въ него рѣчекъ, на Эриванской равнинѣ и въ громадномъ количествѣ въ Гѣльской котловинѣ. Я не засталъ уже здѣсь бѣлыхъ анстовъ, такъ какъ пріѣхалъ туда позднею осенью, но о многочисленности ихъ въ этой мѣстности, помимо показаній мѣстныхъ жителей, свидѣтельствовала масса ихъ гнѣздъ на развалинахъ среди селеній, на крышахъ домовъ и на нарочно для нихъ выставленныхъ колесахъ, надѣтыхъ на шесты. На черноморскомъ побережьи я нигдѣ бѣлаго анста не встрѣчалъ.

Каждая пара анстовъ всегда, какъ это хорошо извѣстно, возвращается на свое старое гнѣздо. Кладка яицъ начинается довольно поздно. А. Б. Шелковниковъ получилъ ненасыщенные яйца 11 и 12. IV.

Прилетаетъ анстъ очень рано, уже въ концѣ апрѣля или въ началѣ марта. Во время моего пребыванія въ Арешскомъ уѣздѣ въ 1895 году передовые ансты прилетѣли уже 11. II, но нормальное время прилета бываетъ здѣсь, по Шелковникову, отъ 23. II до 3. III. Замѣчено, что сперва прилетаютъ передовые, какъ бы развѣдчики, а за ними черезъ нѣкоторое время слѣдуетъ и валовой прилетъ.

5. VI. 96 я нашелъ на Кубинской низменности въ сел. Ханалугъ-оба въ гнѣздѣ анста уже вполне оперившихся дѣтей, а 29. V. 94 встрѣтилъ по дорогѣ изъ сел. Кечерли въ сел. Карабулагъ Джеванширскаго уѣзда анстовъ, уже летавшихъ выводками. Значитъ ли это, что въ Кубинскомъ уѣздѣ ансты выводятъ позднѣе или разнo въ разные годы, изъ одного наблюденія вывести конечно, еще нельзя.

Когда происходитъ отлетъ анстовъ изъ восточнаго Закавказья, мнѣ наблюдать не приходилось, но въ Гѣльской котловинѣ меня единогласно увѣряли мѣстные жители, что они улетаютъ аккуратно между 15 и 20 августа. Дѣйствительно, въ концѣ мѣсяца ихъ тамъ уже не было.

Анстъ пользуется всеобщимъ уваженіемъ мѣстнаго населенія.

Вѣроятно, въ основѣ этого уваженія лежитъ то обстоятельство, что аистъ, отличаясь ужасною прожорливостью, истребляетъ массу гадовъ. Онъ поѣдаетъ мышей, черепахъ, лягушекъ, змѣй и т. п. А. Б. Шелковниковъ въ зобу и желудкѣ одного убитаго экземпляра нашелъ трехъ маленькихъ *Clemmys caspica*, четырехъ *Trogonotus persa* и шесть лягушекъ.

О сожительствѣ бѣлаго аиста съ черногрудымъ (тростниковымъ) воробьемъ я говорилъ уже въ статьѣ о послѣднемъ видѣ.

291. *Ciconia nigra* L. Черный аистъ.

Мензбиръ, I, 777.

Кара-хаджи-лайлахъ (татарск.).

Въ концѣ августа, 1894 г. я встрѣтилъ этотъ видъ въ большомъ числѣ на чалтыкахъ по Эриванской равнинѣ.

За исключеніемъ этого случая, я встрѣчалъ его только оди-ночными экземплярами или парами, всегда несравненно рѣже, чѣмъ бѣлаго аиста.

30. V. 99 я видѣлъ чернаго аиста на Терекѣ, близъ аула Гудермеса; онъ летѣлъ высоко надъ лѣсомъ.

Въ Кубинскомъ у. видѣлъ пару около сел. Кельны 6. VI. 96. Нужно замѣтить, что черный аистъ, въ противоположность своему бѣлому собрату, не довѣряетъ человѣку и избѣгаетъ его. Гнѣздится онъ, повидимому, въ лѣсу, очень скрытно. Далѣе, я встрѣчалъ его въ Арешскомъ у. 2. III. 95, на Араксѣ, около Мендживанскаго поста, на отмели рѣки 19. VI. 94 и въ др. мѣстахъ восточнаго Закавказья. Въ Гельской котловинѣ я видѣлъ на Курѣ, представляющей здѣсь еще маленькую рѣчушку, одного чернаго аиста VIII. 902.

Сем. 48. *Plataleidae*. Колпицы.

292. *Platalea leucorodia* L. Колпица.

Мензбиръ, I, 767.

Ахджаховкаръ (татарск., по Шелковникову).

Колпица въ значительномъ количествѣ гнѣздится въ густыхъ камышовыхъ заросляхъ по среднему и нижнему теченію Куры и разливу Аракса на Мугани.

Въ любезно предоставленной мнѣ рукописи А. Б. Шелковникова имѣются слѣдующія интересныя наблюденія, относящіяся къ этой птицѣ.

«Держится тамъ же, гдѣ и *Ibis falcinellus*, но въ меньшемъ количествѣ. Лѣтомъ держится въ-одиночку, но осенью передъ отлетомъ собирается въ громадную стаю. Тогда ихъ можно видѣть выстроившимися въ длинныя шеренги по грудь въ водѣ, добывающими себѣ кормъ. Гнѣздятся онѣ въ непроходимыхъ камышахъ среди глубокихъ болотъ. Гнѣздо расположено на 2—3 фута выше поверхности воды и состоитъ изъ грунны растущаго отъ одного корня камыша, у котораго на одной высотѣ заломлены верхушки; такимъ образомъ, получается мѣсто для устройства неприхотливаго лотка около фута въ діаметрѣ, устланнаго тростникомъ и сухими листьями камыша. 4. V. 94 въ гнѣздахъ колпицъ, расположенныхъ близко одно около другого, было по 2—3 яйца еще не насиженныхъ. Кладка, видимо, не была еще окончена. Прилетаетъ колпица (въ Арешскій у.) въ концѣ марта или въ началѣ апрѣля».

Сем. 49. *Ibididae*. Ибисовыя.

293. *Ibis falcinellus* L. Каравайка.

Мензбиръ, I, 762.

Карабаштахъ, караназъ (татарск.).

Въ большемъ количествѣ встрѣчается въ тѣхъ же мѣстахъ, гдѣ и колпица, т. е. по озерамъ и болотамъ по Курѣ, на озерахъ Мугани и Ленкоранскаго у. Такъ какъ собственныхъ наблюденій, кромѣ того, что я видѣлъ эту птицу, у меня нѣтъ, я заимствую снова изъ рукописи А. Б. Шелковникова. «Для Арешскаго у. каравайка довольно обыкновенная гнѣздящаяся птица всюду, гдѣ есть болота, ноуры (озерки) или чалтыки. на которыхъ стаи караваекъ находятъ обильную пищу. Я находилъ ихъ великое множество близъ сел. Наметь-Абадъ на ноурахъ, гдѣ среди камыша, въ непролазной гущѣ и находится гнѣздовье этой птицы. Прилетаетъ она сравнительно поздно. Мои наблюденія относятся къ половинѣ апрѣля и до начала мая, въ зависимости отъ хода весны. Птица эта общественная. Иногда, на утреннихъ и вечернихъ перелетахъ для отысканія корма она собирается въ стаю отъ 20 до 100 штукъ и болѣе».

294. *Ibis religiosa* Cuv. Священный ибисъ.

Мензбиръ, I, 764.

Въ вопросѣ о томъ, какой ибисъ залетаетъ, вѣрнѣе — прежде залеталъ въ Закавказье, мнѣнія орнитологовъ расходятся.

Палласъ называетъ его *Numenius ibis* (священный ибисъ), но ставитъ синонимомъ *Tantalus ibis* (клювачъ). Нордманъ отнесъ эти свѣдѣнія къ священному ибису, Кесслеръ — къ клювачу. Радде перепуталъ оба эти названія, называя священнаго ибиса *Tantalus ibis*, т. е. клювачемъ. Наконецъ, проф. М. А. Мензбиръ говоритъ, что затрудняется опредѣлить, къ какой птицѣ нужно отнести эти свѣдѣнія, но склоняется къ мнѣнію, что къ намъ залеталъ священный ибисъ. Порывшись въ старыхъ запискахъ барона Б. Л. Тизенгаузена, я нашелъ тамъ замѣтки, несомнѣнно подтверждающія мнѣніе проф. Мензбира. Привожу ихъ безъ измѣненія.

«25 іюля 1874 года въ селеніи Арчеванъ (самая южная часть Ленкоранскаго уѣзда) Фараджъ-Арабъ-оглы (негръ, охотникъ владѣльца Астаринскаго магала Миръ-Тели-хана Талышинскаго, имѣніемъ котораго я въ то время управлялъ) принесъ какую-то птицу, которую назвалъ «имамъ-али-кижа», что по-талышински означаетъ «птица пророка Алія». Птицу эту я видѣлъ первый разъ. Вся птица бѣлая, больше каравайки (*Ibis falcinellus*), но немного меньше колпицы (*Platalea leucorodia*): такая же бѣлая, какъ колпица, но только хвостъ гораздо болѣе пушистый, раскидистый; голова и шея до половины голая, какъ у грифа; шершавая кожа темнаго, почти что чернаго цвѣта. Хвостовыя перья гораздо темнѣе всего оперенія. Клювъ и ноги гораздо толще, чѣмъ у каравайки; клювъ непропорціональный, въ верхней части своей толще, темно-черный; ноги темно-бурыя въ красноватыхъ колечкахъ, короче, но толще, чѣмъ у каравайки; глаза желтые. Хвостовыя перья вырваны и отосланы въ Ленкорань для шляпы госпожѣ П. Птица выброшена, такъ какъ препарировать было некому.

«23 іюля 1875 года, селеніе Ардуна Астаринскаго магала. Вслѣдствіе заявленія Фараджа (служащій при мѣ) о кражѣ чалтычныхъ сноповъ, я отправился на ардупинскіе чалтыки (рисовыя плантаціи), на которыхъ встрѣтилъ большую стаю караваекъ и въ числѣ ихъ бѣлую каравайку, на видъ похожую на ту, которая была убита негромъ Фараждемъ въ прошломъ году около селенія Арчеванъ. Вся эта стая караваекъ, въ томъ числѣ и бѣлая, слетѣла

по направленію къ Каладагинскому морцу, куда былъ посланъ Егоръ съ приказаніемъ во что бы то ни стало добыть эту птицу.

«24 іюля послѣ полудня явился Егоръ и принесъ бѣлую каравайку, которую ему удалось убитъ только сегодня, около завтрака (часовъ въ десять утра), потому что она была очень строга и близко не подпускала. Птица оказалась такою самою, какая была убита Фараджемъ-Арабъ-оглы, съ небольшою разницею въ опереніи. Больше обыкновенной каравайки, но ниже и меньше колпика. Хвостъ пушистый, раскидистый. перья хвоста похожи на страусовыя, но гораздо грубѣе, голова и большая часть шеи голая и видомъ похожи на кожу голыхъ собакъ африканской породы, цвѣта темно-чернаго, подходящаго подъ цвѣтъ негра. Опереніе все бѣлое, кромѣ хвоста, который имѣетъ темно-дымчатый цвѣтъ, переходящій къ концу въ черный. Клювъ и ноги гораздо толще, чѣмъ у каравайки; клювъ черного цвѣта, ноги черно-зеленаго съ красноватыми кольцами и короче, чѣмъ у каравайки, но гораздо толще. Боковые края крыльевъ свѣтло-дымчатые, глаза желтые. Молла Буньятъ (мѣстный житель) назвалъ эту птицу по-талышински «сиппи-лока», что означаетъ *бѣлая каравайка*, также «кечаласи-лока» (*паршивоголовая каравайка*). Мѣстные талышинцы были крайне недовольны тѣмъ, что была убита эта птица. Гаджи-Азисъ (старый слуга и мусульманскій писарь при талышинскихъ ханахъ, восьмидесяти семи лѣтъ) назвалъ эту птицу «имамъ-али-кушъ», т. е. *птица пророка-имамъ Али*, которую также называютъ «ніамбаръ-кушъ» — *священная птица*; при этомъ онъ говорилъ, что въ старыя времена, времена его молодости, еще до взятія Ленкорани (Ленкорань взята въ ночь съ 31 декабря 1812 г. на 1-е января 1813 года), птица эта прилетала въ Талышъ очень часто, что имамъ-али-кушъ прилетаетъ для успокоенія народа, и въ годы прилета ея всегда бывають хорошіе урожаи всѣхъ произведеній, и въ эти годы болѣзней не бываетъ. Въ послѣднее время она стала являться очень рѣдко и въ самомъ маломъ количествѣ, потому что мусульмане стали забывать Бога и мало ѣздятъ на богомолье въ Мекку, перемѣнили свои обычаи, стали сѣять «русскій хлѣбъ», т. е. пшеницу и ячмень (до 1863 года въ Астаринскомъ магалѣ пшеницы и ячменя не сѣяли и довольствовались однимъ рисомъ). Также, по мнѣнію талышинцевъ, съ тѣхъ поръ, какъ имамъ-али-кушъ перестала посѣщать ихъ страну, начали болѣть и пропадать ихъ шелковичные черви, такъ какъ раньше эти птицы уничтожали змѣй, которыя портятъ червей».

Мнѣ кажется, что эти описанія, сдѣланныя человѣкомъ, правда, страстно любившимъ природу, но не имѣвшимъ никакого понятія о существованіи священнаго ибиса и не знавшимъ никакого литературнаго описанія этой птицы, доказываютъ, безъ всякаго сомнѣнія, что еще 30 лѣтъ тому назадъ въ Талышъ залеталъ именно *Ibis religiosa*.

Сем. 50. *Ardeidae*. Цаплевые.

295. *Botaurus stellaris* L. Выпь.

Мензбиръ, I, 781.

Вагхъ (татарск.).

Обыкновенна во всей низменности восточнаго Закавказья по камышовымъ зарослямъ, чалтыкамъ и болотамъ. Я встрѣтилъ ее также и на Эриванской равнинѣ и по мелкимъ притокамъ Аракса, какъ болотистый Кара-су около Аралыха.

По Шелковникову, она не только гнѣздится, но и зимуетъ въ Арешскомъ у. Мнѣ зимою она не попадалась.

296. *Ardetta minuta* L. Малая выпь.

Мензбиръ, I, 786 (*Botaurus minutus*).

Встрѣчается тамъ же, гдѣ и предыдущій видъ, но предпочитаетъ заросли камыша, перемѣшанные съ кустарниками, какъ это часто бываетъ по берегамъ ленкоранскихъ морцовъ, гдѣ она и не составляетъ рѣдкости.

297. *Nycticorax nycticorax* L. Кваква.

Мензбиръ, I, 792 (*N. griseus*).

Вагхъ (татарск., по Шелковникову).

Во всемъ восточномъ Закавказьи кваква очень обыкновенна. Я встрѣчалъ ее въ Тифлисѣ, всюду отсюда внизъ по долину Куры, около Сальянъ и въ Ленкоранскомъ уѣздѣ. Необходимое условіе ея мѣстопробыванія — древесная растительность около воды. Густыхъ зарослей ей не нужно, и ее часто можно встрѣтить на большихъ рѣдкихъ деревьяхъ около совершенно чистой, лишенной всякой мелкой береговой поросли рѣки

Образъ жизни кваква ведетъ совершенно ночной. по днемъ сидитъ на деревѣ хотя и неподвижно, но часто совершенно открыто. Вѣроятно, она въ это время плохо видитъ, такъ какъ подпускаетъ на близкій выстрѣлъ. Въ Сальянахъ я убивалъ ее уже въ началѣ марта, но, зимуетъ ли она тамъ, не знаю. По словамъ А. Б. Шелковникова, она зимуетъ въ громадномъ количествѣ въ степныхъ болотахъ Шемахинскаго уѣзда. О гнѣздованіи кваквы этотъ наблюдатель говоритъ слѣдующее: «20. VI. 95, при посѣщеніи мною гнѣздовья *Ardea bubulcus*, я нашелъ и гнѣздо кваквы, уже покинутое птенцами, которые держались на близъ расположенныхъ вѣткахъ, ростомъ мало отличались отъ родителей, но летать еще не могли. Гнѣзда *N. griseus* обыкновенно расположены на опушкѣ лѣса, нѣсколько въ сторонѣ отъ гнѣздъ другихъ цапель».

298. *Ardeola ralloides* Scop. Желтая чепура.

Мензбиръ, I, 796 (*Ardea comata*).

Довольно обыкновенна по среднему и нижнему теченію Куры, озерамъ и чалтыкамъ восточнаго Закавказья. Послѣ прорыва Аракса весною 1894 г. я во множествѣ наблюдалъ ее по разливу на пути изъ Джевата въ расположенныя ниже по Курѣ селенія. А. Б. Шелковниковъ даетъ слѣдующія свѣдѣнія объ этой цаплѣ: «Какъ гнѣздящаяся птица, *A. comata* весьма обыкновенна для Арешскаго уѣзда. Днемъ держится въ-одиночку, рѣдко парами по чалтыкамъ. Прилетаетъ въ началѣ апрѣля. Пищу ея составляютъ кузнечики, пауки, разныя личинки и мелкія лягушки. Мнѣ извѣстно гнѣздовье этой цапли въ лѣсу близъ селенія Карадаглы-Падаръ. Тамъ ея гнѣзда въ небольшомъ числѣ разсѣяны между гнѣздами *Ardea bubulcus* и *A. gazetta*. Устроены они обыкновенно на ивахъ и тополяхъ. Гнѣзда по устройству очень походятъ на таковыя *A. bubulcus*. При моемъ посѣщеніи гнѣздовья 20. VI. 95, молодыя были уже настолько развиты, что могли перепархивать съ вѣтки на вѣтку».

299. *Bubulcus lucidus* Rafin. Египетская цапля.

Мензбиръ, I, 798 (*Ardea bubulcus*).

Я самъ видѣлъ эту цаплю очень рѣдко на разливѣ Аракса; А. Б. Шелковниковъ нашелъ ее во множествѣ въ Арешскомъ уѣздѣ и сообщаетъ о ней слѣдующее:

«Цапля эта въ Арешскомъ уѣздѣ является болѣе обыкновенною, чѣмъ всѣ другіе виды. Изъ гнѣздовой ея мною изслѣдовано одно громадное колоніальное гнѣздовье въ рошѣ сел. Карадаглы-Падаръ близъ Агдаша, близъ самаго человѣческаго жилья. Почти всѣ деревья этой роши, состоящей изъ дубовъ, орѣховыхъ деревьевъ, карагача, хурмы и тутовыхъ деревьевъ, на высотѣ 4—5 саженъ отъ земли имѣютъ гнѣзда, отъ 5 до 50 на одномъ деревѣ, смотря по его вѣтвистости. Словомъ, гнѣзда расположены такъ густо, что земля и трава въ рошѣ почти сплошь покрыты бѣловатыми экскрементами. Гнѣздо устраивается при развѣтвленіи трехъ и болѣе вѣтокъ и состоитъ изъ мелкихъ прутиковъ, довольно прочно переплетенныхъ между собою. Діаметръ гнѣзда отъ 16 до 20 дюймовъ, а толщина отъ 10 до 14 дюймовъ. Лотокъ глубиною 2 дюйма и 8 дюймовъ въ діаметрѣ; подстилки никакой нѣтъ. Кладка содержитъ отъ 7 до 9 яицъ свѣтло-голубого цвѣта. Размѣры яицъ отъ 50×35 mm. до 46×34 mm. Кладка яицъ начинается въ первой половинѣ апрѣля. Яйца, добытыя 25. IV. 95, частью были болѣе или менѣе насижены, частью же еще совсѣмъ свѣжи. Итенцы начинаютъ вылупляться въ началѣ мая. При моемъ посѣщеніи гнѣздовья 17. VII. 94 большая часть гнѣздъ была уже пуста. Изъ остальныхъ же птицы перебрались на сосѣднія вѣтви, по которымъ лазили съ изумительной ловкостью, помогая себѣ клювомъ и шеей. Держатся онѣ на вѣтвяхъ столь прочно, что стряхнуть ихъ почти невозможно.

«Опереніе молодыхъ птицъ чисто бѣлаго цвѣта съ проibiaющими на головѣ между перьями пухинками. Клювъ темно-свинцово-чернаго цвѣта съ желтою вершиною. Голая кожа вокругъ глазъ сѣрая. Радужина грязно-бѣлая. Ноги свинцово-сѣраго цвѣта съ зеленымъ сочлененіемъ голени съ плюсною. Размѣрами вылетѣвшіе изъ гнѣзда экземпляры почти не отличаются отъ старыхъ.

«Цапля эта очень молчалива; лишь на гнѣздѣ старыя птицы издаютъ рѣдкіе крики, похожіе на низкое «корр» или «курр». Молодыя очень крикливы, но издаваемые ими звуки трудно поддаются описанію: то они похожи на кваканье лягушки, то на карканье, то на урчаніе кошки, прерываемое весьма рѣзкими высокими нотами. При вскрытіи ихъ желудковъ, они оказывались переполненными кузнечиками, пауками, живущими въ водѣ личинками, жуками и мелкими лягушатами. Но любимую ихъ пищу составляютъ кузнечики, которыхъ иногда бываетъ въ желудкѣ до 100 и болѣе штукъ.

«Внѣ гнѣздовья эта цапля громадными стаями, до 200—300 особей, пасется на чалтыкахъ, или же стайками въ 15—20 особей сопровождаетъ пасущихся въ болотахъ буйволовъ, отыскивая на нихъ спивѣ пристаившихъ изъ грязи червячковъ и личинокъ, для чего онѣ по одной, по двѣ, по три садятся на спину буйвола, къ чему послѣдній относится совершенно равнодушно. 20. VI. 95 я снова по-сѣтилъ гнѣздовья *A. bubulcus*. Молодые цапли были во всѣхъ стадіяхъ развитія, начиная отъ только что вылупившихся до вполне развитыхъ летающихъ особей. Въ нѣкоторыхъ гнѣздахъ были еще сильно насиженные яйца. Вообще кладка яицъ у этого вида тянется очень долго, и птенцы выводятся очень неравномѣрно».

300. *Herodias alba* L. Бѣлая цапля.

Мензбиръ, I, 803 (*Ardea alba*).

Акъ-кушъ (татарск.).

Обыкновенная гнѣздящаяся птица всего восточнаго Закавказья. Однако, нигдѣ не попадается она часто, и я постоянно встрѣчалъ лишь одиночные экземпляры. Наиболѣе многочисленна была она на разливѣ Аракса на Мугани въ 1897 г. Цапли эти весною безжалостно преслѣдуются татарами изъ-за длинныхъ бѣлыхъ головныхъ перьевъ, употребляемыхъ для приготовленія эгретокъ. Скупщики на мѣстѣ платили тогда около 60 р. за фунтъ этихъ перьевъ.

По Шелковникову, одиночные экземпляры остаются въ Арешскомъ уѣздѣ на зиму. Я встрѣчалъ ее зимою въ Ленкоранскомъ уѣздѣ.

301. *Gazetta gazetta* L. Чепура-нужда.

Мензбиръ I, 800 (*Ardea gazetta*).

Акъ-кушъ (татарск.).

Мнѣ попадалась тамъ же, гдѣ и предыдущіе виды, но въ небольшомъ числѣ. Я встрѣчалъ ее, однако, не только въ болотахъ, но въ Талышѣ очень часто и на лѣсныхъ рѣчкахъ, напр., на р. Астаринкѣ близъ сел. Алана на персидской границѣ.

А. Б. Шелковниковъ сообщаетъ относительно Арешскаго у. слѣдующія свѣдѣнія объ этой птицѣ:

«Въ Арешскомъ у. весьма обыкновенна, но лишь какъ лѣтняя птица. Зимою мнѣ ни разу не попадалась. Прилетаетъ къ намъ

въ первой половинѣ марта. Держится она или небольшими стайками, или по-парно и въ-одиночку. Держится и гнѣздится тамъ же, гдѣ и *A. bubulcus*. При моемъ посѣщеніи вышеописаннаго гнѣздовья цапель 20. VI. 95 молодые птицы этого вида уже летали, а нѣсколько отставшихъ уже свободно перепархивали по вѣткамъ».

302. *Phoebastria immutabilis* L. Рыжая цапля.

Мензбиръ, I, 807 (*Ardea purpurea*).

Я встрѣтилъ эту цаплю осенью 1894 года въ болотѣ около озера Гокчи, гдѣ беретъ начало р. Занга, и на Эриванской равнинѣ по чалтыкамъ, а весною 1897 и 1898 гг. въ сѣверной части Ленкоранскаго у. Относительно Арешкаго у. А. Б. Шелковниковъ говоритъ слѣдующее: «Довольно обыкновенная гнѣздящаяся птица. Встрѣчается по-одиночкѣ, или по двѣ, по три, но въ большія стаи не сбивается. Вылетаетъ на добычу по вечерамъ *, днемъ же держится въ заросляхъ и камышахъ. Гнѣздо ея устроено совершенно такъ же, какъ и у колпицы, и представляетъ пучокъ растущаго камыша, у котораго на высотѣ 3—4 футовъ надъ водою камышинны заломлены на одномъ уровнѣ и образовано такимъ образомъ основаніе для лотка, устланнаго мелкимъ сухимъ тростникомъ и камышовыми листьями. Кладка содержитъ отъ трехъ до пяти яицъ, красиваго зеленовато-голубого цвѣта, которыя при моемъ посѣщеніи гнѣздовья 4. V. 94 были уже частью насижены. У птицъ, убитыхъ 7. IV. 94, яичникъ былъ развитъ еще слабо. Пищу описываемой птицы, судя по содержанію желудка, составляютъ главнымъ образомъ мелкія пресмыкающіяся. Такъ, напримѣръ, у одной изъ нихъ въ желудкѣ оказались: 1 небольшая лягушка, 1 крупная расклеванная и 1 маленькая (въ 3 сант.) водяная черепаха. Кромѣ того онѣ ѣдятъ разныхъ личинокъ, водящихся въ водѣ».

303. *Ardea cinerea* Briss. Сѣрая цапля.

Мензбиръ, I, 811.

Это, безъ сомнѣнія, самая многочисленная цапля всего Кавказскаго края. Она найдена мною въ Кубинскомъ у., во всемъ восточномъ Закавказьѣ, въ ущельѣ Аракса, около озера Гокчи, на

* Въ вышеуказанныхъ мѣстахъ я наблюдалъ эту цаплю днемъ.
К. С.

Эриванской равнинѣ, въ Гѣльской котловинѣ и на черноморскомъ побережьи, гдѣ въ большомъ количествѣ все лѣто 1906 г. встрѣчалась на самомъ взморьи, обществами до 20 особей. Она живетъ въ Закавказьи осѣдло, и около самаго Тифлиса ее можно наблюдать на Курѣ всю зиму.

Отрядъ XII. Steganopodes. Веслоногія.

Сем. 51. *Phalacrocoracidae*. Баклановыя.

304. *Phalacrocorax carbo* L. Большой бакланъ.

Мензбиръ, I, 831.

Балыкъ-уданъ (татарск.).

Большой бакланъ въ громадномъ количествѣ обитаетъ побережья обоихъ морей и по большимъ рѣкамъ проникаетъ далеко вглубь перешейка. Въ восточномъ Закавказьи онъ живетъ и по озерамъ и разливамъ далеко отъ Куры, напр., въ Арешскомъ у. Въ громадномъ количествѣ онъ живетъ и на озерѣ Гокчѣ. На сѣверной части западнаго берега Каспійскаго моря бакланы гнѣдятся, вѣроятно, на скалахъ, такъ какъ по-близости, наприм., Апшеронскаго полуострова, прибрежныя скалы котораго бываютъ сплошь покрыты бакланами, на далекомъ разстояніи вовсе нѣтъ лѣсовъ. Въ Ленкоранскомъ же уѣздѣ я находилъ огромныя гнѣздовыя колоніи баклановъ на такъ называемыхъ «истили». Истили — водные резервуары для снабженія водою чалтыковъ въ жаркое время года. Оригинальность этихъ резервуаровъ заключается въ томъ, что они представляютъ собою затопленные участки лѣса. На высокихъ деревьяхъ среди этихъ «истили» и устраиваютъ свои гнѣзда бакланы громадными колоніями. Такія колоніи я встрѣчалъ между селеніемъ Машханъ и моремъ.

Дорога идетъ здѣсь по дамбѣ, проложенной черезъ затопленный лѣсъ, и колоніи совершенно недоступны. Онѣ по наружному виду очень похожи на грачинныя, и гнѣзда расположены на деревьяхъ такъ же густо, но, конечно, имѣютъ гораздо бѣльшую величину. Въ маѣ мѣсяцѣ, когда я наблюдалъ эту колонію, бакланы въ громадномъ количествѣ непрерывно летали между моремъ и этой колоніей, вѣроятно, таская пищу своимъ птенцамъ.

29. V. 97 я, сидя на террасѣ въ сел. Шахъ-Агачъ, сосчи-

таль, что въ теченіе пяти минутъ протинули надъ моремъ на гнѣздовье 72 баклана. Было около 2 час. дня.

Я наблюдалъ здѣсь, что они вылетали на охоту исключительно въ открытое море. Пища ихъ, какъ я могъ убѣдиться вскрытіемъ убитыхъ, состоитъ исключительно изъ рыбы. Въ сѣверной-же части Каспійскаго моря я не разъ наблюдалъ, какъ они охотились, иногда вмѣстѣ съ пеликанами, двигаясь въ какой-нибудь мелкой бухтѣ полукругомъ къ берегу. Бакланъ живетъ въ занимаемой имъ области осѣдло.

Самцы, убитые въ Арешскомъ у. въ началѣ февраля, имѣли прекрасный брачный нарядъ.

305. *Phalacrocorax pygmaeus* Pall. Малый бакланъ.

Мензбиръ, I, 827.

Я встрѣчалъ малаго баклана тамъ же, гдѣ и большаго, но въ несравненно меньшемъ количествѣ.

Сем. 52. *Pelicanidae*. Пеликановыя.

306. *Pelicanus crispus* Brush. Кудрявый пеликанъ.

Мензбиръ, I, 819.

Кутанъ (татарск.).

Я встрѣчалъ кудряваго пеликана въ громадномъ количествѣ по всему побережью Каспійскаго моря, особенно у устьевъ Куры и на ленкоранскихъ морцахъ, и по заросшимъ камышомъ озерамъ и болотамъ восточнаго Закавказья, гдѣ онъ также гнѣздится. А. Б. Шелковниковъ даетъ слѣдующее интересное описаніе гнѣздовья кудряваго пеликана въ Арешскомъ уѣздѣ: «Прилетаетъ кудрявый пеликанъ рано. 9. III. 39 большая стая этихъ пеликановъ уже кружилась надъ своими гнѣздовьями на Наметь-Абатскомъ ноурѣ (озерѣ). Въ 1896 году первые пеликаны, въ числѣ 10 особей, появились здѣсь 15. II. 4. V. 94 я посѣтилъ ихъ гнѣздовье. Гнѣзда были расположены посрединѣ глубокаго густо заросшаго камышомъ болота. Послѣ почти часовой утомительной ходьбы по поясницу въ водѣ я добрался до ихъ гнѣздовья, расположеннаго на открытомъ, не

заросшемъ камышомъ участкѣ болота. Здѣсь, на высотѣ около аршина надъ водою, высилась плотина неправильной формы, площадью около двухъ квадратныхъ сажень. Образована была эта плотина изъ заломанныхъ и переплетенныхъ между собою концовъ тростника, поверхъ котораго была положена грубая настилка. Вся поверхность ея была густо покрыта, точно оштукатурена, экскрементами птицы. Невдалекѣ виднѣлись другая и третья плотины. Онѣ свободно держатъ двухъ человѣкъ. При моемъ приближеніи улетѣли 17 старыхъ пеликановъ, а когда я вышелъ на открытое мѣсто, то съ плотинъ грузно начали шлепаться въ воду и молодые, сидѣвшіе на нихъ до тѣхъ поръ. Собравшись въ группу около 50 особей, они сбились у начала камышей, шагахъ въ 50 отъ меня. При дальнѣйшемъ же моемъ приближеніи молодые стали издавать густой басовой ревъ и старались скрыться въ густыхъ камышахъ. При этомъ они помогали себѣ необросшими еще крыльями и длинною шеей, которою цѣплялись за растущіе впереди тростники и затѣмъ подтягивались впередъ. Но они были еще настолько неуклюжи, что настигнуть и поймать ихъ не стоило большого труда. Птенцы были покрыты пухомъ и имѣли отъ вершины клюва до начала хвоста около двухъ футовъ. Были и болѣе мелкіе и слабые экземпляры.

«Болото, на которомъ было расположено это гнѣздовье, питалось сточными изъ оросительныхъ канавъ водами и изобиловало сазанами, которые и доставляли обильную пищу пеликанамъ.

«На полетѣ птица эта очень легка и, поднимаясь въ воздухъ спиралями, забирается на громадную высоту. Къ гнѣздамъ старыя птицы спускались тоже кругами».

Отрядъ XIII. Colymbiformes. Гагарообразныя.

Сем. 53. Podicipedidae. Чомговыя.

307. *Podiceps cristatus* L. Большая поганка.

Мензбиръ, I, 5.

Эта поганка живетъ въ восточномъ Закавказьѣ осѣдло, но зимою количество ихъ здѣсь увеличивается прилетными съ сѣвера.

Я наблюдалъ этотъ видъ на морцѣ около Ленкорани въ апрѣлѣ 1897-го года, но уже и въ это время, какъ и все лѣто,

она держится столь скрытно, что увидѣть ее можно лишь случайно. По Шелковникову, гнѣздится въ Арешскомъ уѣздѣ; я видѣлъ экземпляръ убитой здѣсь, именно на разливѣ около Халдана 9. V. 95.

308. *Podiceps griseigena* Bodd. Сѣрощекая поганка.

Мензбиръ, I, 13.

По Шелковникову, гнѣздится въ Арешскомъ уѣздѣ, что подтверждается экземпляромъ, убитымъ 9. V. 95 на разливѣ у Халдана. 14. V. 906 я наблюдалъ этотъ же видъ на озерѣ Лиси у Тифлиса, — слѣдовательно, она гнѣздится и здѣсь.

309. *Podiceps nigricollis* C. L. Brehm. Ушастая поганка.

Мензбиръ, I, 24.

Я видѣлъ двухъ самцовъ и самку, убитыхъ 9. V. 95 на разливѣ у Халдана. По словамъ Шелковникова, эта поганка гнѣздится въ Арешскомъ уѣздѣ. Вышеупомянутые экземпляры были въ брачномъ нарядѣ. Желудки ихъ были набиты растительными веществами, среди которыхъ попадались и остатки водяныхъ жуковъ.

310. *Podiceps minor* Briss. Малая поганка.

Мензбиръ, I, 21.

Обыкновенная осѣдлая птица восточнаго Закавказья. Я встрѣтилъ ее въ большомъ количествѣ на озерахъ около Тифлиса, особенно на озерѣ Лиси. А. Б. Шелковниковъ наблюдалъ ее въ Арешскомъ уѣздѣ.

Сем. 54. *Colymbidae*. Гагаровыя.


311. *Colymbus arcticus* L. Чернозобая гагара.

Мензбиръ, I, 36.

Добытые зимою экземпляры чернозобой гагары я видѣлъ въ Ленкорани у мѣстныхъ любителей. Эта гагара иногда попадаетъ и внутри страны: такъ, въ мартѣ 1891 г. она была добыта въ Елисаветпольской губ. близъ ст. Евлахъ.

К. А. Сатунинъ.

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES



3 9088 00703 2170